



MORISON  
—  
PRAEFLUDIA  
BOTANICA

1669











10 4.

The Library of the  
Wellcome Institute for  
the History of Medicine

**MEDICAL SOCIETY  
OF LONDON**


Accession Number

Press Mark

MORISON, R.

65610/A





B

R

A

PRÆLUDIA  
BOTANICA  
ROBERTI MORISON  
SCOTI  
ABERDONENSIS.



11 . 50 . 21

IV4

N

P

OF

P

RO

R

Tipu

Raj

HORTUS REGIUS  
**B L E S E N S I S**  
 SOCIETATIS M  
 U C T U S,

Notulis durationis & Characterismis Plan-  
 tarum tam additarum quam non scriptarum;

ITEM  
 Plantarum in eodem horto Regio *Blesensi*  
 aucto contentarum, nemini hucusque scriptarum,  
 brevis & succincta delineatio.

*Quibus accesserit*

Observationes Generaliores (Plantarum in  
 eodem horto Regio *Blesensi* aucto contentarum) rei  
 Herbariæ studiosis valdè necessariæ, & cog-  
 nitu perutiles.

PRÆLUDIORUM BOTANICORUM

Pars prior.


AUTHORE

ROBERTO MORISON Medico & Professore  
 Botanico, serenissimo CAROLO secundo, magna Bri-  
 tanniæ, &c. REGI.

Doctis (in arte) scribo:  
 Indoctos docebo.

L O N D I N I.

Typis Tho. Roycroft, Impensis Jacobi Allestry ad Insigne  
 Rosæ Coronata in vico vulgò dicto Ducklane, Anno 1669.



R

R

Se



77017





SERENISSIMO  
ET  
POTENTISSIMO  
CAROLO II.

Magnæ Britanniae, Franciæ, &  
Hyberniae,

R E G I.

Serenissime REX:



UM Hortum Regium Ble-  
sensum auctum, pro tertia  
vice typis committere decre-  
veram. Statim subiit ani-  
mum meum, aliquid de novo addere,  
a 3 præter

præter nomenclaturam Authorum, in plan-  
tis recitandis: quod Reipublicæ Bota-  
nicæ ejusque emolumento publico inservire  
queat. Quare ex longa experientia edoctus:  
durationem Stirpium omnium ibidem con-  
tentarum, per notulas ☉ scilicet ☿ ♀, ap-  
posite satis ad eandem indigitandam qua-  
drantes; alios docere æquum judicavi.  
Plantas præterea 260. a nullo Authore  
descriptas exhibeo, ☿ Characterisimo ☿,  
serenissimi principis Gastonis Franciæ  
(Majestatis vestræ) Avunculi easdem ho-  
noravi. Quia ejus liberalitate ☿ im-  
pensis fuerunt acquisitæ. Easque hic bre-  
viter ☿ succincte delineavi; ut prodes-  
sent omnibus ☿ singulis, quibus volupe est  
Artis Botanicæ studium. Porro obser-  
vationes generaliores ( Plantarum in  
orto eodem Regio contentarum ) rei  
Her-

Herbariæ studiosis valde necessarias &  
cognitu perutiles edo. Plantas insuper  
360, in eodem prædicto horto Regio  
aucto contentas, plus minusve, Asterisco  
affectas offero. Quo augmento accrevit  
idem hortus Regius Blesensis ab An-  
no 1655, usque ad Annum 1660 quo  
Anno, extinctus est serenissimus, Ma-  
jestatis vestræ, Avunculus, omnium Bo-  
taniorum Patronus & Mæcenas vere  
Regius: versatissimus & oculatissimus,  
in Arte Botanica Princeps. Cui ego per  
decennium, in indagandis & in hortum  
Regium invehendis plantis, operam na-  
vavi iisdem ex omnibus Galliæ tracti-  
bus collectis; præter meridionales Al-  
pinos & Pyrenæos Montes: ad quos nos  
mittere (si Dii voluissent) decreverat.  
Quin & methodum meam novam a

natura datam, a me solummodo ( citra  
jaſtantiam ) obſervatam; a nullo niſi  
meiſo, in hunc uſque diem deteſtam,  
quamvis mundi incunabilis ſit coeva;  
Designatoribus, Chalcographis & ( id  
genus ) aliis hominibus ingeniſis com-  
miſſiſſet, publicique juris feciſſet. Sed  
proh ! dolor atque decus Botanicorum  
inevitabili fato, morte præventus, tam  
Charus Mæcenas; qui nullis ſumpti-  
bus pepercit, ut tam indigenas, in  
Gallia ſponte venientes, quam aliun-  
de, ex omnibus mundi plagis; omnis  
generis haberet plantas. Nunquam ſatis  
ob hoc, omnibus Botanicis tam præ-  
ſentibus, quam adventuris & mihi præ-  
cipue laudandus. Ego ut viam præ-  
ſternere methodo novæ, a me ſolum-  
modo ( ut ſupra dictum ) deteſtæ, con-  
cinnaturus



cinnaturus historiam generalem, omnium Stirpium, tam Arborum, fruticum quam suffruticum, per Tabulas cognationis seu affinitatis, amicorum quorundam (imo doctorum) Botanicorum precibus, pluries tam hic quam alibi terrarum, verbis coram, literis è longinquo sollicitatus. Ut has meas primitias (tanquam præludia Botanica, ad methodum prædictam) in lucem darem. Oratum me sæpe fateor, tandem me exoratum habuere. Atque ingenii mei, in Arte Botanica specimen exhibere volui. Quin & Patronum (Majestate vestra Augusta) aptiorem eligere non potui, cui collectionem hanc Plantarum, voverem aut dicarem: quicquid est, est novum. Cui inquam aptius voverem aut inscriberem, quam M. V.  
quum



quum eundem mihi obtines locum, quem  
defunctus vester Avunculus. Alumnus  
sum vester, in vestro solo, antiquo sci-  
licet vestro Regno Scotorum, natus &  
educatus. Ad idem Officium vobis red-  
dendum vocatus, eandemque quam a-  
pud Avunculum M. V. sustineo hic Pro-  
vinciam. Ideo M. V. in defuncti Avun-  
culi vestri locum vicemque sufficere, par  
erat. Quare primitias has nostras, præ-  
ludiorumve Botanicorum horum no-  
strorum, partem hanc primam accipe (se-  
renissime R E X) fronte serena, meque  
benigne intueri. Dum sublimiora quæ  
meditor, id est methodum novam, nulli  
adhuc auditam, per Tabulas cognationis  
disponentem, omnes vegetabilium classes:  
Modo faveat Augusta vestra Majestas,  
nostris conatibus, & laboribus æstate,  
lucubra-

lucubrationibus hyeme, per aliquot annos  
exantlatis: partim sub Auspiciis Avunculi vestri in Gallia, Gastonis Franciæ;  
partim sub Auspiciis vestris hic. Quod  
si annuere hoc mihi digneris: Polliceor  
Britanniam vestram, cum methodo exactissima (quæ est naturæ ipsius) imposterum, in re Botanica gloriari posse:  
quemadmodum, Italia, Gallia, Germania, superiori sæculo, sine methodo, in Scientia Botanica, gloriata sunt. Penes me eandem nunc habeo, sed unde designatorum Chalcographorumque labores compensentur, non mihi suppetit. Tandem ut concludam, quod beatæ memoriæ, serenissimi Principis Gastonis, Patroni & Domini (quondam) mei dignissimi vovi; jam tandem partim persolvi: Cætera (favente Numine) persolvam. Has nostras  
primitias,

*primitias, benigno si M.V. intueatur o-  
culo; animum nobis addet, ad majora &  
sublimiora prompte edenda.*

Serenissimæ vestræ

MAJESTATIS,

Fidelissimus & devotissimus

Servus Domesticus

M E D I C U S

&

Professor *Botanicus*

ROBERTUS MORISON.



# PRÆFATIO

A D

Lectorem Botanicum.

**C**atalogum omnium Stirpium, in horto Regio Blesensi vegetantium, sub interitum Mæcenatis ipsius, exhibiturus. Certiorem te redderem ( amice lector ) neminem in quacunque re feliciter versari: nisi inclinatione naturæ, fateve vel divinâ ordinatione ad eam trahatur. Quæ omnia in Celsitudine ejus Regiâ, Aurelianensi Duce defuncto, in re Botanicâ concurrere videbantur. Nam ab ineunte ætate, ( pueritiâ scilicet ) incepit illi hic ardor Botanicus, quique cum adolescentiâ accrevit; ætate mediâ, stabilita & conformata fuit. Ut paucis multa comprehendam, principem oculatiorem, post Salomonem, in re Botanicâ orbis nunquam tulit. Quapropter non potiore jure, naturalis propen-



## P R Æ F A T I O.

propensione, *Medicinam affectantes* ; Apollo  
 Æsculapius, Machaon, atque Podalyrius,  
 in Divorum numerum à Veteribus relati :  
 quam serenissimus hic Princeps, Botanicorum  
 Divus, posteris denominandus. Observabis  
 (amice lector) plantas omnes hac notulâ ☉  
 affectas, vivaces seu perennes denotari. Plan-  
 tas vivaces seu perennes appellò, quarum ra-  
 dix (postquam defloruerint, semenque pro-  
 duxerint plantæ) novos quotannis emittit  
 Asparagos caulesve, quin & ex eadem radice,  
 de novo singulis annis revivescunt plantæ pe-  
 rennes. Arborea & frutices nulla indigi-  
 tantur notâ, quippe spontè sese declarant vi-  
 vaces. Plantas autem quibus passim affigi-  
 tur hæc notula ☿ intellige (amice lector) an-  
 nuas, per annuas, non solum intelliguntur eæ  
 plantæ, quæ intra anni spatium, semen suum  
 perficiunt, sed & quæ secundo, aut perraro  
 tertio anno, semine perfecto, exsiccantur pe-  
 reuntque nulla restibili radice; ex quâ de  
 novo, stolones ut perennes exittant. Has  
 duas notulas ☉. & ☿ ad plantarum duratio-  
 nem indigitandam elegi: quippè ut aurum,  
 in multos annos ignem facile perfert, sine per-  
 ditione; ita plantæ perennes, plurimos Solis  
 accessus



## P R Æ F A T I O.

accessus & recessus, paritèr facillimè tollerant, sese renovantes de novo quotannis. Mercurii omnium metallorum magis fluidi & ad ignem positi, citissimè evanidi potulam hanc & annuis affixi; quippè annuæ intra annum (ut plurimum) pereunt. Nota insupèr plantas in Catalogo hoc contentas, quibus adjicitur Characterismus & esse non scriptas apud Authores, sed à nobis primò exhibitas. Quoniam serenissimi principis Gastonis Franciæ, imperio, jussu & expensis, acquisitæ & examinatæ fuerunt; seu indigenæ in Gallia, à nobis collectæ, sive è longinquo ad nos delatæ easdem ipsius Principis Characterismo honoravimus. Nota plantas Asterisco in margine notatas, fuisse recuperatas ab Anno 1655. usque ad Annum 1660. quo extinctus est Mæcenæ ipse serenissimus dux Aurelianensis. Sic quinque illis Annis 360 plùs minùs plantis, novissimum hunc à me auctum percipies Catalogum. Deniquè intuendo, ictu oculi percipere potes, quæ Stirpes sunt vivaces, quæ annuæ, quæque à Celsitudine ejus Regiæ, primò exhibitæ: ipsi, ejusque memoriæ eas acceptas refer. Cum enim, omnium Stirpium, tam in agris spontè nascentium, quam in hor-

tis

## P R Æ F A T I O.

*tis Celsitudinis ejus, Regiæ educatarum (ex  
frequenti omnium seminum inspectione & ad  
invicem collatione) durationem, longâ, nem-  
pè decennali experienciâ didicimus: hanc  
liberè Botanicæ rei studiosis exhibemus. Nec  
hoc à quovis ante nos factum. Idèò omnibus  
& singulis Botanicis, opus gratum ac maximè  
desideratum esse concludimus. Porro accipe  
plantarum 260 in eodem horto Regio Blesensi  
aucto contentarum; breviter & succinctè à  
nobis factam delineationem. Quin & insuper  
adjecimus (quorundam amicorum precibus)  
observationes generaliores, Botanicis valdè  
necessarias & cognitu perutiles; atque ex  
hisce suprâ citatis, construere præludiorum  
Botanicorum nostrorum partem primam, o-  
peræpretinm duximus. Vale.*

( Amice Lector )

Tuus humillimus

& ad omnia paratus, servus

*Rob. Morison M. & P.B.R.*



In Hortum Regium BLESENSEM.

**H**INC, nulli biferi miranda Rosaria pesti.  
Nec mala hesperidum, vigili servata Dracone.  
Si Paradisiacis quicquam (sine crimine) campis  
Conferri possit. Blæsis mirabile specta!  
Magnifici Gastonis opus: qui terra capaci;  
Quicquid alit sæcunda sinu, plantasque tenellas;  
Robur & Arboreum, modico consecvit in Horto.  
Bersabidem perhibent, novisse à Graminis herba,  
Ad Libani Cedros. Coluit propriisque locavit  
Sedibus hic princeps: siccis montana reponens  
Udis ima locis. Ut vultu cuncta venirent  
Nativo, faciliq; florent tibi nota labore.  
posuit JACOBUS METELANUS Scotus

Morisoni nomen cunctis celebrabitur Hortis :

Dum sua cum foliis semina planta feret.

Canebat CLAUDIUS CRITCHTONIUS Scotus.

In Horti Regii BLESENSIS, ejusque Authoris Encomium : scribit Authoris amicus.

**Q**UAE Dives Natura mihi miracula jactat,  
Thesauros pandens Ambitiosa novos ?  
Mirandum Gastonis opus ! dabit Area, quicquid  
Orbe datum est ; ingens in nuce mundus adest.  
Quicquid ubique viget plantarum, hac horrea servant.  
Hic staret ornatus flora vel ipsa suos,  
Area sparsa suis stellis, velut Aethera, luce,  
Invidiosa polis, inferiore micat ;  
Nec Morifone minor Tua gloria ; Quaelibet herba  
Natura paret legibus, atque Tuis,  
Sceptra tenens, clauso plantarum in carcere regnas  
Surgit & Auspiciis herba cadisque Tuis.  
Quasque prius terris, nunc chartis inseris herbas  
Et datur in Libris Vita secunda Tuis.  
Quaeque suis foliis poterat tam saepe perire  
Non poterit foliis planta perire Tuis.  
Quid quod & hac tantum vibras lusoria tela  
Ridet & haec tanquam ludicra majus opus.  
Non aliter Liber hic quam magni Antecambulo Regis  
Sive suam veluti Phosphoras autem diem  
Illa edas cunctis optata volumina votis  
Illud, quo majus non habet Orbis, opus.  
Illic innumeras Tu digeris ordine plantas  
Illic in proprios herba redasta locos  
Illa Tibi fient monumenta perennia ; vitam  
Quam dederas herbis & dabit herba Tibi.

ALEXANDER MORISON A.





Explicatio nominum Autho-  
rum, in Horto Regio *Blesensi* aucto  
Citatorum.

**A**D. & Adv. Lob. Lobelius in *Adversariis*.

Ad. Lob. part. pr. & part. alt. Lobelius in *Adversariorum* parte prima, & parte altera.

Ama. Amat. Amatus Lusitanus.

Apul. Apuleius.

Bapt. Ferr. & Ferrar. Joh. Baptista Ferraryus.

Bell. Bellon. Petrus Bellonius.

Bauh. Pin. B Pin. Casparus Bauhinus in *Pinace*.

Bauh. Prod. B. Prod. & Prodr. Casparus Bauhinus in *Prodromo*.

Bauh. & B. Phytop. Casparus Bauhinus in *Phytopinace*.

B. Pin. app. Bauhinus in *Pinacis* appendice.

C. B. Pin. Casparus Bauhinus in *Pinace*.

Cass. Bauh. in Pin. C. B. P. aliquando C. B. Casparus Bauhinus in *Pinace*.



## E X P L I C A T I O

- C. B. Prod. descr. Casparus Bauhinus in Pro-  
dromo, descriptione.*
- Ces. & Cesalp. Andreas Cesalpinus.*
- Cam. & Camer. Camerarius in Epitome Mat-  
theoli & horto suo.*
- Cast. Castor Durantes.*
- Clus. hist. vel Clus. Carolus Clusius in historia  
sua rariorum.*
- Clus. desc. Clusius in historia rariorum de-  
scriptione.*
- Clus. cur. post. Carolus Clusius in curis poste-  
rioribus.*
- Clus. ex. & exot. Carolus Clusius in historia  
exoticarum.*
- Clus. hist. app. 1. & app. alt. Carolus Clusius in  
appendice prima & altera ad historiam.*
- Col. & Colum. Fabius Columna in historia de  
minis cognitis.*
- Col. Phytob. Fabius Columna in Phytobasano.*
- Cord. & Cord. hist. Cordus in historia sua  
Plantarum.*
- Corn. & Cornuti. Jacobus Cornutus de plantis  
suis Canadensibus.*
- Dalech. & Dal. Dalechampi. Dal. & Da-  
lechamp. Dalechampii hist. Lugd. est historia  
Lugdunensis citans Dalechampium.*
- Diosc. Dioscorides.*
- Dod.*

Nominum Authorum, &c.

*Dod. Dodonæus in historia pemptadum, editione Latina in folio.*

*Dod. Gall. ed. Dod. ut. & utr. Dodonæus in editione Gallica, & utraque tam Gallica (à Carolo Clusio edita) quam sua Latina.*

*Dod. desc. Dodonæus in folio. Latine, descriptione.*

*Desc. & descr. post citationem Authoris, denotant plantam ab ipso Authore citato scriptam, non figuratam: ut Lob. Dod. Clus. &c. desc. significat ab ipsis esse descriptam.*

*Eyst. & Eystet. & hort Eyst. hortus Eystettensis à Beslero editus.*

*Fuch. Fuchius in historia sua Latina, in folio.*

*Ger. Johan. Gerardus, emaculatus à Jansono.*

*Ges. Gesn. Gesnerus in corrallario, historia Cordi, addito: & in Libello de collectione Stirpium.*

*Hist. Lugd. & Lugdun. historia Lugdunensis Latine edita in folio.*

*Hist. & histor. Mex. & Mexican. historia Mexicana in folio.*

*Hist. s. histor. Brasil. historia Brasiliiana in folio.*

*Hort. Farnes. & Farn. hortus Farnesianus.*

*Hort. Eyst. & Eystet. hortus Eystettensis.*

*Icon, Lob. Lobelius in Iconibus.*

*Imperat.*

## EXPLICATIO

*Imperat. ferantes Imperatus in sua historia naturali.*

*Job. Baub. & J. B. Johannes Bauhinus. in universali sua historia, tribus Tomis digesta.*

*Lob. Icon. obs & Ad. & Adver. Lobelius in Iconibus, forma oblonga, observationibus & Adversariis Stirpium: in folio.*

*Lug. & Lugdun. histor. hist Lugd. & Lugdun. historia Lugdunensis, Lugduni excusa, lingua Latina: in folio.*

*Matth. & Matt. ed. Baub. Mattheoli editionis Bauhini citatio.*

*Maran. & Marantha, Bartholomeus Marantha.*

*Muton. & Mutoni. Mutonus ab Authoribus citatus.*

*Obs. & Icon. Lob. Lobelius in Observationibus & Iconibus suis.*

*Obs. Lob. & ad. Lob. Lobelius in Observationibus & Adversariis suis.*

*Park. Johannes Parkinson, in suo Theatro Botanico.*

*Park. in appad. Theat. Job. Parkinson in appendice ad Theatrum suum Botanicum.*

*Park. parad. idem Job Parkinson in suo Paradiso terrestri.*

*Pass.*

Nominum Authorum, &c.

*Pass. Passæi. Passæus in Iconibus suis in forma oblonga.*

*Plin. Plinius.*

*Pon. & Ponæ, Johannes Pona in editione sua Latina.*

*Pon. & Ponæ desc. Mont. Bald. Johannes Pona in Montis Baldi descriptione.*

*Prosp. Alp & Alpin. de plant. & plan. Ægypt. Prosper Alpinus de plantis Ægypti.*

*Prosp. A'p. exot. Prosper Alpinus de exoticis.*

*Rob. Steph. Præd. Rust. Robertus Stephanus in Prædio Rustico suo.*

*Ruel. & Ruell Johannes Ruellius.*

*Stapel. & Stapelii, Johannes Boda Stapelius, novissimus in Theophrastum Commentator.*

*Swert. Swertius in florilegio suo.*

*Tab. & Tabern. Theodorus Tabernemontanus in Iconibus suis in forma oblonga.*

*Thal. & Thalii, Johannes Thalius in sylva sua Hæcynica.*

*Theoph. & Theophr. Theophrastus.*

*Trag. & Tragi, Hieronymus Tragus in historia.*

*Vesl. & Vesling. Obs. in Prosp. Alp. Veslingii Observationes in Prosperum Alpinum.*

*Valet. hortus valet, Acupictorum in usum factus.*



## Explicatio nominum Authorum &c.

*Desc. & descript. intellige Authoris citati plantam scriptam, non figuratam.*

*Col. & Colum. in hallucinationibus Caspari Bauhini à nobis primo exhibitis, Columnam designat. I. & II. Pl. primam & secundam demonstrat (post paginam designatam) plantam prædictæ Columnæ.*

*Quicumque plura, de Authoribus desiderat; consulat Casparum Bauhinum, sub introitum Pinacis sui, ibi prolixius docet. Qui fuere Authores omnes, qui (ante suum sæculum) de re Botanica scripsere: & quo volumine & quando ipsorum opera, in lucem prodire.*

*Nota insuper, quando nomina Theophrasti, Dioscoridis, Plinii, Mattheoli Tragi, Thalii, Lobelii, Dodonæi, Clusii Fuchsii, Dalechampii, Ponæ, & cæterorum (id genus) Authorum aliorum; ad longum, ab aliis citantur; scribuntur ut suprâ. Et citantes ipsos curte in Botanographorum monumentis, in medium adferuntur ut passim à nobis, & aliis antè nos scribentibus factitatum, observare licet.*

HOR-





# HORTUS REGIUS BLESENSIS AUCTUS.

A



BIES Hist. Lugd. alba sive fœ-  
mina B. pin.

Abrotonum mas Dod. mas an-  
gustifolium majus B. pin. ☉

Abrotonum mas incanum Col. mas angustifolium incanum B. pin. ☉

\* Abbrotanum mas angustifolium maximum C. B. P. magnum camphoratum quibusdam incensaria cam. ☉

Abrotonum odoratum humile Dod. mas angustifolium minus B. pin. ☉

Abrotonum campestre B. pin. Artemisia tenuifolia Dod. ☉

A

Abrotonum

Abrotonum foemina vulgare Clus. foemina  
foliis teretibus B. pin. ☉

Abrotonum foemina Narbonense Clus. foemina  
flore majore B. pin. ☉

Abrotonum foemina viride B. pin. foem.  
sextum Clus. descr. ☉

Absinthium vulgare Fuchf. latifolium Dod.  
Ponticum, seu Romanum officinarum, seu  
Dioscoridis B. pin. ☉

Absinthium insipidum, Absinthio vulgari  
simile B. pin. ♀

Absinthium maritimum Lavendulae folio B.  
pin. latifolium marinum hort. Eyst. ☉

Absinthium marinum Latifolium Park. ☉

Absinthium Seriphium vulgare, perperam  
Dioscoridis Icon. Lob. Seriphium Belgi-  
cum B. pin. ☉

Absinthium Seriphium Gallicum Matth. ed.  
& B. pin. Narbonense Dod. descr. ☉

Absinthium tenuifolium Dod. Ponticum  
Matth. ed. B. Ponticum tenuifolium in-  
canum B. pin. ☉

Absinthium Austriacum tenuifolium Clus.  
Ponticum, Tridentinum herbariorum  
Obs. Lob. Ponticum tenuifolium Austri-  
acum B. pin. ☉ Absinthium

Abinthium Alpinum umbelliferum Clus.  
 Alpinum umbelliferum latifolium B.  
 pin. ☉

Acacia Americana Robini, Cornuti.

Acacia Ægyptiaca hist. Lugd. foliis scorpi-  
 oidis leguminosæ B. pin.

Acanthium Dod. Spina alba tomentosa la-  
 tifolia sylvestris B. pin. ☿

Acanthium Illyricum Obs. Lob. ☿

Acanthium Lusitanicum, ☿ ☿

\* Acanthium Illyrico accedens capitulis  
 minoribus, ☿ ☿

Acanthus sativus Dod. sativus vel mollis  
 Virgilii B. pin. ☉

Acanthus sylvest. Dod. aculeatus B. pin. ☉

Acarna flore luteo patulo B. pin. Carlina syl-  
 vestris minor Dod. ☿

Acarna flore purpurorubente patulo B. pin.

Acanthioides parva Apula Col. ☿

Acarna major caule folioso B. pin. Chamæ-  
 leon Salmanticensis Clus. ☿

*Acer major* Dod. *montanum candidū* B. pin.

*Acer montanum flavum* .f. *crispum* B. pin.

*Opulus montanus* hist. Lugd. descr.

*Acer minor* Dod. *campestre* & *minus* B. pin.

*Acer Monspeffulanum* hist. Lugd. *trifolia*  
B. pin.

\* *Acetosa crispa* L. B. ☉

*Acetosa pratensis* B. pin. *Oxalis* Dod. ☉

*Acetosa montana maxima* B. pin. *Oxalis*  
*major Broccenbergensis* Thal. syl. Har-  
cyn. ☉

*Acetosa vesicaria peregrina* hort. Eyf. A-  
*mericana* foliis longissimis pediculis do-  
natis B. pin. & prodr. ♀

*Acetosa rotundifolia hortensis* B. pin. *Oxa-*  
*lis rotundifolia* Dod. ☉

*Acetosa Cretica* semine aculeato B. prodr.  
& pin. ♀

*Acetosa arvensis lanceolata* B. pin. *Oxalis*  
*minima* Dod. ☉

*Aconitum hyemale Ponticum* hort. Eyf.

*Unifolium luteum bulbosum* B. pin. ☉

*Aconitum lycoctonon luteum majus* Dod.

*Lycoctonon luteum* B. pin. ☉

*Aconitum*



*Aconitum lycoctonon* luteum minus Dod.  
descr. ☉

*Aconitum lycoctonon* flore Delphinii Dod.  
cœruleum glabrum flore consolidæ re-  
galis B. pin. ☉

*Aconitum cœruleum* .f. *Napellus primus* B.  
pin. *Napellus* Dod. ☉

*Aconitum violaceum* .f. *Napellus secundus*  
B. pin. *Lycoctonon quartum* Tauricum  
Clus. ☉

*Aconitum lycoctonon* quintum Neuber-  
genſe Clus. purpureum .f. *Napellus terti-*  
us B. pin. ☉

*Aconitum lycoctonon* cœruleum parvum  
Dod. cœruleum minus .f. *Napellus minor*  
B. pin. ☉

*Aconitum spica* florum pyramidali. ☿ ☉

*Aconitum novum* Judenbergense Clus. ☉

*Aconitum salutiferum* .f. *Anthora* B. pin.  
*Anthora* Dod. ☉

*Aconitum racemosum* B. pin. *Christophori-*  
ana Dod. ☉

*Aconitum baccis niveis* Cornuti. ☉

*Aconitum baccis rubris* Cornuti. ☉

*Acorus verus* .f. *Calamus aromaticus* offici-

narum B. pin. Acorum legitimum Clus. ☉

Adiantum foliis Coriandri B. pin. Adiantum f. Capillus Veneris verus Ad. Lob. ☉

Adiantum Americanum Cornuti. Fruticosum Brasilianum B. prodr. ☉

Adiantum nigrum Plinij Lob. Dryopteris nigra Dod. ☉

Adonis Matth. ed. B. sylvestris flore phœniceo B. pin. ♀

Adonium luteum Tab. ♀

Æthiopis Dod. foliis sinuosis B. pin. ♀

Ageratum Matthioli hist. Lugd. foliis serratis B. pin. ☉

Ageratum floribus candidis Obs. Lob. ☉

Ageratum purpureum hist. Lugdun. serratum Alpinum B. pin. ☉

Ageratum villosum purpureum. ☼ ☉

\* Agrimonoides Col. ☉

Alaternus prima Clus. Philyca elatior B. pin.

Alaternus foliis ex albo variegatis. ☼

Alaternus foliis ex luteo variegatis. ☼

Alcea

Alcea vulgaris Dod. vulgaris major B.  
pin. ☉

Alcea folio rotundo laciniato B. pin. Malva  
s. Alcea montana Col. ☉

Alcea fruticosa cannabino folio Clus. can-  
nabina B. pin. ☉

Alcea Syriaca hort. Eyst. arborescens  
Syriaca B. pin. Althæa frutex secunda  
Clus. ☉

Alcea Syriaca flore candido Hort. Eyst. ☉

Alcea Veneta hort. Eyst. vesicaria Dod. B.  
pin. ♀

\* Alcea vesicaria capitis bonæ spei ☿  
♂

Alcea villosa Dalechampi hist. Lugd. hir-  
suta B. pin. ♀

Alcea Indica parvo flore B. pin. Ægyptia  
Clus. Bamia Alexandrina Cæsalp. ♀

Alcea Ægyptiaca villosa B. pin. Bamia  
moschata Vellingij Obs. in prosp. Alp.  
♀

Alchimilla Dod. vulgaris Clus. B. pin. ☉

Alchimilla minor. ☿ ☉

Alchimilla minima montana Col. Saxifraga  
s. Perciepier Anglorum Icon. Lob. Chæ-

rophylo nonnihil similis B. pin. ♀

Alliaria Dod. B. pin. ♀

Allium Dod. sativum B. pin. ☉

Allium sphæriceo capite, folio latiore B. pin.  
Ampeloprasum Dod. Scorodoprasum  
primum Clus. ☉

Allium Urfinum Fuchf. sylvestre latifolium  
B. pin. ☉

Allium anguinum Matthioli histor. Lug-  
dun. montanum latifolium maculatum  
Bauh. pin. Victoralis longa Clus. ☉

Allium sylvestre tenuifolium Dod. campe-  
stre juncifolium capitatum purpurascens  
majus B. pin. ☉

\* Allium insipidum juncifolium Gethoi-  
des sylvestre Col. ☉

Allium montanum bicorni flore obsoletiore  
B. pin. Moly lurido colore Swertij. ☉

Allium juncifolium bicorni luteum B. pro-  
dr. & pin. ☉

Allium montanum capite rotundo B. pin.

Allium seu Moly montanum quintum  
Clus. ☉

Allium montanum foliis Narciss. majus B.  
pin.



pin. Allium .s. Moly Narcissinis foliis primum Clus. ☉

Alnus Dod. vulgaris Clus. rotundifolia glutinosa viridis B. pin.

Alnus nigra baccifera hist. Lugd. B. pin. Frangula Dod.

Alni effigie lanato folio major B. pin. Aria Theophrasti effigie Alni Ad. & Icon. Lob.

Alni effigie lanato folio minor B. pin. Amelanchier Gallorum Obs. Lob.

Aloe Dod. vulgaris B. pin. ☉

Aloe ex America Dod. folio in oblongum aculeum abeunte B. pin. ☉

Alfne heredulæ folio B. pin. hederacea Tab. ☿

Alfne foliis Veronicæ Tab. Veronicæ foliis, flosculis cauliculis adhærentibus B. pin. ☿

Alfne foliis Triffaginis Icon. Lob. chamædryfolia flosculis pediculis oblongis insidentibus B. pin. ☿

Alfne triphyllos cœrulea B. pin. Elatine triphyllos hist. Lugd. ☿

Alfne scandens baccifera B. pin. Cucubalus Plinii hist. Lugd. ☉ Alfne

Alfine altissima nemorum B. pin. major  
Dod. ♀

Alfine media B. pin. minor Dod. ♀

Alfine minor multicaulis B. pin. minima  
Dod. ♀

Alfine petræa minima Tab. minor Lini ca-  
pitulis B. pin. ♀

Alfine affinis Androsace dicta major B. pin.  
Androsace altera Matthioli Clus. ♀

Alfine spergula dicta major B. pin. Sagine  
spergula Obs. Lob. ♀

Alfine spergulæ facie .f. Spergula minor  
subcœruleo flosculo B. prodr. ♀

\* Alfine spergula flo. violacio major C. B.  
P. spergula marina Dal. ☉

\* Alfine spergula semine foliaceo nigro.  
☿ ♀

\* Alfine spergula, semine foliaceo subfus-  
co. ☿ ♀

Alfine fontana Tab. aquatica media B.  
pin. ♀

Alfine littoralis foliis portulacæ B. pin. Al-  
fines Pelagicum genus Clus. ☉

Alfine nodosa Germanica B. prodr. ♀

Alfine tenuifolia muscosa B. pin. muscosa  
hist. Lugd. ♀

Alfine

Alfine inaperto flore. Noctiflora minima



Alfine hirsuta magno flore B. pin. Auricula  
muris quibusdam Dod. Gall. ed. ☿

\* Alfine hirsuta viscosa altera C. B. P. ☿  
Folia hujus angustiora & saturatius vi-  
rentia sunt.

Althæa, Ibisus Dod. vulgaris Clus. Althæa  
Dioscoridis & Plinij B. pin. ☉

Althæa arborea Olbiæ Lob. frutescens fo-  
lio acuto, parvo flore B. pin. ☉

Althæa Theophrasti flore luteo B. pin. Abu-  
tilon Avicenæ hort. Eyst. ☿

\* Althæa flo. luteo minimo, semine rostra-  
to. ☿ ☿

Alysson Galeni Dod. verticillatum foliis  
profundè incisis B. pin. ☉

Amaranthus maximus B. pin. Quinua .s.  
Blitum majus Peruanum Clus. Idem semi-  
ne rubro. ☿

Amaranthus coccineus elegans maximus  
Park. ☿

Amaranthus maximus semine nigro. ☿ ☿  
Amaranthus

- Amaranthus spicis viridibus. ☞ ♀  
 Amaranthus cristatus Camerarii hort. Eyst.  
 paniculâ incurvâ B. pin. ♀  
 Amaranthus purpureus Dod. paniculâ con-  
 glomeratâ B. pin. ♀  
 Amaranthus spicatus hort. Eyst. simplici  
 paniculâ B. pin. ♀  
 Amaranthus tricolor hort. Eyst. Icon. Lob.  
 folio variegato B. pin. ♀  
 \* Amaranthus spica erecta viridi. ☞ ♀  
 \* Amaranthus spica erecta obsoletè rubra  
 ☞ ♀  
 \* Amaranthus spica erecta rubra, semine  
 albo. ☞ ♀  
 \* Amaranthus auriculatus luteus Christa-  
 tus. ☞ ♀  
 \* Amaranthus auriculatus luteus spicatus  
 ☞ ♀  
 \* Amaranthus auriculatus Phœniceus spi-  
 catus. ☞ ♀  
 \* Amaranthus auriculatus Phœniceus cri-  
 status. ☞ ♀  
 Ambrosia campestris repens B. pin. Coro-  
 nopus repens Lob. hist. Lugd. ♀  
 Ammi vulgare Dod. majus B. pin. ♀  
 Ammi Matth. ed. B. ♀



Amygdalus Dod. sativa B. pin.

Amygdalus pumila ☞ ☉

\* Amygdalus putamine fragili. ☞

Anagallis phœniceo flore B. pin. mas phœ-  
nicea Icon. Lob. ♀

Anagallis flore cœruleo B. pin. foemina cœ-  
rulea Icon. Lob. ♀

Anagallis tenuifolia Monnelli Clus. app.  
alt. ☉

Anagallis lutea nemorum B. pin. flavo flore  
Clus. ☉

Anagallis omnium minima. ☞ ♀

Anagallis aquatica major folio oblongo B.  
pin. Berula major Tab. ☉

Anagallis aquatica minor folio subrotundo  
B. pin. aquatica .s. Beccabunga Germa-  
norum Ad. Lob. ☉

Anagallis aquatica folio rotundo non cre-  
nato B. pin. aquatica tertia Icon. Lob. ☉

Anagallis aquatica angustifolia B. pin. aqua-  
tica quarta Icon. Lob. Eadem flore albo. ☉

Anagyris Dod. foetida B. pin.

Anagyris non foetida major vel Alpina B.  
pin. Laburnum Dod. Gall. ed.

Anchusa

*Anchusa puniceis floribus* B. pin. minor .f.

*Alcibiadion*, vel *Onochiles* Lob. ☉

*Anchusa lignosior angustifolia* Ad Lob.  
*angustifolia* B. pin. ☉

*Androsæmum* Dod. maximum frutescens B.  
pin. ☉

*Androsæmum Campoclarense* Col. Ascy-  
rum .f. *Hypericum bifolium glabrum non*  
*perforatum* B. pin. ☉

*Androsæmum alterum* Apulum Col. per-  
foliatum & perforatum B. pin. ☉

*Androsæmum alterum hirsutum* Col. hirsu-  
tum B. pin. ☉

*Androsæmum foetidum* .f. *Tragodes hort.*  
*Eyst.* ☉

*Anemone tenuifolia* flore simplici dilutè  
purpureo, ☉

*Anemone tenuifolia* flore simplici igneo. ☉

*Anemone tenuifolia* flore simplici viola-  
ceo, ☉

*Anemone tenuifolia* flore simplici albo, cir-  
ca caulem purpurascete. ☉

*Anemone tenuifolia* flore simplici ex albo  
rubescete, ☉

*Anemone*

Anemone tenuifolia flore simplici subalbido. ☉

Anemone tenuifolia flore simplici dilutè violaceo. ☉

Anemone flore pleno coccineo foliolis interius ianthinis, *Amaranthe*. ☉

Anemone flore pleno foliis & foliolis coccineis. *Double rouge*. ☉

Anemone flore pleno ex viridi rubescente, foliolis interius viridibus. ☉

Anemone ex albo & igneo variegata, *Orlate Romaine*. ☉

Anemone Orlate magis albescens, *Orlate d'Angleterre*. ☉

Anemone flore pleno flammeo. ☉

Anemone flore pleno dilutè violaceo. ☉

Anemone flore pleno exiguo albo. ☉

Anemone flore pleno hyacinthino. *Illustre de Leon*. ☉

Anemone florum mali persicæ quoad colorem æmula. ☉

Anemone multiplex flore Ranunculi. ☉

Anemone tenuifolia hermaphrodita. ☉

Anemone tenuifolia scala dicta. ☉

Anemone tenuifolia Aurelianensis flore pleno eleganter variegato. ☉

Anemone

Anemone tenuifolia flore pleno coccineo  
 Passæi Icon. tenuifolia multiplex purpu-  
 rea B. pin. *Cramosine*. ☉

Anemone latifolia pavo minus polyphylla  
 B. pin. hortensis latifolia pavo major se-  
 cunda Clus. ☉

Anemone tertia Matth. ed. B. Sylvestris pri-  
 ma Clus. Sylvestris alba major B. pin. ☉

Anethum Dod. hortense B. pin. ♀

Angelica major Dod. sativa B. pin. ♀

Angelica sylvestris Dod. Sylvestris major  
 B. pin. ♀

Angelica sylvestris minor .f. erratica B. pin.  
 Podagraria Germanica .f. Belgica Obs.  
 & Icon. Lob. ☉

Angelica montana maxima, Archangelica  
 Dod. Clus. ♀

Angelica lucida Canadensis Cornuti. ♀

Anisum Dod. ♀

Anonis spinosa flore purpureo B. pin. Ano-  
 nis Fuchf. Dod. Eadem flore albo quæ  
 Anonis flore albo Tab. ☉ Eadem non  
 spinosa purpurea. ☉ A-



nonis floribus luteis exiguis. Ononis lutea  
sylvestris minima Col. ☉

nonis non spinosa flore luteo variegato B.  
pin. Ononis flore luteo variegato non  
spinosa hort. Eyst. ☉

\* Anonis frutescens verna siliqua hirsuta  
pendula. ☿ ☉

\* Anonis siliqua hirsuta pendula flo. luteo,  
viscosa minor flo. pendulo B. prod. ♀

\* Anonis siliqua hirsuta pendula, flo. pur-  
pureo; minima hirsuta Cherleri J. B. ♀

nonis mitis annua purpurea. ☿ ♀

anthyllis prior lentifolia maritima Peplios  
effigie Ad. & Icon. Lob. Portlandiæ len-  
tifolia Penæ hist. Lugd. ☉

anthyllis marina incana alsinifolia Narbo-  
nensium Lob. maritima alsinifolia B.  
pin. ☉

antirrhinum majus rotundiore folio B. pin.  
Cynocephalus Plinij hist. Lugd. ♀

antirrhinum Dod. majus alterum folio  
longiori B. pin. ♀ Idem quod

Antirrhinum flore albo hort. Eyst. ♀

Antirrhinum flavescens Dod. descr. ♀  
B An-

Antirrhinum ex dilutè albo purpur af-  
cens Dod. descr. ♀

Antirrhinum arvense majus B. pin. primum  
Matth. ed. B. Idem flore albo. ♀

Aparine Dod. vulgaris B. pin. ♀

Aparine semine lævi, lævis Park. desc. ♀

Aparine fructu verrucoso. semine coriandri  
saccharati Park. desc. ♀

Apios Americana Cornuti. ☉

Apium hortense Dod. hortense .s. Petroselinum  
vulgò B. in pin. ♀

Apium vel Petroselinum crispum B. pin.

Petroselinum crispum Cam. hort. med. ♀

Apium hortense maximum B. prodr. ♀

Apium montanum folio tenuiore B. pin.

Petroselinum Dalechampii hist. Lugd. ♀

Apium montanum folio ampliore B. pin.

Oreoselinum Clus. ☉

Apium sylvestre .s. Thysselinum Dod. syl-  
vestre lacteo succo turgens B. pin. ☉

Apium palustre, & Apium officinarum B. pin.

Eleoselinum Dod. ♀

Apium Macedonicum B. pin. Petroselinum

Mace-

Macedonicum Ad. Lob. ☿

\* Apium peregrinum i. Clusii peregrinum fol. subrotundis C. B. P. ☉

Apocynum folio subrotundo B. pin. primum latifolium Clus. ☉

Apocynum folio oblongo B. pin. Periploca serpens angustiore folio Obs. & Icon. Lob. ☿

Apocynum majus Syriacum rectum Cornuti. ☉

Apocynum rectum minus Canadense Cornuti. ☉

\* Apocynum tertium latifolium Clus. hist; Periploca prior Dod. ☉

\* Apocynum Canadense foliis Androsæmi. ☿ ☉

\* Apocynum Canadense angustifolium flo. aureo. ☿ ☉

\* Apocynum Canadense maximum flore minimo herbaceo. ☿ ☉

quifolium Matth. ed. B. Ilex aculeata baccifera folio sinuato B. pin.

quilegia Fuchs. sylvestris B. pin. ☉

Eadem quæ

B 2

Aqui-

Aquilegia flore albo simplici hort. arifarum  
Eyst. ☉ Dio

Aquilina rubra Icon. Lob. ☉

Aquilegia pumila præcox Canadensis Cor. Aristolo  
nuti. ♀ ex pu

Aquilegia hortensis multiplex flore magno Aristolo  
B. pin. Aquileia multiplici flore cœrulea Aristolo  
Dod. ☉ titis va

Aquilegia flore pleno albo hort. Eyst. ☉ Aristolo

Aquilegia flore pleno incarnato hort. Eyst. stolo  
☉ Aristolo

Aquilegia flore pleno versicolori. ☿ ☉ Pistolo

Aquilegia flore roseo multiplici B. pin. stel. prim.  
lata flore purpureo hort. Eyst. ☉

Aquilegia stellata flore violaceo hort. Eyst. Artemisia  
☉ pin. ☉

Aquilegia stellata flore albo. ☉ \* Arte

Arbutus Dod. folio ferrato B. pin.

Argemone capitulo torulis canulato Obs. rum ver  
Lob. capitulo breviori B. pin. ♀ rum ver

Argemone capitulo longiore Obs. Lob. B. rum Fu  
pin. ♀ pin. ☉

\* Argemone capitulo Longiori glabro rum ma  
☿ ♀ culatu

Ari



rifarum angustifolium Dod. angustifolium  
Dioscoridis fortè B. pin. ☉

rristolochia rotunda Dod. rotunda flore  
ex purpurâ nigro B. pin. ☉

rristolochia longa Dod. longa vera B. pin. ☉

rristolochia clematidis recta B. pin. Clema-  
tidis vulgaris Clus. ☉

rristolochia, Pistolochia dicta B. pin. Pi-  
stolochia Clus. ☉

rristolochia, Pistolochia Cretica B. pin.

Pistolochia altera semper virens Clus. app.  
prim. ☉

Artemisia Matth. ed. B. vulgaris major B.  
pin. ☉

Artemisia variegatis foliis. ☿ ☉

rum venis albis B. pin. ☉

rum venis albis lituris nigris signatum. ☉

rum Fuchf. vulgare non maculatum B.  
pin. ☉

rum maculatum maculis nigris B. pin. ma-  
culatum Tab. ☉

rum maculatum maculis candidis B. pin.  
Cast. descr. ☉

Arum indicum amplo flore. ☿ ☉

Arum Ægyptium minus Veslingii Obs. in  
prosp. Alp. ☉

Arum maximum Ægyptiacum, quod vulgò  
Colocasía B. pin. Colocasía Ægyptia  
florida Veslingii Obs. in prosp. Alp. ☉

Arundo vallatoria .s. phragmites Obs. &  
Icon. Lob. vulgaris .s. phragmites Dios-  
coridis B. pin. ☉

Arundo donax .s. Cypria Dod. sativa B.  
pin. ☉

Arundo Indica variegata .s. Laconica  
Theophrasti Cornuti ☉

Arundo Indica florida, Cannacorus quorun-  
dam. Obs. & Icon. Lob. Indica latifolia  
B. pin. Canna Indica rubra hort. Eyst. ♀

Arundo Indica latifolia flore luteo puncta-  
to B. pin. Canna Indica lutea punctata  
hort. Eyst. ♀

Asarum Dod. B. pin. ☉

Asarum Canadense Cornuti. ☉

Asclepias Fuchf. albo flore B. pin. ☉

Asclepias angustifolia flore flavescente. ☉

Ascle-

*Asclepias nigro flore* B. pin. altera flore nigro Obs. Lob. ☉

*Ascyrum* Matth. ed. B. Dod. Lob. ☉

*Asparagus hortensis* Dod. sativa B. pin. ☉

*Asparagus marinus* Clus. maritimus crassifolius B. pin. ☉

*Asparagus foliis acutis* B. pin. *Corruda* prior Clus. ☉

*Asperula odorata* flore albo Dod. *Asperula*

.f. *Rubeola montana odora* B. pin. ☉

*Asperula cœrulea* Dod. cœrulea arvensis B. pin. ♀

\* *Asperula verticillata* Latifolia C. B. P. cruciata muralis Col. ♀

*Asphodelus albus ramosus* mas B. pin. major albus hort. Eyst. ☉

*Asphodelus albus non ramosus* B. pin. *Hastula regia* .f. *Asphodelus* Matt. ed. B. ☉

*Asphodelus luteus* Dod. luteus & flore & radice B. pin. ☉

*Asphodelus foliis fistulosis* B. pin. minor Clus. *Phalangium Cretæ Salonensis* Ad.

Lob. ♀

B 4

*Asple-*

Asplenium Dod. Ceterach officinarum B.  
pin. ☉

Aster luteus foliolis ad florem rigidis B. pin.

Aster primus Clus. ♀

Aster cernuus Col. atticus foliis circa florem  
mollibus B. pin. ♀

Aster montanus luteus salicis glabro folio  
B. pin. Austriacus secundus Clus. ☉

Aster conyzoides odoratus luteus hort.  
Eyst. ☉

Aster conyzoides Monspel. ♂ ♀

Aster atticus supinus Dod. luteus supinus  
B. pin. ♀

Aster luteus alatus Cornuti. ☉

Aster atticus Dod. atticus cœruleus vulga-  
ris B. pin. ☉

Aster præcox flore cœruleo majore. ♂ ☉

Aster elatior flore cœruleo minore. ♂ ☉

Aster montanus cœruleus magno flore foli-  
is oblongis B. pin. Alpinus cœruleo flore  
s. septimus Clus. ☉

Aster minor Narbonensium Tripolii flore,  
Linariæ folio Lob. Tripolii flore B. pin.

☉

Aster flore Tripolii latifolius. ♂ ☉

Asteriscus



*Asteriscus latifolius autumnalis* Cornuti. ☉

*Aster serotinus. Canadensis angustifolius*  
flo. cœruleo. ☿ ☉

*Aster flore Bellidis sylvestris minoris.* ☿ ☉

*Aster Canadensis annuus.* ☿ ♀ vide *Senecio.* ♀

*Astragalus Bæticus* Clus. *Bæticus lanuginosus* radice amplissima. B. pin. ☉

*Astragalus Monspeliensis* Clus. ♀

*Astragalus sylvaticus* Thal. *sylvaticus foliis oblongis glabris* B. pin. ☉

\* *Astragalus Monspeliensium* J. B. ☉

*Atractylis* Dod. *lutea* B. pin. ♀

*Atriplex sativa alba* Icon. Lob. *hortensis alba* s. pallidè virens B. pin. ♀

*Atriplex hortensis rubra* B. pin. *rubra* Tab. ♀

*Atriplex sylvestris vulgatiore sinuata* Lob. *sylvestris folio sinuato candicante* B. pin. ♀

*Atriplex sylvestris latifolia* B. pin. *Pes asserinus* Dod. ♀

*Atriplex sylvestris latifolia acutiore folio* B.

B. pin. Chenopodium, Pes anserinus secundus Tab. ♀

Atriplex sylvestris Mori fructu major, spinachia Baptist. ferarii. ♀

Atriplex sylvestris fragifera media, syl. baccifera Clus. hist. ♀

Atriplex sylvestris fragifera minor lappulas habens B. prodr. ♀

Atriplex foetida B. pin. vulvaria Tab. ♀

Atriplex sylvestris Polygoni, aut helxines foliis Obs. & Icon. Lob. angusto oblongo folio B. pin. ♀

Atriplex folio hastato .f. deltoide. ☞ ♀

Atriplex marina Dod. maritima laciniata B. pin. ♀

\* Atriplex procumbens folio sinuato crasso. ☞ ♀

\* Atriplex halimi folio C. B. P. halimoides Lob. Obs. ♀

\* Atriplex maritima sinuato folio C. B. prod. ♀

Avena Dod. vulgaris .f. alba B. pin. ♀

Avena nigra B. pin. ♀

Azedarach Dod.

## B

**B**ALSAMINA cucumerina punicea Obs.  
& Icon. Lob. rotundifolia repens .f.  
mas B. pin. ☿

Balsamina foemina persicifolia Obs. & Icon.  
Lob. foemina B. pin. ☿

\* Balsamina lutea .f. Noli me tangere C.  
B. P. Impatiens herba Dod. ☿

Barba caprae Fuchf. floribus oblongis B.  
pin. ☉

Barba caprae floribus compactis B. pin. ul-  
maria Clus. ☉

Barba Jovis hist. Lugd. B. pin.

Bellis major Dod. sylvestris caule folioso  
major B. pin. ☉

Bellis Alpina major rigido folio B. prod.  
☿ ☉

\* Bellis latioribus ferratis foliis, radice re-  
pente. ☿ ☉

Bellis ramosa umbellifera Cornuti. ☿

Bellis media hist. Lugd. sylvestris media  
caule

caule carens B. pin. ☉

Bellis minor sylvestris Fuchsi hist. Ludg.

Sylvestris minor B. pin. ☉

\* Bellis pratensis duplici florum serie. ☿

☉

Bellis hortensis multiplici flore Obs. Lob. ☉

Bellis minor flore multiplici albo hort. Eyst.

☉

\* Bellis hortensis flo. herbaceo. ☿ ☉

\* Bellis hortensis flo. prolifero. ☿ ☉

Bellis cœrulea caule folioso B. pin. cœrulea

.f. Globularia Monspeliaca Icon. Lob. ☉

Bellis cœrulea montana frutescens B. pin.

Scabiosa decima .f. repens Clus. ☉

Bellis lutea foliis profundè incisis major B.

pin. Chrysanthemum segetum Obs. &

Icon. Lob. ☿

\* Bellis tanacetii fol. glabris. ☉ Vide tana-  
cetum inodorum.

\* Bellis tanacetii fol. hirsutis. ☉

Berberis dumetorum B. pin. vulgaris Clus.

\* Beta marina spontanea Lob. Obs. ☿

Beta alba Matth. ed B. alba vel pallefcens

quæ cicla officinarum B. pin. ☿

Beta



Beta rubra vulgarior Obs. & Icon, Lob. rubra vulgaris B. pin. ♀

Beta rubra radice Rapæ B. pin. rubra Romana Dod. ♀

Beta rubra radice Rapæ costâ & foliis latioribus. ♀

Beta ficula costâ amplâ aureâ. ♂ ♀

Beta Cretica semine aculeato B. prodr. ♀

Betonica Dod. purpurea B. pin. ♂

Betonica flore albo Matth. ed. B. alba B. pin.

⊙

Betonica major Danica Park. ♂

\* Betonicæ folio alopecuros quorundam J. B. ♂

Betula Dod. B. pin.

Bistorta Dod. major radice minus intorta B. pin. ♂

Bistorta major radice magis intorta B. pin. Serpentaria mas, sive Bistorta Fuchf. ♂

\* Bistorta minor nostras Park. ♂

Blattaria Fuchf. Matth. ed. B. lutea folio longo laciniato B. pin. ♀

Blattaria alba, Verbasculum Tab. alba B. pin. ♀ Blattaria

- \* *Blattaria folio verbasci incano, amplo luteo flore.* ☞ ♀
- \* *Blattaria perennis flo. cœruleo.* ☞ ○
- \* *Blattaria perennis flo. carneo.* ☞ ○
- \* *Blattaria perennis flo. Gilvo.* ☞ ○

*Blitum album Matth. ed. B. album majus*  
B. pin. ♀

*Blitum minus Dod. album minus B. pin.* ♀

*Blitum polyspermon Tab. B. pin.* ♀

*Blitum rubens Dod. rubrum majus B. pin.* ♀

*Blitum rubrum supinum Icon, Lob. rubrum minus B. pin.* ♀

*Botrys Dod. ambrosioides vulgaris B. pin.* ♀

*Botrys ambrosioides Mexiocana B. pin. app. descr.* ♀

*Botrys chamædryoides B. pin. Chamædryslaciniatis foliis Obs. & Icon, Lob.* ♀

*Brassica capitata albida Dod. capitata alba*  
B. pin. ♀

*Brassica Sabauda Hyberna Icon. Lob. alba capite oblongo non penitus clauso B. pin.* ♀

*Brassica capitata polycephalos hist. Lugd.*

ex

ex capitibus pluribus conglobata B. pin.

♀

Brassica rubra capitata Dod. .B pin. ♀

Brassica gongylodes Matth. ed. b. ejusdem  
pin. ♀

Brassica dicta, Napobrassica B. pin. ♀

Brassica cauliflora Dod. B. pin. ♀

Brassica vulgaris sativa Dod. alba vel viri-  
dis B. pin. ♀

Brassica rubra B. pin. Cumana .s. rubra Dod.  
Gall. ed. ♀

Brassica crispa Matth. ed. B. alba crispa B.  
pin. ♀

Brassica asparagodes Dalechampii hist.  
Lugd. asparagodes crispa B. pin. ♀

Brassica fimbriata Obs. & Icon. Lob. B. pin.  
♀

Brassica Anglica minima Ad. Lob. fimbri-  
ata pumila B. pin. ♀

Brassica Selinisia latifolia Tab. Lato Apii  
folio B. pin. ♀

Brassica selinoides Dod. angusto Apii folio  
B. pin. ♀

Brassica sylvestris Dod. arvensis B. pin. ♀

Brassica marina sylvestris monospermos Pe-  
næ hist. Lugd. maritima B. pin. ♂

Brassica

*Brassica sylvestris perfoliata* Dod. *Campestris perfoliata* flore albo B. pin. ♀

*Brassica sylvestris foliis circa radicem cichoraceis* B. pin. *Sinapi album hist.* Lugd. ☉

*Brassica sylvestris foliis integris, & hispidis* B. pin. *Turritis* Icon. Lob. ☉

\* *Brassica syl. ramosa tota pene Glabra* B. pin. *Turritis maj. plateau Clus.* ☉

*Brunella major folio non dissecto* b. pin. *Brunella* Dod. Eadem flore albo. ☉

*Brunella folio laciniato* B. pin. *Symphytum petraeum* Obs. & Icon. Lob. Eadem flore albo, & roseo. ☉

*Brunella hyssopyfolia* B. phytop. ☉

*Brunella coerulea magno flore hort.* Eyst. B. pin. ☉

\* *Brunella Alpina folio glabro, angusto integro.* ☉ ☉

*Bryonia alba* Dod. *aspera .s. alba baccis rubris* B. pin. ☉

*Bryonia sylvestris, Sigillum Mariæ* Ad. Lob. *lavis .s. nigra racemosa* B. pin. ☉

*Buglossum latifolium, Borrago* B. pin. *Borragero*



- Borrage Dod. Idem flore albo. ☞  
 Buglossum sempervirens Ad. & Icon. Lob.  
 latifolium sempervirens B. pin. ☉  
 Buglossum sempervirens minus. Symphy-  
 tum pumilum repens Borrage facie  
 Obs. & Icon. Lob. ☉  
 Buglossum angustifolium majus B. pin. an-  
 gustifolium Obs. & Icon. Lob. ☞  
 Buglossum minus sativum Dodonæi hist.  
 Lugd. angustifolium minus. B. pin. ☞  
 Buglossum sylvestre minus B. pin. minus syl-  
 vestre Dodonæi hist. Lugd. ☞  
 Buglossum sylvestre caulibus procumbenti-  
 bus B. pin. Alyssum Germanicum echioi-  
 des Obs. & Icon. Lob. ☞  
 \* Buglossum Lusitanicum bullatis foliis.  
 ☞ ☞ ☞  
 \* Buglossum procumbens annuum pullo  
 minimo flo. ☞ ☞  
 \* Buglossum luteum minimum nobis,  
 Echioïdes lutea Apula minima campe-  
 stris. Col. ☞  
 Bulbocastanum majus folio Apii B. pin.  
 Bulbocastanum Dod. ☉

*Bulbus eriophorus* Clus. *eriphorus Orientalis* B. pin. ☉

*Buphtalmum lanuginosum foliis millefolii*  
B. pin. *Chrysanthemum valentinum*  
Clus. ☉

*Bupleurum angustifolium* Dod. folio subrotundo .s. vulgatissimum B. pin. ☉

*Bupleuron angustissimo folio* B. pin. minimum Col. ♀

*Bursa pastoria* Dod. *pastoris major* folio sinuato B. pin.

*Bursa pastoria minor* Dod. ♀

*Bursa pastoris major* loculo oblongo B. pin.

*Draba minima muralis discoïdes* Col. ♀

*Bursa pastoris minor* loculo oblongo B. pin.

*Paronychia alsine* folia Obs. & Icon. Lob. ♀

*Bursæ pastoris similis filiquosa major* B. pin.

*Aizoon telephium Dalechampii* hist.

Lugd. ♀

*Buxus Fuchf. arborescens* B. pin.

*Buxus humilis* Dod. descr. foliis rotundioribus B. pin.

*Buxus foliis aureis.* ☿

## C

- \* **C**ACALIA tomentosa B. prod. ☉  
 \* Cacalia glabro folio Clus. ☉  
 \* Cacalia foliis crassiss hirsutis B. pin. Ghi-  
 ni Lugd. ☉
- \* Cachris forulaceis foliis sem. fungoso  
 lævi. ☉ ☉  
 \* Cachris Peucedani folio semine fungoso  
 sulcato lævi. ☉ ☉  
 \* Cachris Peucedani folio semine fungoso  
 sulcato aspero. ☉ ☉
- Cæpa capitata Matth. ed. B. vulgaris B. pin.  
 Cæpa scetilis Matth. ed. B. ☉  
 Cæpa Ascalonica Matth. ed. B. sterilis B.  
 pin. ☉
- \* Calceolus Mariæ luteus C. B. Pin. desc.  
 ☉  
 \* Calceolus Mariæ albus C. B. P. desc. ☉

*Calamintha montana vulgaris* Obs. & Icon.

Lob. vulgaris, vel officinarum Germaniæ  
B. pin. ☉

*Calamintha montana præstantior hort.* Eyft.  
magno flore B. pin. ☉

*Calamintha vulgaris* exiguo flore B. pro-  
dr. ☉

*Calamintha arvensis verticillata* B. pin.  
aquatica Matthioli hist. Lugd. ☉

\* *Calamintha altera* gravi odore *Pulegii*  
Lob. adv. odore *Pulegii* s. *nepeta* C, B, P. ☉

*Caltha vulgaris* B. pin. *Calendula* Dod.

Eadem flore citrino. ☿

*Caltha polyanthos major* B. pin. *Calendula*  
lutea flore pleno hort. Eyft.

Eadem quæ

*Calendula sativa polyanthos melina*

Tab. ☿

*Caltha arvensis* B. pin. *Calendula arvensis*

Tab. ☿

*Caltha palustris* Dod flore simplici B. pin. ☉

*Caltha palustris* flore pleno Clus. ☉

*Campanula minor rotundifolia* Obs. &

Icon. Lob. minor rotundifolia vulgaris  
B.



B. pin. Eadem flore albo. ☉

Campanula minor rotundifolia Alpina B.  
pin Clus. descr. ☉

Campanula maxima foliis latissimis B. pin. ☉

Campanula hortensis Rapunculi radice B.  
pin. Trachelium in maritimis Ad. Lob. ☉

Campanula hortensis folio & flore oblongo  
B. pin. Viola mariana Dod. Eadem  
flore subalbido. ♀

Campanula vulgarior foliis Urticæ B. pin.  
Cervicaria major Dod. Eadem duplici  
florum serie, & flore albo. ☉

Campanula foliis Echii B. pin. Cervicaria  
major tenuifolia Thal. Echium menta-  
num Dal. hist. Lugd. ♀

Campanula pratensis flore conglomerato B.  
pin. Trachelium minus hist. Lugd.  
Eadem flore albo. ☉

Champhorata hirsuta B. pin. Monspeliaca  
Icon. Lob. ☉

Champhorataæ congener B. pin. Anthyllis al-  
tera Italarum Obs. & Icon. Lob. ♀

Cannabis mas hist. Lugd. sativa B. pin. ♀

Cannabis foemina hist. Lugd. ♀

*Cannabis lutea sterilis Contareni prosp.*  
*Alp. exot. ☉*

*Capparis retuso folio Obs. Lob. Spinosa*  
*fructu minore folio rotundo B. pin. ☉*

*Capparis fabago Dod. portulacæ folio B.*  
*pin. ☉*

*Carduus pratensis Tragi, Acanthii facie Ad.*  
*Lob. ☉*

*Carduus bulbosus Monspel. Ad. & Icon.*  
*Lob. pratensis Asphodeli radice latifolius B. pin. ☉*

*Carduus vinearum repens folio Sonchi B.*  
*pin. Ceanothos Theophrasti Col.*  
*Idem flore albo. ☉*

*Carduus mollis foliis Helenii B. pin. mollis*  
*Camerarii Clus. ☉*

*Carduus albis maculis notatus vulgaris B.*  
*pin. Leucographus Dod. ☿*

\* *Carduus Mariæ hirsutus cap. minore,*  
 ☿ ☿

\* *Carduus Mariæ non maculatus. ☿ ☿*

*Carduus albis maculis notatus exoticus B.*  
*pin. lacteus Syriacus Cam.*  
*Idem flore albo. ☿*

*Carduus*

Carduus albis maculis notatus exoticus minor Gataclites J. B. ♀

Carduus sphærocephalus Dod. sphærocephalus latifolius vulgaris B. pin. ☉

Carduus sphærocephalus cœruleus minor B. pin. Crocodilium Monspeliensium Dal. hist. Lugd. ☉

Carduus sphærocephalus acutus Dod. Sphærocephalus capitulo longis spinis armato B. pin. ☉

\* Carduus sphærocephalus annuus Bœticus minor. ♂ ♀

Carduus eriocephalus Dod. capite rotundo tomentoso B. pin. ♀

Carduus asininus capite maj. nutante. Onopyxus tertius Dalech. hist. Lugd. ♀

Carduus asininus capite maj. nutante flore albo. Acanthium sylvestre flore albo hort. Eyst. ♀

Carduus asininus capitulis parvis. Sylvestris primus Dod. ♀

Carduus spinosissimus vulgaris, Polyacantha Theophrasti Obs. & Icon. Lob. Spinossissimus angustifolius vulgaris B. pin. ☉

Carduus Polyacanthæ æmulus capite nutante. ♂ ♀

*Carduus lanceolatus* Tab. lanceatus latifolius B. pin. Idem flore albo. ♀

*Carduus stellatus* Dod. stellatus foliis papaveris erratici B. pin. Idem flore albo ♀

*Carduus stellatus luteus* foliis cyani B. pin. Spina solstitialis Dod. ♀

*Carduus solstitialis capitulis minus spinosis.* Spina solstitialis mitior Apula Col. ♀

\* *Carduus Leucoii* foliis, subtus incanis. ♂ ♀

*Carlina herbariorum* Obs. Lob. acaulos magno flore B. pin. ☉

*Carlina caulescens* magno flore B. pin. elatior, Chamæleon albus vulgaris Clus. ☉

*Carlina acaulos* minore purpureo flore B. pin. *Carduus acaulis* Septentrionalium Obs. & Icon. Lob. ☉

*Carpinus* Matth. ed. B. Dod.

*Carum* Dod. *Cuminum pratense*, Carvi officinarum B. pin. ♀

*Caryophyllata* Dod. vulgaris B. pin. ☉

*Caryophyllata* vulgaris majore flore B. pin. Sylvestris Fuchf. ☉ Cary-



*Caryophyllata montana prima* Clus. aquatica nutante flore B. pin. ☉

*Caryophyllata montana minor* flore nutante. ☉

*Caryophyllata major rotundifolia* Obs. & Icon. Lob. alpina lutea B. pin. ☉

*Caryophyllata alpina omnium minima* Pon. descr. mont. Bald. alpina minor B. pin. ☉

*Caryophyllus maximus ruber* B. pin. maximus plenus flore rubro hort. Eyst. ☉

*Caryophyllus multiplex* flore albo hort. Eyst. ☉

*Caryophyllus multiplex maximus variegatus* hort. Eyst. ☉

*Caryophyllus hortensis simplex* flore majore B. pin. *Caryophylleus flos simplex* Dod. ☉

*Caryophyllus arborescens* Creticus B. prodr. Sylvestris arboreus Prosp. Alp. de exot. ☉

*Caryophyllus simplex* flore minore pallidè rubente B. pin. Sylvestris tertius flore pallido suaverubente Icon. Lob. ☉

*Caryophyllus simplex supinus latifolius* B. pin. minimus pulchellus supinus maculis aureis, argenteisve aspersus Icon. Lob. ☉

*Caryophyllus*

**Caryophyllus barbatus flore multiplici B.**  
 pin. armerius pleno flore Clus. Idem  
 flore albo. ☉

**Caryophyllus barbatus hortensis latifolius**  
 B. pin. Viola barbata latifolia hist. Lugd.

Idem qui

Flos armerius ruber hort. Eyst. ☉

Flos armerius albus ejusdem.

Flos armerius variegatus ejusdem.

**Caryophyllus barbatus sylvestris B. pin.**

Viola barbata angustifolia hist. Lugd. ☿

**Caryophyllus sylvestris prolifer B. pin.** ar-  
 meria prolifera Icon. Lob. ☿

**Caryophyllus montanus primus Tab. sylve-**  
 stris vulgaris latifolius B. pin. ☉

**Caryophyllus flore tenuissimè dissecto B.**  
 pin. Caryophylleus minor Dod. ☉

Idem qui

**Caryophyllus plumarius albus Tab.**

**Caryophyllus omnium humillimus. ☿ ☉**

**Caryophyllus pratensis flore laciniato sim-**  
 plici .s. flos cuculi B. pin. Odontitis Pli-  
 nii simplici flore Clus. ☉

Idem flore albo.

**Caryophyllus pratensis flore pleno B. pin.**  
 Odontitis pleno flore Clus. ☉

**Caryophyllus**

*Caryophyllus sylvestris* alter flore laciniato  
odoratissimo B. pin. *Sylvestris* sextus  
Clus. ☉

*Caryophyllus holostius* Icon. Lob. *arvensis*  
*hirsutus* flore majore B. pin. ☉

*Caryophyllus holostius tomentosus* angu-  
stifolius B. prodr. ☉

*Caryophyllus arvensis umbellatus* folio gla-  
bro B. pin. *Alpine verna* Dal. hist. Lugd.

♀

*Caryophyllus arvensis glaber* flore majore  
B. pin. *Gramen leucanthemum* Dod. ☉

*Caryophyllus arvensis glaber* flore minore  
B. pin. *Gramen floridum minus* Tab. ☉

*Caryophyllus holostius Alpinus gramineus*  
B. prodr. ☉

*Caryophyllus montanus major* flore globo-  
so B. pin. *Statice* hist. Lugd. ☉

*Caryophyllus montanus minor* flore globo-  
so B. pin. *Gramen polyanthemum minus*  
Dod. ☉

*Caryophyllus minimus* flore globoso. ☿  
☉

*Caryophyllus minimus muralis* B. pin. *Tu-  
nica minima* hist. Lugd. ♀

Castanea

Castanea Dod.

Castanea equina Clus. folio multifido B pin.

Caucalis maxima sphondylii aculeato semine B. pin. major Clus. vide Tordylium. ♀

Caucalis arvensis echinata latifolia B. pin. echinophora quarta major πλατύφυλλον purpurea Col. Eadem flore albo. ♀

Caucalis arvensis echinata magno flore B. pin. albo flore Clus. ♀

Caucalis arvensis echinata parvo flore & fructu B. pin. echinophora tertia λεπτόφυλλον purpurea Col. ♀

Caucalis Monspeliaca echinato magno fructu B. pin. Lappa boaria Plinii hist. Lugd. ♀

Caucalis nodoso echinato semine B. prodr. ♀

Caucalis folio Peucedani B. pin. Anglica Tab. ☉

Cedrus folio Cupressi major fructu flavesciente B. pin. Oxycedrus Lycia Dod.

\* Cedrus folio cupressi minor C. B. P.

Centaureum majus folio in lacinijs plures diviso B. pin. magnum Dod. ☉

Centaurei-



*Centaurium foliis Cinaræ Cornuti.* ☉

\* *Centaurium Rha capitatum* fol. *Enulæ*  
*Lugd.* ☉

*Centaurium majus luteum* Cornuti. *Alpinum luteum* B. prodr. ☉

*Centaurium minus* Dod B. pin. Idem quod

*Centaurium minus album* Tab. ♀

*Centaurium luteum perfoliatum* B. pin.  
parvum flavo flore Clus. ♀

*Centaurium luteum pusillum* B. pin. luteum novum Col. ♀

*Centaurium minimum* purp. ♂ ♀

*Cepæa* Clus. ♀

*Cerasus fructu acidulo* Dod. descr. *Cerasus austera* Matth. Ed. B.

*Cerasa crassa carne dura* B. pin. *Duracina* hist. Lugd. descr.

*Cerasus* Dod. major, ac sylvestris fructu subdulci nigro colore inficiente B. pin.

*Cerasus hortensis* flore roseo B. pin. multiflora Tab.

*Cerasus folio laurino* B. pin. *Laurocerasus* Clus.

*Cerasus pumila* B. pin. *Chamæcerasus* Dod.  
*Cerasus*

*Cerasus racemosa sylvestris fructu non eduli* B. pin. *Cerasus avium racemosa* Icon. Lob.

*Ceraso affinis* B. pin. *Mahaleb Matthioli* hist. Lugd.

*Cerithe quorundam major versicolore flore* Clus. *Cerithe*, sive *Cynoglossum montanum majus* B. pin. ♀

*Cerithe major quorundam flore ex rubro purpurascente* Clus. descr. *flore ex rubro purpurascente* B. pin. ♀

*Cerithe quorundam major flavo flore* Clus. *flore flavo asperior* B. pin. ♀

*Chærophyllum sativum* B. pin. *Cherifolium* Dod. ♀

*Chærophyllum sylvestre* B. pin. *Anthriscus Plinii* hist. Lugd. ♀

*Chamæcerasus alpina fructu rubro gemino* duobus punctis notato B. pin. *Xylosteum alterum* Dod.

*Chamæcerasus dumetorum fructu gemino rubro* B. pin. *Xylosteum* Dod.

*Chamæcistus*

*Chamæcistus vulgaris* flore luteo B. pin. primus Clus. ☉

*Chamæcistus* foliis minoribus, & incanis B. pin. quintus Clus. quoad figuram, quartus deser. ☉

*Chamæcistus* foliis Myrti minoris incanis B. pin. tertius Clus. ☉

*Chamæcistus angustifolia* B. pin. sextus Clus.

☉

\* *Chamæcistus Halimi folio.* ☉ ☿

\* *Chamæcistus parvo flo. luteo J. B. an Serpilli folio nigricante et hirsuto flo. aureo odorato eidem.* ☉

*Chamæcistus annuus.* ☿ ♀

*Chamædrys repens minor* Dod. B. pin. Eadem flore albo. ☉

*Chamædrys alpina cisti flore* B. pin. montana frutescens durior Ad. Lob. ☉

*Chamædrys alpina minima hirsuta* B. prodr. ☉

*Chamædrys spuria major angustifolia* B. pin. Veronica supina facie Teucris praetensis Icon. Lob. ☉

*Chamædrys spuria minor rotundifolia* B. pin. Teucrium officinarum Obs. Lob. ☉

*Chamægenista*

*Chamægenista foliis Genistæ vulgaris* B. pin.  
prima Clus. ☉

*Chamægenista sagittalis* B. pin. secunda  
Clus. ☉

*Chamæiris variegata* B. pin. cœruleo, & vi-  
olaceo colore hort. Eyf. ☉

*Chamæiris minor flore purpureo* B. pin. Iris  
minor Dod. ☉

*Chamæiris flore pallidè luteo* B. pin. ☉

*Chamæiris flore obsoleto pallido* B. pin.  
latifolia minor sexta Clus. ☉

\* *Chamæleon niger cortusi* Dod. niger  
Lob. Obs. ☉

*Chamæmelum vulgare* Dod. vulgare leu-  
canthemum Dioscoridis B. pin. ☉

*Chamæmelum nobile* .s. odgratius B. pin.  
odoratum Dod. ☉

*Chamæmelum nobile flore multiplici* B. pin.  
Romanum flore multiplici hort. Eyf. ☉

*Chamæmelum nudum capitulo aphylo* B.  
pin. Anthemis chrysanthemos Penæ &  
Lobellii hist. Lugd. ☉

*Chamæmelum inodorum* B. pin. Cotula  
non



non foetida Dod. Gall. ed. Idem flore pleno. ☉

Chamæmelum foetidum B. pin. Cotula foetida Dodonæi hist. Lugd. ☿

Chamæmespilus Gesneri Clus. Epimelis hist. Lugd.

Chamæpitys moschata foliis ferratis B. pin. Spuria prior, sive Anthyllis altera Dod. ☉

Chamæpitys lutea vulgaris .s. folio trifido B. pin. Ajuga .s. Chamæpitys mas Dioscoridis Obs. & Icon. Lob. ☿

Chamæsyce Dod. B. pin. ☿

Chamelæa tricoccus hist. Lugd. B. pin. ☉

Chelidonium majus vulgare B. pin. majus Dod. ☉

Chelidonium majus foliis quernis B. pin. majus laciniato flore Clus. ☉

Chelidonium majus foliis tenuissimè dissectis. ☿ ☉

Chelidonium maximum Canadense *argutus* Cornuti descr. ☉

D

Cheli-

*Chelidonium minus* hist. Lugd. *Cheledonia*  
*rotundifolia minor* B. pin. ☉

\* *Chelidonium minus* flo. pleno Park. ☉

*Chondrilla juncea viscosa arvensis* B. pin.  
*viminea viscosa* Penæ hist. Lugd. ☉

*Chondrilla viscosa humilis* B. prodr. ♀

*Chondrilla verrucaria foliis intubaceis vi-*  
*ridibus* B. pin. *Cichorium verrucatum*,  
*Zacintha* Clus. ♀

*Chondrilla cœrulea altera cichorii sylve-*  
*stris foliis* B. pin. *cœrulea cichorii sylve-*  
*stris laciniosis foliis* Obs. Lob. ☉

*Chondrilla foliis laciniatis serratis purpu-*  
*rascente flore* B. pin. *rara purpurea* Lo-  
*belij* hist. Lugd. ♀

*Chondrilla cœrulea cyani capitulo* B. pin.  
*Sesamoïdes parvum* Matth. ed. B. ☉

*Chrysanthemum flore partim candido par-*  
*tim luteo* B. pin. *Creticum mixtum hort.*  
*Eyft.* ♀

*Chrysanthemum majus folio profundius*  
*laciniato magno flore* B. pin. *luteum hort.*  
*Eyft.* ♀

*Chrysanthemum alpinum incanum foliis*  
*lacini-*

laciniatis B. pin. alpinum primum Clus. ☉  
 Chrysanthemum tenuifolium Hispanicum.



Chrysanthemum alpinum foliis Abrotani  
 multifidis B. pin. Achillea montana Pe-  
 næ hist. Lugd. ☉

\* Chrysanthemum Myconi Lugd. Bellis  
 lutea fol. subrotundis C. B. P. ♀

\* Chrysanthemum tenuifolium Eyst. Bup-  
 thalmum Matthioli Lob. ♀

Cicer arietinum Dod. sativum B. pin. Idem  
 flore & fructu rubro B. pin. descr. ♀

\* Cicer Arietinum fructu nigro. ♀

Cicer sylvestre herbariorum Obs. Lob. syl-  
 vestre foliis oblongis hispidis majus B.  
 pin. ♀

Cichorium latioris folii Dod. sativum B.  
 pin. ♀

Cichorium sylvestre Matth. ed. B. sylve-  
 stre .f. officinarum B. pin. Idem flore  
 albo & purpureo. ♀

Cichorium montanum angustifolium hirsu-  
 tie asperum B. pin. Hieracium intyba-  
 ceum asperum Tab. ☉

*Cicuta* Dod. major B. pin. ♀  
*Cicuta* minor Petroselino similis B. pin. *Ci-*  
*cutaria* fatua Ad. & Icon. Lob. ♀

\* *Cicutaria* latifolia foetidissima Ger. Sefeli  
*Peleponense* Lugd. ☉

*Cicutaria* palustris tenuifolia B. pin. *Phel-*  
*landryum* Dod. ☉

*Cinara* hortensis foliis non aculeatis B. pin.  
 non aculeata Dodonæi hist. Lugd. ♀

*Cinara* hortensis non aculeata capite subru-  
 bente. ♀

*Cinara* hortensis aculeata B. pin. *Scolymus*  
*Dioscoridis*, *Cactos* Theophrasti Clus. ♀

*Cinara* maxima Anglica Icon. Lob. *Scoly-*  
*mus*. f. *Cinara* maxima hort. Eyst. ♀

*Cinara* spinosa cujus pediculi eitantur B.  
 pin. *Carduus* aculeatus Matth. ed B. ♀

*Cirsium* maximum *Asphodeli* radice B. pin.  
 maximum montanum incano folio bul-  
 bosa radice quintum Clus. descr. ☉

*Cirsium* majus singulari capitulo magno,  
 vel incanum variè dissectum B. pin. An-  
 glicum Obs. & Icon. Lob. ☉

*Cistus*

*Cistus* ma  
 prin  
*Cistus* fe  
 Clus.  
*Cistus* fo  
 lio sal  
*Cistus* an  
 mont.  
 cula in  
 Id  
*Cistus* le  
 primi  
*Cistus* le  
 nense  
 \* *Cistus*  
 folio n  
 \* *Cistus*  
*Clematis*  
 gene T  
*Clematis*  
 mula D  
*Clematis*  
 mula a  
*Clematis*  
 pannor



Cistus mas folio oblongo incano B. pin. mas  
primus Clus. ☉

Cistus fœmina folio salviæ B. pin. fœmina  
Clus. ☉

Cistus folio salicis B. pin. humilis annuus fo-  
lio salicis humilis Obs. Lob. ☿

Cistus annuus flore guttato Ponzæ descr.  
mont. Bald. flore pallido punicante ma-  
cula insignito B. pin. ☿

Idem flore non maculoso.

Cistus ledon foliis laurinis B. pin. Cisti ledi  
primi altera species Clus. descr. ☉

Cistus ledon quintum Clus. ledon Narbo-  
nense Tab. ☉

\* Cistus mas folio rotundo hirsut. C.B.P.  
folio rotundiore Matth. Lugd. ☉

\* Cistus Rosmarini folio. ☉

Clematidis sylvestris latifolia B. pin. Atra-  
gene Theophrasti Clus. ☉

Clematis .s. flammula repens B. pin. Flam-  
mula Dod. ☉

Clematis .s. flammula recta B. pin. Flam-  
mula altera surrecta Obs. Lob. ☉

Clematidis cœrulea erecta B. pin. cœrulea  
pannonica hort. Eyst. ☉

*Clematitis cœrulea vel purpurea repens* B.  
pin. peregrina purpurea simplici flore  
hort. Eyft. ☉

*Clematitis cœrulea flore pleno* B. pin. pere-  
grina purpurea flore pleno hort. Eyft. ☉

\* *Clematis peregrina flore parvo rubro.* ☉

\* *Clematis peregrina flore parvo albo.* ☉

*Clematitis trifolia flore roseo clavato* B. pin.  
Granadilla, Flos passionis hist. Mex. ☉

*Clematis, seu flos passionis flore viridi.* Mu-  
ruciæ species foliis hederæ scandentis  
Georgii Marcgravii. In hist. Bras. ☉

*Clematis tetraphyllos Americana.* ☉ ☉

*Clematis daphnoïdes minor* B. pin. Cle-  
matis daphnoïdes Dod. ☉

*Clematis daphnoïdes flore purpureo* hort.  
Eyft. ☉

*Clematis daphnoïdes major* Dod. B. pin. ☉

*Clinopodium Matth. Clus. Origano simile*  
B. pin. ☉

*Clinopodium vulgare* Clus. arvense Ocimi  
facie B. pin. ☿

\* *Clinopodium Austriacum* Ponæ. ☉

*Cneorum Matthioli* Clus. Thymelææ affinis  
facie externa B. pin. ☉. Cne-

**Cneoron album** folio Oleæ argenteo molli  
B. pin. Dorycnium Plateau Clus. ☉

**Cnicus vulgaris** Clus. sativus. s. Carthamum  
officinarum B. pin. ☿

**Cnicus cœruleus asperior** B. pin. alter Clus.  
cœruleo flore. ☉

**Cnicus sylvestris hirsutior** s. Carduus bene-  
dictus B. pin. Carduus benedictus Dod. ☿

**Cochlearia** Dod. folio subrotundo B. pin. ☿

\* **Cochlearia Armorica** flore parvo sub-  
purpureo. ☿ ☉

\* **Cochlearia Britannica** Lob. Dod. folio  
sinuato C. B. P. ☉

**Colchicum commune** B. pin. vulgare flore  
purpurascens hort. Eyst. vulgare album  
ejusdem. ☉

**Colchicum commune** folio lineis albis pi-  
cto. ☿ ☉

**Colchicum polyanthes** lato hellebori albi  
folio B. pin. Byzantinum πλατύφυλλον Clus. ☉

**Colchicum candidum multiflorum** B. pin.  
Pannonicum πολύανθες albo flore Clus. ☉

**Colchicum variegatum** Cornuti. ☉

Colchicum pleno flore Clus. B. pin. ☉  
 Colechicum luteum majus B. pin. Narcissus  
 autumnalis major Clus. ☉

\* Colchicum foliorum oris luteis. ☿ ☉

Colocynthis pyriformis .s. pepo amarus B.  
 pin. pyriformis Obs. Lob. Pseudocolo-  
 cynthis pyri formâ hort. Eyst. ♀

Colutea vesicaria Matthioli hist. Lugd. ve-  
 sicaria B. pin. ☉

Colutea filiquosa .s. scorpioïdes major B.  
 pin. Scorpioïdes prima elatior Clus. ☉

\* Colutea scorpioïdes maritima glauco  
 folio B. in prod. ☉

\* Colutea humilis Buxi foliis nobis, Ano-  
 nimos flore coluteæ Clus. Pseudochama-  
 buxus Eyst. ☉

Consolida media pratensis cœrulea B. pin.  
 Bugula Dod. Eadem flore albo & car-  
 neo ☉

Consolida media foliis hirsutis. Eadem flore  
 albo & carneo. ☉

Consolida regalis hortensis flore minore B.  
 pin.



pin. Delphinium elatius simplici flore  
Clus. Eadem flore albo & carneo. ♀

Consolida regalis multiplicato violaceo  
flore hort. Eyst. ♀

Consolida regalis multiplicato incarnato  
flore hort. Eyst. ♀

Consolida regalis flore pleno albo hort.  
Eyst. ♀

Consolida regalis flore pleno rubro hort.  
Eyst. ♀

Consolida regalis flore multiplici cinericeo  
hort. Eyst. ♀

Consolida regalis flore pleno variegato. ♂  
♀

Consolida regalis arvensis B. pin. Flos re-  
gius sylvestris Dod. ♀

Consolida regalis latifolia parvo flore B.  
prodr. ♀

\* Consolida regalis hortensis flore minore  
versicolori. ♂ ♀

Convulvulus major albus B. pin. Smilax læ-  
vis major Dod. ☉

Convulvulus minor arvensis B. pin. Smilax  
lævis minor Dod. ☉

\* Convulvulus virginianus nobis Battatas  
camnotes

camnotes Hispanorum Clus. fifarum Peruvianum Ger. Tab. ☉

Convolvulus minor semine triangulo B. pin. Helxine cissampelos altera Atriplicis effigie Lob. ♀

Convolvulus cœruleus hederaceo anguloso folio B. pin. asureus .s. cœruleus Obs. Lob. ♀

Convolvulus purpureus folio subrotundo B. pin. Indicus flore violaceo hort. Eyst. ♀

Convolvulus peregrinus cœruleus folio oblongo B. pin. & prodr. ♀

Convolvulus minimus spicæfolius Obs. Lob. Linariæ folio B. pin. ☉

Convolvulus minor argenteus radice repente. ☼ ☉

Convolvulus hederaceus perennis. ☼ ☉

Conyza major vera Ad. Lob. mas Theophrasti, major Dioscoridis B. pin. ☉

Conyza minor vera Ad. Lob. fœmina Theophrasti, minor Dioscoridis B. pin. ♀

Conyza major vulgaris B. pin. Baccharis Monspeliensium Obs. & Icon. Lob. ☉

Conyza pannonica lanuginosa B. pin. tertia Austriaca Clus. ☉

Conyza

*Conyza cœrulea acris* B. Pin. *Erigeron*  
*quartum* Dod. ☉

*Conyza helenitis pilosa* Icon, Lob. *alpina*  
*pilosissima* B. pin. ☉

*Conizis affinis* B. pin. *Britannica* Gesneri &  
*Lugdunensium* Ad. Lob. ☉

*Conyza media vulgaris* Clus. *media* Asteris  
*flore luteo*, vel *tertia* Dioscoridis B.  
 pin. ☉

*Conyza minima* Dod. *major flore globoso*  
 B. pin. ♀

*Conyza palustris ferratifolia* B. pin. *Lingua*  
*major* Dal. hist. Lugd. ☉

*Conyza marina* hist. Lugd. ☉

\* *Corchoros Plinii* Lob. Lugd. *melochia*  
*.s. corchorus* Park. ♀

*Coriandrum* Fuchs. *majus* B. pin. ♀

\* *Coriandrum sylvestre foetidissimum* C.  
 B. P. *sylvestre* Myconi Lugd. ♀

*Coris cœrulea maritima* B. pin. *Coris quo-*  
*rundam* Clus. ☉

*Cornus mas* hist. Lugd. *hortensis mas* B. pin.  
 Cor-

*Cornus foemina* B. pin. *Virga sanguinea*  
Dod.

*Coronopus Matthioli* hist. Lugd. hortensis  
B. pin. ♀

*Coronopus maritima major* B. pin. *Planta-*  
*go marina* Obs. & Icon. Lob. ☉

*Corylus Clus. sativa* fructu albo minore .s.  
*vulgaris* B. pin.

*Corylus sativa* fructu oblongo rubente B.  
pin. *domestica* fructu oblongo rubro  
Clus. descr.

*Corylus sylvestris* B. pin. *Avellana nux*  
*sylvestris* Fuchs,

*Cotinus* Matth. ed. B. *Coggygia* Clus. ☉

*Cotonafter folio oblongo serrato* B. pin.  
*Cotonafter forte Gesneri* Clus. ☉

*Cotyledon* Dod. major B. pin. ☉

*Cotyledon radice serpente.* ☿ ☉

*Cotyledon media foliis oblongis serratis*  
B. pin. minus hort. Eyft. *Palmaria* Tab. ☉

*Cotyledon minor foliis subrotundis serratis*  
B. prodr. ☉ Coty-



*Cotyledon stellata* B. pin. *Aizoon peregrinum* Cam. ♀

*Cratægus Theophrasti* hist. Lugd. *Sorbus torminalis* Dod.

*Crithmum* .s. *sceniculum maritimum minus* B. pin. *marinum* Dod. ☉

*Crithmum chrysanthemum* Dod. *maritimum flore Asteris attici* B. pin. ☉

*Crithmum spinosum* Dod. *maritimum spinosum* B. pin. ☉

*Crocus sativus* Matthioli hist. Ludg. *sativus* B. pin. ☉

\* *Crocus albus sativus* C. B. P. descr. ☉

*Crocus vernus latifolius flore purpureo versicolore* Clus. *vernus latifolius purpureus variegatus* B. pin. ☉

*Crocus vernus latifolius flore purpureo magno* B. pin. Clus. descr. ☉

*Crocus vernus latifolius albo flore* Clus. ☉

*Crocus flore argenteo lineis violaceis striato* Icon. Passæi. ☉

*Crocus vernus latifolius flavo flore* Clus. *vernus latifolius flavus* B. pin. ☉

*Crocus*

**Crocus vernus latifolius pallido flore** Clus.  
 descr. latifolius pallidus B. pin. ☉  
**Crocus vernus latifolius flavo varius** B. pin.  
 luteus lineis nigris Swert. ☉

**Cruciata** Dod. hirsuta B. pin. ☉

**Cucumis sativus** hist. Lugd. sativus vulgaris  
 B. pin. ♀

**Cucumis anguinus flexuosus**ve Obs. Lob.  
 flexuosus B. pin. ♀

**Cucumis sylvestris** Dod. sylvestris asininus  
 dictus B. pin. ♀

**Cucurbita lagenaria** Obs. & Icon. Lob. la-  
 genaria flore albo folio molli B. pin. ♀

**Cucurbita longior** Dod. oblongo flore albo  
 folio molli B. pin. ♀

**Cucurbita capitata** Tab. B. pin. ♀

**Cuminum semine longiore** B. pin. sativum  
 Dod. ♀

**Cuminum sylvestre capitalis globosis** B. pin.  
 sylvestre Dod. ♀

**Cupressus** Dod.

**Cupressus**

Cupressus foemina Dod, descr.

Cyanus montanus latifolius vel Verbascum cyanoïdes B. pin. major Dod. ☉

Cyanus segetum B. pin vulgaris Obs. & Icon. Lob. ☿

Cyanus hortensis flore simplici coeruleo, albo, purpureo. ☿

Cyanus floridus odoratus Turcicus .f. Orientalis Park. flore albo & carneo. ☿

Cyanus repens latifolius B. pin. peramarus repens capitulis squarosis Sesamoïdis parvi Ad. Lob. descr. ☉

Cyclamen vulgare hort. Eyst. orbiculato folio infernè purpurascens B. pin. Idem flore albo. ☉

Cyclamen vernum hort. Eyst. folio anguloso B. pin. ☉

Cyclamen serotinum foliis hederaceis hort. Eyst. hederæ folio B. pin. ☉

Cyclaminum Orientale Cornuti. ☉

\* Cyclamen Persicum odoratum. ☉

Cymbalaria Matthioli hist. Lugd. ☉

Cyno-

Cynoglossum Dod. majus vulgare B. pin. ☞

Cynoglossum Sylvaticum rubente caule B.  
pin. Cynoglossa montana maxima frigidarum regionum Col. ☞

Cynoglossum Creticum argenteo angusto folio B. pin. Creticum primum Clus. ☞

\* Cynoglossum semper virens C. B. Prod.  
Cynoglossa altera fol. virente Col. ☞

Cynoglossum minus B. pin. Lappula rusticorum, Elatine Tragi hist. Lugd. ☞

Cynosorchis militaris major B. pin. Orchis strateumatica, sive stratiotes major, .s. militaris Obs. & Icon. Lob. ☉

Cynosorchis militaris pratensis humilior B. pin. minor flore incarnato hort. Eyst. ☉

Cynosorchis latifolia spicâ compactâ B. pin.

Cynosorchis tertia Dod. ☉

Cyperus rotundus inodorus Germanicus B. prodr. ☉

Cyperus longus Dod. odoratus radice longâ .s. Cyperus officinarum B. pin. ☉

Cytisus Maranthæ Matthioli Obs. Lob. ir-  
canus filiquis falcatis B. pin. ☉

Cytisus



*Cytisus incanus* Creticus B. pin. Ebenus  
Cretica Prosp. Alp. exot. ☉

*Cytisus supinus* infernè, & filiquis molli hirsutie pubescentibus B. pin. septimus hort. Eyft. ☉

*Cytisus glabris* foliis, subrotundis, pediculis brevissimis B. pin. quintus rotundifolius Tab. ☉

\* *Cytisus incanus* Austriacus folio oblongo C. B. P. 5 Clus. hist. ☉

\* *Cytisus glaber* nigricans C. B. P. 4 Clus. hist. ☉

## D.

**D**AUCUS montanus Apii folio major B. pin. Selinoïdes secundus Obs. & Icon. Lob. ☉

*Daucus Alsaticus* B. prodr. ☉

*Daucus pratensis* Dal. hist. Lugd. pratensis millefolii palustris folio B. pin. ☉

*Dens caninus* purpurascente flore Clus. latiore rotundioreque folio B. pin. ☉

E

Dens

Dens leonis Dod. latiore folio B. pin. ☉

Dentaria *μαύρα* ☉ Clus. heptaphyllos B. pin. ☉

Dentaria baccifera Clus. heptaphyllos baccifera B. pin. ☉

Dentaria *λεῖρα* ☉ Clus. triphyllos B. pin. ☉

\* Dentaria monophyllos, anapodophyllon quibusdam. ☿ ☉

\* Dentariæ affinis, Echii flore, capsula rotunda. ☿ ☉

Digitalis purpurea Dod. purpureo folio aspero B. pin. ☉ Eadem flore albo.

Digitalis major lutea, vel pallida parvo flore B. pin. quarta Dod. descr. ☉

\* Digitalis lutea amplo flore Ponæ lutea magno flore C. B. P. ☉

Digitalis latifolia flore ferrugineo. ☿ ☉

Digitalis angustifolia flore ferrugineo B. pin. ferruginea Icon. Lob. ☉

Digitalis foliis maximè ferratis. ☿ ☉

Digitalis foliis subrubentibus Lyfimachiæ facie, ☿ ☉

Dipsacus sativus Dod. B. pin. ☿

Dipsacus

Dipsacus  
pallidus  
Dipsacus  
virgatus

Doronicum  
B. pin.  
Doronicum  
officinale

Doronicum  
pin.

Doronicum  
plex

Doronicum  
Clus.

Doronicum  
pin.

Doronicum  
dens

Doronicum  
scuria

Draba u

tulis c

Draba a  
succu  
Draba h  
Matth

*Dipsacus sylvestris* Dod. sylvestris aut virga  
pastoris major B. pin. ♀

*Dipsacus sylvestris* capitulo minore, vel  
virga pastoris minor B. pin. tertius Dod. ♀

*Doronicum latifolium* Clus. radice scorpii  
B. pin. ☉

*Doronicum Plantaginis folio* B. pin. minus  
officinarum Obs. & Icon. Lob. ☉

*Doronicum Plantaginis folio* alterum B.  
pin. Alisma Matth. ed. B. hort. Eyst. ☉

*Doronicum maximum* foliis caulem am-  
plexantibus B. pin. septimum Austriacum  
Clus. ☉

*Doronicum foliis subtus lanuginosis.* ☿ ☉

*Doronicum Americanum* laciniato folio B.  
pin. app. Aconitum helianthemum Cana-  
dense Cornuti. ☉

\* *Doronicum Americanum* minus fol. ob-  
scurius virentibus. ☿ ☉

*Draba umbellata*, vel *Draba major* capi-  
tulis donata B. pin. prima vulgaris Clus. ☉

*Draba alba* siliquosa repens B. pin. tertia  
succulento folio Clus. ☉

*Draba lutea* siliquis strictissimis B. pin. lutea  
Matth. ed. B. ☉

*Draba filiquosa* floribus violaceis. Forte  
*Leucovium marinum* alterum *latifolium*  
 Obs. Lob. ♀

*Dracunculus hortensis* B. pin. *Draco herba*  
 Dod. ☉

*Dracunculus pratensis* ferrato folio B. pin.  
*Ptarmica Fuchsii* hist. Lugd. ☉

*Dracunculus pratensis* flore pleno B. pin.  
*Ptarmica vulgaris* flore pleno Clus. ☉

*Dracunculus polyphyllus* B. pin. *Dracon-*  
*tium majus* Dod. ☉

\* *Dracunculus* .s. *Serpentaria Triphylla*  
*Brassiliana* B. prodr. ☉

## E.

**E**CHIUM *scorpioides arvense* B. pin.  
*Myosotis hirsuta reptans* Obs. Lob. ♀

*Echium scorpioides palustre* B. pin. *Myo-*  
*sotis scorpioides* partim repens partim  
*erecta* Icon. Lob. Idem flore albo. ☉

*Echium vulgare* Clus. B. pin. ♀

*Echium procumbens* flosculis atroruben-  
 tibus. ☿ ♀ Elatine



Elatine folio subrotundo B. pin. Veronica  
foemina Fuchf. ☿

Elatine folio acuminato in basi auriculato  
flore luteo B. pin. altera Dod. ☿

\* Elychrysum, f. stæchas Citrina altera Lob.  
Icon. Lugd. ☉

\* Elychrysum .f. stæchas Citrina Cretica  
amplo flore J. B. Creticum Eyst. ☿

Ephemerum non lethale Matthioli hist.  
Lugd. ☉

Epimedium Dod. ☉

\* Equisetum arvense longioribus setis C.  
B. P. Park. segetale Ger.

\* Equisetum pratense longiss. setis C. B.  
P. palustre maj. Tab. palustre Ger.

\* Equisetum nudum Ger. Junceum Lugd.  
trag.

Erica vulgaris glabra B. pin. prior Dod. ☉

Erica floribus ex summis caulibus pendulis.

Eadem flore albo. ☉

*Erica major scoparia* foliis deciduis B. pin.  
coris folio quarta Clus. ☉

*Erica pumila calyculato* Unedonis flore  
Icon. Lob. humilis cortice cinericeo Ar-  
buti flore B. pin. Eadem flore albo ☉

*Erica supina maritima* Anglica Park. ☉

*Eruca sativa* Fuchf. latifolia alba sativa Di-  
oscorid. B. pin. ♀

*Eruca latifolia* B. prodr. ♀

*Eruca sylvestris* Dod. sylvestris major lutea  
caule aspero B. pin. ☉

*Eruca palustris minor* Tab. sylvestris minor  
luteo parvoque flore B. pin. ☉

*Eruca vinealis* parvo flore. An sylvestris  
minor lutea Bursæ pastoris folio B.  
prodr. ♀

*Eruca lutea latifolia* .s. Barbarea B. pin.  
Barbarea Dod. ♀

*Eruca Tanaceti* foliis. ☿ ☉

\* *Eruca Monspeliaca* siliqua quadrata E-  
chinata C. B. P. sinapi Echinatum  
Lugd. ♀

*Eruca maritima Italica* siliquâ hastæ cuspidi  
simili B. pin. Cakile Serapionis Obs.  
Lob. ♀

\* *Eruca*

\* *Eruca Maritima* Anglica Park. marina  
*Cakile Serapionis* Lob. ☿

\* *Eruca*.f. *Barbarea perennis*, sem. cras-  
 fiore. ♂

*Eryngium marinum* Dod. *maritimum* B.  
 pin. ☉

*Eryngium campestre* Dod. *vulgare* B. pin. ☉

*Eryngium montanum* *Amethystinum* B. pin.  
 totum cœruleum hort. Eyst. ☉

\* *Eryngium montanum* *Pannonicum* al-  
 bum Clus. descr. ☉

*Eryngium montanum* *minimum* capitulo  
 magno B. pin. *Carduncellus montis Lupi*  
 Ad. Lob. ☉

*Eryngium minimum* *mitius* capitulo mag-  
 no. ♂ ☉

*Eryngium* ex plani semine degener. ♂ ☉

*Eryngium arvense* foliis *Serræ* similibus B.  
 pin. *quartum* Dod. ☉

*Erysimum* *vulgare* B. pin. *Irio*, f. *Erysimum*  
 Dod. ☿

*Erysimum latifolium* *majus glabrum* B. pin.  
*Irio Apulus* alter lævi folio *Erucae* Col. ☿

\* *Erysimum angustifolium* *majus* C. B. P.

Rapistrum sylvestre Irionis folio Col. ♀  
 \* Erysimum Polyceration vel corniculatum C. B. P. Irio alter Matth. Lugd. ♀

Euonymus Dod. vulgaris granis rubentibus  
 B. pin.

Euonymus latifolius B. pin. primus .s. latifolius Clus.

Eupatorium vulgare Matth. ed. B. cannabinum B. pin. ☉

Eupatoria foliis Enulæ Cornuti. ☉

Eupatorium cannabinum chrysanthemum  
 Tab. ♀

Eupatorium cannabinum Americanum flore aureo. ☿ ♀

Eupatorium veterum .s. Agrimonia B. pin.  
 Græcorum .s. Agrimonia Dod. ☉

Eupatorium odoratum B. pin. alterum odoratum, & aromaticum Col. descr. ☉

\* Eupatorium odoratum fantonicum Lob.  
 Advers. ☉

\* Eupatorium capite nutante C. B. Chrysanthemum J. B. ♀

\* Eupatorium Chrysanthemum, canadense præaltum, alato caule nobis. After virgineus



gineus luteus alato caule Park. descr. ☉

Euphrasia Dod. officinarum B. pin. ♀

Euphrasia minus ramosa flore ex cœruleo  
purpurascente hort. Eyst. unicaulis B.  
pin. descr. ♀

\* Euphrasia unicaulis spicata. Trixago  
apula unicaulis Col. ♀

Euphrasia lutea viscata. ☿ ♀

Euphrasia pratensis rubra B. pin. secunda  
Dodonæj, sive Cratægonon alterum  
quorundam Obs. Lob. ♀

Eufragia major sylvestris purpurea Col.  
Italica latifolia altera B. pin. ♀

Euphrasia pratensis lutea B. pin. Sideritis  
pratensis lutea hist. Lugd. ♀

## F.

\* **F**ABA major fructu rubro C.B. Pin. ♀  
Faba Fuchf. major recentiorum Obs.  
& Icon. Lob. ♀

Faba minor .s. equina B. pin. Bona .s. phase-  
lus minor Dod. descr. ♀

Faba

**Faba sylvestris** Græcorum Obs. & Icon. Lob.  
 sylvestris fructu rotundo atro B. pin. ♀  
 Vide vicia.

**Fagus** Dod.

**Ferrum equinum** filiquâ singulari B. pin.  
 equinum Obs. & Icon. Lob. ♀

\* **Ferrum equinum** Polyceraton Col. E.  
 quinum filiquâ multiplici C. B. P. ♀

**Ferrum equinum** Germanicum filiquis in  
 summitate B. pin. equinum capitatum  
 Col. ☉

**Ferrum equinum** Gallicum filiquis in sum-  
 mitate B. pin. Lotus enneaphyllos Dal.  
 hist. Lugd. ☉

**Ferula galbanifera** Obs. & Icon. Lob. feru-  
 lago latiore folio B. pin. ☉

**Ficus** Dod. communis B. pin. fructu rubro  
 & albo.

**Ficus Indica** Dod. folio spinoso, fructu ma-  
 jore C. B. Pin. Indica major Park. ☉

\* **Ficus Indica** minor Park. Theat. Indica  
 fol. spinoso fructu minore C. B. P. ☉

Fili-

Filipendula Dod. vulgaris B. pin. ☉

Filix fœmina Dod. ramosa major pinnulis obtusis non dentatis B. pin. ☉

Filix florescens Tragi hist. Lugd. ramosa non dentata florida B. pin. ☉

Filix mas Dod. non ramosa dentata B. pin. ☉

Filix mas aculeata major B. prodr. ☉

Filix baccifera Cornuti. ☉

Filix non ramosa petiolis tenuissimis, & tenuissimè dentatis B. pin. Filicula petræa prima Tab. ☉

\* Filix arborea Tragi. ☉

\* Filix palustris aculeata. ☉ ☿

Fœniculum Dod. vulgare Germanicum B. pin. ☉

Fœniculum dulce B. pin. Fœniculum .s. Marathrum vulgatius dulce Ad. Lob. descr. & Icon. ☉

Fœnum Græcum Dod. sativum B. pin. ☿

Fœnum Græcum sylvestre alterum poly-  
cration B. pin. Hedyсарum minimum hist.  
Lugd. ☿

Fragaria Fuchf. vulgaris B. pin. ☉

Fraga candida Dod. descr. ☉

Fra-

*Fragaria fructu parvi Pruni magnitudine* B.  
pin. *Fraga fructu magno hort.* Eyst. ☉

*Fragaria flore duplici foliorum serie.* ☿ ☉

*Fragaria fructu rubro folioso.* ☿ ☉

*Fragaria sterilis* B. pin. *sylvestris minimè*  
*vesca .s. sterilis* Icon. Lob. ☉

*Fragaria sterilis incana.* ☿ ☉

*Fraxinella* Clus. *Dictamus albus vulgò .s.*

*Fraxinella* B. pin. ☉

*Fraxinella niveo flore* Clus. descr. ☉

*Fraxinus* Dod. *excelsior* B. pin.

*Fraxinus florifera.* ☿

*Fritillaria præcox purpurea variegata* B.  
pin. *Meleagris* Dod. ☉

*Fritillaria pyrenæa* Clus. hist. app. flore  
minore B. pin. ☉

\* *Fritillaria coronæ imperialis facie, pullo*  
*flore Hispanica umbellifera swertii um-*  
*bellifera* Park. Parad.

\* *Fritillaria præcox alba* C. B. P. alba  
Park. Parad.

*Frumentum Indicum* Maiz dictum B. pin.  
Turcicum



Turcicum Dod. Idem granis rubis. ♀  
 Frumentum Sarracenicum Matth. ed. B.  
 Fegopyrum Dod. ♀  
 Frumentum Indicum spicâ articulatâ, pe-  
 renne. ♂

Fumaria Dod. officinarum & Dioscoridis  
 B. pin. Eadem flore albo. ♀

Fumaria minor tenuifolia P. pin. Capnos  
 tenuifolia Clus. ♀

Fumaria filiquosa sempervirens Cornuti. ☉

Fumaria bulbosa radice non cava minor B.  
 pin. Radix cava minor Dod. Eadem  
 flore albo. ☉

Fumaria bulbosa radice cava major B. pin.  
 Radix cava major Clus. Eadem flore  
 albo. ☉

Fumaria tuberosa insipida Cornuti. ☉

\* Fumaria tenuifolia semine compresso  
 lini instar. ♂ ♀

\* Fumaria Claviculis donata C. B. P. Cap-  
 nos altera Belgica flore albo Clus. ♀

G.

## G.

**G**ALEGA Dod. vulgaris B. pin. ☉  
 Galega flore albo hort. Eyst. ☉  
 Galegæ affinis, Sophera dicta B. pin. Sophe-  
 ra Prosp. Alp. de plant. Ægyp. ☿  
 \* Galegæ affinis, Sesban Prosp. Alpini de  
 plantis Ægyp. ☿

Gallium Dod. luteum B. pin. ☉  
 Gallium palustre album B. pin. album  
 Tab. ☉  
 Gallium album tripetalon. ☿ ☉

Genista spinosa major longioribus aculeis B.  
 pin. spinosa Dod. ☉  
 Genista spinosa brevioribus aculeis, an Ge-  
 nistella minor aspalathioïdes. B. prodr. ☉  
 Genista spinosa minor Germanica B. pin.  
 Genistella Dod. aculeata Obs. & Icon.  
 Lob. ☉  
 Genistella spinosa Corrudæ similis. Scorpius  
 Theophrasti hist. Lugd. Nepa Theo-  
 phrasti Ad, Lob. ☉

Genista

Genista angulosa, & scoparia B. pin. angulosa .f. vulgaris hist. Lugd. ☉

Genista tinctoria Germanica B. pin. tinctoria Dod. ☉

\* Genista purgans J. B. ☉

\* Genista Acacia trifolia C. B. Acacia Diosc. Ger. ☉

Gentiana major lutea B. pin. Gentiana Dod. ☉

Gentiana Asclepiadis folio B. pin. secunda foliis Asclepiadis Dod. descr. ☉

Gentianella Alpina angustifolia magno flore B. pin. helvetica Icon, Lob. major verna Clus. ☉

Gentiana cruciata B. pin. Cruciata .f. Gentiana minor Dod. ☉

Gentiana palustris angustifolia B. pin. Pneumonanthe Cord. hist. ☉

Geranium batrachiodes folio Aconiti B. pin. secundum *batrachoides* minus Clus. ☉

Geranium batrachioïdes flore albo hort. Eyst. ☉

Geranium batrachiodes flore variegato B. pin. Anglicanum variegatum hort. Eyst.

☉ Gera-

- Geranium batrachoïdes* alterum longius  
 radicatum Icon. Lob. *batrachiodes* odo-  
 ratum B. pin. ☉  
*Geranium sanguineum* maximo flore B. pin.  
 septimum *hæmatodes* Clus. ☉  
*Geranium batrachiodes*, Gratia Dei Ger-  
 manorum Lob. B. pin. tertium *batrachi-*  
*odes majus* Clus. ☉  
 \* *Geranium batrachiodes minus* annum  
 purpurocæruleum. ☿ ♀  
 \* *Geranium batrachoïdes minus* perenne  
 versicolor. ☿ ☉  
*Geranium montanum fuscum* B. pin. fuscum  
 hort. Eyft. ☉  
*Geranium tuberosum* Dod. *tuberosum ma-*  
*jus* B. pin. ☉  
*Geranium nodosum* B. pin. quintum nodo-  
 sum Plateau Clus. ☉  
*Geranium lucidum saxatile* B. pin. *saxatile*  
 hort. Eyft. ♀  
*Geranium folio Malvæ rotundo* B. pin. *Pes*  
*columbinus* Dod. ♀  
 \* *Geranium Melachoides* flore albo. ☿ ♀  
*Geranium folio Malvæ rotundo minus* B.  
 pin. descr. ♀  
*Geranium columbinum tenuius laciniatum*  
 B.



- B. prodr. Idem flore albo, ♀  
 Geranium folio Althææ B. pin. malacoïdes  
 Obs. & Icon. Lob. ♀  
 Granium cicutæ folio moschatum B. pin. su-  
 pinum Dod. ♀  
 Geranium Coriandri folio odorum B. pin.  
 Apulum Coriandri folio alterum odo-  
 rum Col. ♀  
 Geranium Cicutæ folio minus & supinum B.  
 pin. minus vel arvense Tab. ♀  
 Geranium arvense album Tab. ♀  
 Geranium robertianum Dod. robertianum  
 primum B. pin. ♀  
 \* Geranium Rubertianum flore albo. ♂ ♀  
 Geranium Creticum annuum hæmatodes  
 Icon. Lob. latifolium longissimâ acu B.  
 pin. ♀  
 Geranium triste Cornuti. ☉  
 Geranium flore versicolore. ☉  
 Geranium foetidum Park. ☉  
 Gingidium umbellâ oblongâ B. pin. Vifnaga  
 Matth. ed. B. ♀  
 Gladiolus floribus uno versu dispositis ma-  
 jor B. pin. Narbonensis Obs. & Icon. Lob.  
 ☉ F Gladi-

Gladiolus flore albo Swert. ☉

Gladiolus floribus uno versu dispositis minor B. pin. minimus Lob. Ad. part. alt. ☉

Glaux maritima B. pin. exigua maritima Obs. & Icon. Lob. ☿

\* Glaux major flore herbaceo. ☿ ☉

Glycyrrhiza capite echinato B. pin. echinata Dodonæi hist. Lugd. ☉

Glycyrrhiza vulgaris Dod. filiquosa vel Germanica B. pin. ☉

Glycyrrhiza sylvestris hist. Lugd. sylvestris floribus luteopallescentibus B. pin. ☉

Gnaphalium maritimum B. pin. marinum tomentosum hist. Lugd. ☉

Gnaphalium Americanum Clus. latifolium Americanum B. pin. ☉

Gnaphalium vulgare majus B. pin. Filago .f. Impia Dod. ☿

Gnaphalium medium B. pin. Filago minor Dod. ☿

Gnaphalium minus repens B. pin. minimum Icon. Lob. ☿

Gnaphalium roseum B. prodr. ☿

Gnapha-

Gnaphalium majus lato oblongo folio B.  
pin. Gnaphalium Plateau secundum  
Clus. ☿

\* Gnaphalium 3 Plateau Clus. ☿

Gnaphalium Anglicum vel Belgicum folio  
longiore Icon. Lob. majus angusto, ob-  
longo folio alterum B. pin. ☉

Gnaphalium montanum flore rotundiore B.  
pin. montanum variegatum hort. Eyst. ☉

Gossypium .f. Xylon Dod. Gossypium fru-  
tescens semine albo B. pin. ☿

Gramen caninum arvense .f. Gramen Dicf-  
coridis B. pin. caninum medicatum Obs.  
Lob. ☉

Gramen caninum vineale B. prodr. ☉

Gramen caninum longius radicum majus  
& minus B. pin. canarium longius radi-  
catum latiore paniculâ Ad. Lob. part.  
alt. ☉

Gramen caninum supinum minus B. pin.  
caninum supinum Icon. Lob. ☉

Gramen nodosum avenaceâ paniculâ B. pin.  
nodosum hist. Lugd. ☉

Gramen tremulum Hispanicum maximum  
Park. ☿ F 2 Gra-

Gramen tremulum majus B. pin. leporinum,  
& tremulum Tab. ♀

Gramen tremulum minus paniculâ parvâ B.  
prodr. ♀

Gramen filiceum .s. polyanthes hist. Lugd.  
paniculis elegantissimis, .s. Heragrostis  
major B. pin. ♀

Gramen minimum Dalechampi hist. Lugd.  
minimum paniculis elegantissimis B. pin. ♀

Gramen pratense paniculatum molle B.  
prodr. lanatum Dal. hist. Lugd. ☉

Gramen pratense vulgatius hist. Lugd. pra-  
tense paniculatum majus latiore folio,  
nō Theophrasti B. pin. ☉

Gramen pratense paniculatum medium B.  
pin. pratense secundum Dod. ☉

Gramen pratense paniculatum minus B. pin.  
paniculatum minus album Tab. ☉

Gramen paniculâ multiplici B. prodr. Mon-  
spessuli vulgò duriusculum minus nomi-  
natum. ♀

Gramen arvense paniculâ crispâ B. prodr.  
minimum xerampelinum Narbonense I-  
con. Lob. ♀

Gramen segetum paniculâ arundinaceâ B.  
pin. agrorum venti Spica Icon. Lob. ♀

Gramen



Gramen paniculatum folio variegato B. pin.  
 sulcatum vel striatum album Icon. Lob. ☉

Gramen palustre paniculatum altissimum B.  
 pin. aquaticum arundinaceum panicula-  
 tum Tab. ☉

Gramen pratense cristatum .s. spicâ cristatâ  
 læve B. pin. cristatum ejusdem prodr. ☉

Gramen Caryophyllatæ foliis spicâ divulsâ  
 B. pin. Caryophylleum Tab. ☉

Gramen typhoides maximum spicâ longis-  
 simâ B. prodr. ☉

Gramen typhoides spicâ multiplici B. pin.  
 typhinum tertium Tab. ☉

Gramen alopecuroïdes spicâ asperâ B.  
 prodr. ☿

Gramen pratense tomentosum paniculâ  
 sparsâ B. pin. eryophoron Dod. ☉

Gramen sparteum spicatum latifolium B.  
 pin. Spartum nostras alterum Icon. Lob. ☉

Gramen sparteum pennatum B. pin. Spar-  
 teum Austriacum pennatum Clus. ☉

Gramen foliolis junceis brevibus minus B.  
 pin. exile durius Icon. Lob. ☉

Gramen junceum folio articulato aqua-  
 ticum B. pin. aquaticum alterum Icon.  
 Lob. ☉

- Gramen juncoïdes junci sparsâ paniculâ  
Park. ☉
- Gramen junceum spicatum .f. triglochin B.  
pin. Calamagrostis quarta hist. Lugd. ☉
- Gramen cyperoïdes latifolium spicâ rutâ  
.f. caule triangulo B. pin. cyperoïdes  
hist. Lugd. ☉
- Gramen cyperoïdes spicâ pendulâ breviorē  
B. pin. Pseudocyperus Dod. ☉
- Gramen cyperoïdes paniculâ sparsâ majus  
B. pin. cyperinum majus Tab. ☉
- Gramen cyperoïdes palustre majus spicâ  
compactâ B. pin. cyperinum palustre  
Tab. ☉
- Gramen cyperoïdes palustre majus spicâ  
divisâ B. pin. cyperoïdes parvum aqua-  
ticum Icon. Lob. ☉
- Gramen cyperoïdes maximum foliis & ca-  
rinâ ferratis. ☉
- Gramen cyperoïdes maritimum B. pin. ma-  
ritimum hist. Lugd. ☉
- Gramen arundinaceum enode majus mon-  
tanum B. pin. arundinaceum montanum  
Tab. ☉
- Gramen nemorosum caliculis paleaceis B.  
pin. junceum bufonium Tab. ☉

Gramen

Gramen hirsutum latifolium majus B. pin.  
hirsutum nemorosum Icon. Lob. ☿

Gramen hirsutum angustifolium majus B.  
prodr. ☿

Gramen hirsutum capitulis Psyllii B. pin.  
exile hirsutum cyperoïdes Icon. Lob. ☿

Gramen palustre aculeatum, vel minus Ger-  
manicum B. pin. palustre echinatum Icon.  
Lob. ☉

Gramen dactylon folio arundinaceo majus  
B. pin. legitimum Clus. ☉

Gramen dactylon folio latiore B. pin. Ischæ-  
mon Plinii .i. dactylon hist. Lugd. ☉

Gramen dactylon scoparium B. pin. scopa-  
rium Ischæmi paniculis Gallicum Ad.  
Lob. part. alt. ☉

Gramen dactylon esculentum B. pin. Gra-  
men mannæ primum Dod. ☿

Gramen paniceum spicâ longis aristis ar-  
matâ B. pin. Panici effigie gramen aristis  
circumvallatum Icon. Lob. ☉

Gramen paniceum spicâ simplici B. pin. Pa-  
nici effigie gramen simplici spicâ Icon.  
Lob. ☉

Gramen miliaceum Icon. Lob. sylvaticum  
paniculâ miliaceâ sparsâ B. pin. ☉

- Gramen hordeaceum minus & vulgare B.  
pin. hordeaceum, Holcus Plinii hist.  
Lugd. ☿
- Gramen loliaceum spicâ longiore B. pin.  
Lolium Dod. ☿
- Gramen loliaceum minus spicâ simplici B.  
prodr. ☿
- Gramen festucarium. Festuca graminea glu-  
mis hirsutis B. pin. Bromos sterilis altera  
Icon. Lob. ☿
- Gramen festucarium. Festuca avenacea ste-  
rilis elatior B. pin. Bromos herba Dod. ☿
- Gramen festucarium. Festuca graminea glu-  
mis vacuis B. prodr. ☿
- Gramen avenaceum altero alteri innato  
Park. ☿
- Gramen avenaceum squamosâ glumâ  
Park. ☿
- \* Gramen Phalaroides perenne tuberosâ  
radice. ☿ ☉
- \* Gramen Festucarium capitulis duris, Æ-  
gylops Narbonensis Lob. ☿
- \* Gramen Miliaceum sylvaticum. ☿
- \* Gramen echinatum tribuloïdes Col. ☿
- Gramen Parnassi Dod. albo simplici flore  
B. pin. ☉
- Grati-



Gratiola Dod. centauroïdes B. pin. ☉

Grossularia simplici acino, vel spinosa syl-  
vestris B. pin. Uva crispa Dod. ☉

\* Grossularia, Uva crispa, fructu albo &  
Margaritis simili C. B. P. ☉

\* Grossularia Uva crispa fructu rubro. ☉

Grossularia rubra hist. Lugd. multiplici a-  
cino .s. non spinosa hortensis rubra .s.

Ribes officinarum B. pin. ☉

Grossularia hortensis fructu Margaritis si-  
mili B. pin. Ribes fructu albo hort. Eyf. ☉

Grossularia hortensis majore fructu rubro  
B. pin. Ribes major fructu rubro hort.  
Eyf. ☉

Grossularia non spinosa fructu nigro B. pin.  
Ribesium fructu nigro Dod. ☉

\* Grossularia ribes fructu rubro, folio  
Uvæ crispæ. ☉

---

H.

## H.

**H**ALIMUS latifolius .f. fruticosus B.  
pin. primus Clus. ☉

Halimus .f. Portulaca marina B. pin. Por-  
tulaca marina, an Crithmum Dioscoridis  
Icon. Lob. ☉

Hedera arborea B. pin. corymbosa Obs.  
Lob. ☉

Hedera helix Dod. major sterilis B. pin. ☉

Hedera terrestris vulgaris B. pin. terrestris  
Dod. Eadem flore carneo. ☉

Hedera saxatilis magno flore B. pin. Asa-  
rina Lobelii hist. Lugd. ☉

Hedera trifolia Canadensis Cornuti. ☉

Hedera quinquefolia Canadensis Cornuti. ☉

\* Hedera corymbosa fructu luteo, Hedera  
Dionysii, & chrysocarpus Lugd. ☉

\* Hedera trifolia Canadensis folio sinuato.  
☿ ☉

Hedysarum triphyllum Canadense Cornu-  
ti. ☉

Helenium Dod. vulgare B. pin. ☉

Helenium

Helenium Indicum maximum B. pin. Flos  
folis major hort. Eyft. ♀

Helenium Indicum ramosum B. pin. Flos  
folis prolifer hort. Eyft. Idem semine al-  
bo, cinericeo, & striato. ♀

Helenium Indicum tuberosum. Flos solis  
Farnesianus, Aster pervanus tuberosus  
Col. ☉

Helenium Canadense præaltum alato cau-  
le. ☿ ☉

Helenium Canadense præaltum Vosacan-  
dictum. ☿ ☉

Helenium Canadense humilius latifolium  
☿ ☉

Helichrysum foliis oblongis Stæchadi ci-  
trinae similibus B. pin. Chrysocome pe-  
regrina hort. Eyft. ☉

Helichrysum .f. Stæchas citrina angustifolia  
B. pin. Stæchas citrina Dod. ☉

Heliotropium majus Clus. majus Dioscori-  
dis B. pin. ♀

Heliotropium minus tricoccum Clus. tri-  
coccum B. pin. ♀

Helleborus

**Helleborus niger foetidus** B. pin. **Helleboraster maximus** flore & semine prægnaus  
Obs. & Icon. Lob. ☉

**Helleborus niger hortensis** flore viridi B. pin. **niger adulterinus hortensis** Fuchf. ☉

**Helleborus niger** flore roseo B. pin. **niger legitimus** Clus. ☉

**Helleborus niger** flore roseo minor Belgicus. ☿ ☉

**Helleborus niger trifolius** Ald. hort. Farn. ♀

**Helleborus niger Saniculæ folio** major B. pin. **Astrantia nigra** Obs. & Icon. Lob. ☉

**Helleborus Saniculæ folio** minor B. prodr. ☉

**Helleborus Hippocratis** Tab. **niger tenuifolius** Buphtalmi flore B. pin. ☉

**Helleborus albus** flore subviridi B. pin. **albus** flore herbaceo hort. Eyf. ☉

**Helleborus albus** flore atrorubente B. pin. hort. Eyf. ☉

**Helleborine latifolia montana** B. pin. **Epipactis latifolia** hort. Eyf. ☉

**Helleborine angustifolia palustris** .f. **pratensis** B. pin. **Helleborine**, sive **Epipactis recentiorum** Obs. & Icon. Lob. ☉

**Helleborine** flore albo, vel **Damasonium**  
mon-



montanum latifolium B. pin. Epipactis  
angustis foliis hort. Eyst. ☉

Helleborine montana angustifolia purpu-  
rascens B. pin. recentiorum sexta Clus. ☉

Helleborine herbaceo flore. ☿ ☉

\* Helleborine .s. calceolus marianus, vide  
calceolus mariæ.

Hesperis hortensis B. pin. Viola matronalis  
flore albo hort. Eyst. Eadem flore pur-  
pureo quæ

Viola matronalis flore purpureo hort.  
Eyst. ☉

Hesperis flore pleno albo. Viola matronalis  
flore multiplici Cornuti descr. ☉


\* Hesperis Syriaca Eyst. peregrina siliquis  
articulatis C. B. P. ♀

\* Hesperis sylvestris hirsuta foliis Hieracii  
B. prodr. ♀

Hieracium majus foliis Sonchi, vel Hiera-  
cium Sonchites B. pin. majus Fuchs. ☉

Hieracium majus foliis Sonchi semine curvo  
B. pin. Creticum pro Endivia lutea mis-  
sum Cam. descr. Sonchus asper laciniatus  
Creticus B. prodr. ♀

Hiera-



Hieracium arborescens palustre B. pin. Son-  
chus lævior Astriacus altissimus quintus  
Clus. ☉

Hieracium Apulum flore suaverubente Col.  
dentis leonis folio flore suaverubente B.  
pin. ♀

Hieracium odore Apuli suaverubentis. ☿  
♀

Hieracium dentis leonis folio monoclonon  
B. pin. intybaceum Tab. ☉

Hieracium dentis leonis folio hirsutie aspe-  
rum minus laciniatum B. pin. & prodr. ☉

Hieracium dentis leonis folio hirsutie aspe-  
rum magis laciniatum B. pin. ☉

Hieracium minus dentis leonis folio oblon-  
go glabro B. pin. Hyoseris angustifolia  
Tab. ☉

Hieracium minus folio subrotundo B. pin.  
minimum nonum Clus. ♀

Hieracium maximum asperum Chondrillæ  
folio B. prodr. ♀

Hieracium Chondrillæ folio glabrum B.  
pin. aphacoides Tab. ♀

Hieracium Chondrillæ folio glabro radice  
succisâ majus B. pin. minus præmorsâ  
radice Obs. & Icon. Lob. ☉

Hiera-

Hieracium capitulum inclinans semine ad-  
unco B. pin. facie Hedypnois Icon.  
Lob. ☿

Hieracium filiquâ falcatâ B. pin. Narbo-  
nense falcatâ filiquâ Lobelii hist. Lugd. ☿

Hieracium echioïdes capitulis cardui bene-  
dicti B. pin. echioïdes, Buglossum lute-  
um Tab. ☿

Hieracium octavum folio Hedypnoïdis  
Clus. montanum dentis leonis folio in-  
cano, vel laciniatum lanuginoso folio B.  
pin. ☉

Hieracium phlomoïdes Tab. Alpinum lati-  
folium hirsutiae incanum flore magno B.  
pin. ☉

Hieracium montanum tomentosum. An vil-  
losum quintum Clus. ☉

Hieracium montanum majus latifolium  
Tab. montanum latifolium glabrum ma-  
jus B. pin. ☉

Hieracium murorum folio pilosissimo B. pin.  
Corchorus Dal. hist. Lugd. ☉

Hieracium murorum folio non maculato  
minus piloso. ☿ ☉

Hieracium fruticosum latifolium foliis den-  
tatis glabrum B. pin. majus latifolium vel  
secundum

secundum Clus. descr. fruticescens latifolium polyanthos hort. Eyst. ☉

Hieracium Sabaudum Penæ & Lobelii hist. Lugd. fruticosum angustifolium majus B. pin. ☉

Hieracium montanum alterum *αειθρονανθον* Col. ♀

\* Hieracium foliis & floribus Dentis leonis bulbosi semine curvo. ☿ ♀

\* Hieracium angustifolium glabrum .s. Pilosilla major glabra. ☿ ☉

\* Hieracium calice barbato Col. proliferrum falcatum C. B. P. ♀

\* Hieracium ramosum magno flore B. in prodr. 14 ♀

\* Hieracium Pulmonaria non maculata indefectis foliis. ☿ ♀

Holosteum hirsutum albicans minus B. pin. Salmanticense minus Clus. ☉

Holosteum strictissimo folio majus B. pin. Serpentina Matthioli Dod. ☉

Holosteum strictissimo folio minus B. pin. Serpentina omnium minima Lobelii hist.

Lugd. ☉

Holosteum Alfine flore. ☿ ☉

Holosteum



*Holosteo affinis*, Cauda muris B. pin. Cauda murina Dod. ♀

*Hordeum polystichum hybernum* B. pin. polystichum Fuchs. ♀

*Hordeum distichon* Dod. B. pin. ♀

*Horminum Creticum* Prosp. Alp. de exot. sativum B. pin. ♀

*Horminum Sclarea dictum* B. pin. Sclarea Matth. ed B. Obs. Lob. ☉

*Horminum luteum glutinosum* B. pin. Colus Jovis Obs. & Ad. Lob. ☉

*Horminum sylvestre latifolium verticillatum* B. pin. sylvestre tertium Clus. ☉

*Horminum pratense foliis serratis* B. pin. sylvestre Fuchs. hist. Lugd. Idem flore albo ☉

*Horminum angustifolium laciniatum flore cœruleo.* An sylvestris quarti, quinta species Clus. ☉

*Horminum Lapathi unctuosifolio.* ☿ ☉

\* *Horminum flore minore folio integro.* ☿ ☉

\* *Horminum flore minore dilute cœruleo folio sinuato.* ☿ ♀

G

\* Hormi-

- \* Horminum flore majore amplo violaceo  
Lobis punctis aureis notatis. ☞ ♀
- \* Horminum flore majore Salviæ folio for-  
te Marum Ægyptiacum Prosp. Alp. ♀
- \* Hormium flore majore sylvestris 5 altera  
species Clus. ☉

Hyacinthus comosus major purpureus B.  
pin. comosus spurius hort. Eyft. Idem  
flore albo & carneo. ☉

Hyacinthus Sannesijs comâ paniculosâ Col.  
paniculâ cœruleâ B. pin. ☉

Hyacinthus racemosus cœruleus major B.  
pin. botryoïdes cœruleus hort. Eyft. ☉

Hyacinthus racemosus cœruleus minor lati-  
folius B. pin. botryoïdes cœruleus hort.  
Eyft. ☉

Hyacinthus botryoïdes floribus albis hort.  
Eyft. ☉

Hyacinthus racemosus cœruleus minor jun-  
cifolius B. pin. racemosus Dod. comosus  
minor Obs. Lob. ☉

Hyacinthus racemosus moschatus B. pin.  
Muscari obsoletiore flore Clus. ☉

Hyacinthus racemosus moschatus luteus B.  
pin. Muscari flavo flore Clus. ☉

Hyacin-

*Hyacinthus oblongo flore cœruleus major*  
 B. pin. Anglicus & Belgicus Obs. & Icon.  
 Lob. ☉

*Hyacinthus Belgicus candidus* Icon. Lob. ☉

*Hyacinthus floribus Campanulæ utrinque*  
*dispositis* B. pin. Neapolitanus Swert. ☉

*Hyacinthus oblongo cœruleo flore minor*  
 B. pin. minor Hispanicus Clus. cur. post:  
 descr. Ger. Icon. ☉

*Hyacinthus orientalis albus primus* B. pin.  
*Orientalis niveus* Clus. ☉

*Hyacinthus brumalis orientalis Gemmæ ex*  
*Lobelio hist.* Lugd. ☉

*Hyacinthus orientalis maximus* B. pin. ☉  
*Orientalis polyanthos* Clus. ☉

*Hyacinthus orientalis flore duplici hort.*  
*Eyst.* B. pin. ☉

*Hyacinthus orientalis flore cœruleo pleno*  
*hort. Eyst.* ☉

*Hyacinthus stellatus vulgaris* Clus. *stellaris*  
*trifolius* B. pin. ☉

*Hyacinthus stellatus albo flore* Clus. Idem  
*flore carneo.* ☉

*Hyacinthus stellatus cineracei coloris* Clus.  
*stellaris Sommeri* Ger. *Stellaris spicatus*  
*cinereus* B. pin. ☉

**Hyacinthus stellatus lilifolius** Clus. **Stellaris**  
foliis & radice Lili B. pin. ☉

**Hyacinthus stellaris autumnalis minor** B.  
pin. autumnalis minor Dod. ☉

**Hyacinthus stellatus Peruvianus** Clus. **Indicus**  
bulbosus stellatus B. pin. Idem flore al-  
bo. ☉

**Hyacinthus Indicus tuberosa radice** Clus.  
**Indicus tuberosus** flore Hyacinthi orien-  
talis B. pin. ☉

**Hyoscyamus vulgaris vel niger** B. pin. **niger**  
Dod. ♀

**Hyoscyamus albus** Dod. **albus major** vel  
tertius **Dioscoridis** B. pin. ♀

**Hyoscyamus aureus** Prosp. Alp. exot. ♀

**Hypecoon legitimum** Clus. **Hypecoum** B.  
pin. ♀

**Hypericum** Dod. **vulgare** B. pin. ☉

**Hypericum minus supinum**, vel **supinum**  
**glabrum** B. pin. **minimum supinum** Sep-  
tentrionale Icon. Lob. ☉

**Hypericum supinum tomentosum alterum**  
Clus. **supinum** Dod. ☉

**Hype-**

Hypericum  
albo  
dentis

Hyssopus  
lea. f.

Hyssopus

Hyssopus

B. pin.

\* Hyssopus

Hyssopus

Hyssopus

angustifolius

Hyssopifolius

Gratiol

Jacea

trifolia

Jacea Lusit

Jacea nigra

Jacea lutea

Clus. ☉



*Hypericum frutescens Americanum* flore albo Park. *Pruno sylvestri* affinis *Canadensis* B. pin. app. ☉

*Hyssopus vulgaris* Dod. officinarum cœrulea .s. spicata B. pin. ☉

*Hyssopus rubro* flore hort. Eyst. B. pin. ☉

*Hyssopus* flore albo hort. Eyst. *vulgaris alba* B. pin. ☉

\* *Hyssopus hirsuta* & *striata*. ☉

*Hyssopus latifolia* B. prodr. ☉

*Hyssopus angustifolia* spicato flore Clus. *angustifolia spicata* B. pin. ☉

*Hyssopifolia* .s. *Gratiola minor* B. prodr. *Gratiola minor* Matth. ed. B. ☉

## I.

**J** *Acea Austriaca* villoso capite Clus. *latifolia* capite hirsuto B. pin. ☉

*Acea Lusitanica* sempervirens. ☉ ☉

*Acea nigra* Dod. *nigra laciniata* B. pin. ☉

*Acea lutea* capite spinoso B. pin. luteo flore Clus. ☉

G 3

Jacea

Jacea cyanoides echinato capite B. pin.  
Stœbe Salmantica secunda Clus. Cyanoides flos Dod. ☉

Jacea latifolia purpurea capitulo spinoso B. prodr. ☉

Jacea capite longis aculeis spinoso B. prodr. ☉

Jacea montana incana capite Pini B. pin. ☿

Jacea Oleæ folio capitulis simplicibus B. pin. Ptarmica Austriaca Dod. Clus. ☿

Jacea Oleæ folio minore flore B. pin. Ptarmicæ Austriacæ species Clus. cur. post. ☿

\* Jacea Babylonica B. prodr. ☉

\* Jacea fruticans Pini folio C. B. Stœbe capitata Rorismarini folio Ponæ. ☉

\* Jacea integri-folia humilis C. B. ☉

\* Jacea pumila Adv. Lob. ☉

Jacobæa Dod. vulgaris laciniata B. pin. ☉

Jacobæa foliis amplioribus incanis. ☉

Jacobæa maritima B. pin. Cineraria hist. Lugd. ☉

\* Jacobæa Crithmi litorei foliis. ☿ ☉

\* Jacobæa Senecionis folio. ☿ ☿

Jasminum Dod. vulgatius flore albo B. pin. ☉ Jasmi-

*Jasminum humilium* magno flore B. pin. *Gels-  
seminum Catalanicum* hort. Eyft. ☉

*Jasminum humile luteum* B. pin. flore luteo  
hort. Eyft. ☉

*Jasminum luteum* vulgò dictum *bacciferum*  
B. pin. *Polemonium Monspeliensium* I-  
con. Lob. ☉

*Jasminum flavum odoratum.* *Gelsiminum*  
*Indicum flavum odoratissimum* Bapt.  
Ferr. ☉

*Jasminum purpureum prælongis filiquis.*  
*Gelseminum hederaceum Indicum Cor-  
nuti.* *Indicum flore phœniceo* Bapt.  
Ferr. ☉

*Iberis Cardamantica* Obs. Lob. *Iberis lati-  
ore folio* B. pin. ☉

\* *Iberis Nasturtii folio* Matth. ed. B. ♀

\* *Iberis virginiana latifolia ramosa.* ☿ ♀

*Ilex major glandifera* Dod. folio rotundi-  
ore molli modicéque sinuato B. pin.

*Ilex minor coccigera* Dod. aculeata cocci-  
glandifera B. pin.

*Imperatoria Matthioli* hist. Lugd. major B.  
pin. ☉

Intybus sativa latifolia, .f. Endivia vulgaris  
B. pin. Intybum sativum Dod. ♀

Intybus sativa angustifolia B. pin. minor  
Matth. ed. B. ♀

Intybus crispa B. pin. Intubum crispum hist.  
Lugd. ♀

Iris nostras vulgaris Icon. Lob. vulgaris Obs.  
ejusdem vulgaris Germanica .f. sylvestris  
B. pin. ☉

Iris alba florentina B. pin. florentina hort.  
Eyst. ☉

Iris latifolia major .f. Susiana Clus. Susiana  
flore maximo ex albo nigricante B. pin. ☉

Iris Dalmatica major hist. Lugd. Asiatica  
cœrulea polyanthos B. pin. Eadem flore  
violaceo, & dilutius violaceo. ☉

Iris exotica Cam. major latifolia 14<sup>a</sup> Clus.  
latifolia odore Oxyacanthæ B. pin. ☉

Iris latifolia pannonica colore multiplici B.  
pin. major latifolia 15<sup>a</sup> Clus. ☉

Iris palustris lutea Tab. Acorus adulterinus  
B. pin. ☉

Iris Tripolitana Clus. descr. media longissi-  
mis foliis lutea B. pin. ☉

Iris sylvestris Byzantina peramœna Icon.  
Lob.



Lob. pratensis angustifolia non foetida  
altior B. pin. ☉

Iris angustifolia prunum redolens minor B.  
pin. perpusilla sylvestris angustifolia Obs.  
Lob. ☉

Iris bulbosa latifolia .s. prima Clus. bulbosa  
latifolia acaulos odora B. pin. Eadem  
flore albo. ☉

Iris Persica variegata praecox Bapt. Ferr. ☉

Iris bulbosa Anglicana flore coeruleo hort.  
Eyft. ☉

Iris bulbosa Anglicana major flore candido  
hort. Eyft. ☉

Iris bulbosa violaceo flore Clus. foliis cepa-  
ceis maculatis flore purpureo inodoro  
B. pin. ☉

Iris bulbosa latifolia vulgò dicta Iris l' Ab-  
bé. ☉ ☉

Iris alba oris coeruleis Swert. & Rob. in  
horto Valet. ☉

Iris bulbosa lutea versicolor B. pin. ☉

Iris tuberosa Belgarum Icon. Lob. tuberosa  
folio anguloso B. pin. ☉

\* Iris tuberosa matitima C. B. P. ☉

\* Iris bulbosa lutea major. ☉ ☉

Isatis

*Isatis fativa*, vel *latifolia* B. pin. *Glastrum fativum* Obs. & Icon. Lob. ☞

*Jujubæ majores oblongæ* B. pin. *Ziziphus rutila* Clus.

*Juncus acutus paniculâ sparsâ* B. pin. *acutus* Dod. ☉

*Juncus maximus* .f. *Scirpus major* B. pin. *Holoschœnos* Dod. ☉

*Juncus lævis paniculâ sparsâ major* B. pin. *lævis* Dod. ☉

*Juncus lævis paniculâ non sparsâ* B. pin. *lævis glomerato flore* Icon. Lob. ☉

*Juncellus omnium minimus* Ad. Lob. descr. ☉

*Juncus capitulis Equiseti major* B. pin. *clavatus Dalechampii* hist. Lugd. ☉

*Juncus Lithospermi semine.* ☞ ☉

\* *Juncus acutus caule triangulo* B. in prodr. ☉

\* *Juncus acutis Sorghi capitulis.* ☞ ☉

*Juniperus* Dod. *vulgaris fruticosa* B. pin.

## K.

**K**ALI geniculatum majus B. pin. Sali-  
cornia Dod. ☞

Kali spinoso affinis B. pin. Tragum Matth.  
ed. B. ☞

\* Kali sempervirens grandius perpetuum  
B. prodr. descr. ☉

\* Kali minus Gesn. hort. album Ger. ☞

## L.

**L**ACTUCA sativa B. pin. sativa folio Sca-  
riolæ Obs. & Icon. Lob. ☞

Lactuca Romana dulcior nigriore, & Sca-  
riolæ hortensis folio, semine nigro Ad.  
Lob. folio obscurius virente, semine ni-  
gro B. pin. ☞

Lactuca maculosa B. pin. fusci ac veluti  
purpurei coloris .s. ex albedo rubicunda  
Dod. descr. ☞

Lactuca capitata Dod. B. pin. ☞

Lactuca

*Lactuca Italica laciniata* B. prodr. ♀

*Lactuca crispa* Dod. B. pin. ♀

*Lactuca crispa secunda* Tab. ♀

*Lactuca sylvestris costâ spinosâ* B. pin. sylvestris Dod. ♀

*Lactuca sylvestris odore viroso* B. pin. agrestis Ad. & Icon. Lob. ♀

*Lactuca montana purpureocœrulea major* B. pin. *Sonchus montanus purpureus* πτε-  
πιπλεον Col. ☉

*Lamium purpureum foetidum folio subrotundo* B. pin. *Urtica iners altera* Dod, Idem flore albo. ♀

*Lamium purpureum, vel album non foetens folio oblongo* B. pin. *Urtica iners* .s. *Lamium primum* Dod. Idem flore luteo, ☉

*Lamium folio oblongo luteum* B. pin. luteum Icon. Lob. ☉

*Lamium maculatum, & albâ lineâ notatum* B. pin. *Lamium Plinii Campoclarense & montanum* Col. ☉

*Lamium foliis caulem ambientibus majus* B. pin. *Ballote crispa major* hist Lugd. ♀

*Lamium maximum sylvaticum* B. pin. *Urtica*



tica herculea Tragi hist. Lugd. Gale-  
opsis legitima Clus. ☉

Lamium maximum sylvaticum alterum B.  
pin. Galeopsis maxima pannonica Clus. ☉

Lamium montanum Melissæ folio B. pin.  
Melissophyllum verum Fuchs. Idem flo-  
re albo quod

Lamium pannonicum primum albo  
flore Clus. ☉

Lamium peregrinum .f. Scutellaria B. pin.  
Lamium astragaloïdes Cornuti. Cassida  
Col. ☉

\* Lamium Parietariæ facie. ☿ ☉

Lapathum fativum Dod. utr. ed. Hippo-  
lapathum hortense hist. Lugd. ☉

Lapathum hortense .f. Spinacia semine spi-  
noso B. pin. Spinacia hist. Lugd. ♀

Lapathum hortense f. spinacia semine spi-  
noso B. pin. Spinachia semine non spinoso  
Matth. ed. B. ♀

Lapathum folio acuto plano B. pin. sylve-  
stre .f. Oxylapathum Dod. ☉

Lapathum folio acuto crispo B. pin. acutum  
crispum Tab. ☉

Lapathum sanguineum Obs. Lob. folio a-  
cuto rubente B. pin. ♀ La-

Lapathum acutum minimum Icon. Lob.  
minimum B. pin. ☉

Lapathum unctuosum B. pin. Bonus henri-  
cus Matth. ed. B. ☿

Lapathum folio subrotundo B. pin. folio  
minus acuto Icon. Lob. fidium instar. J.  
B. ☉

Lapathum rotundifolium Cam. Hippola-  
pathum rotundifolium montanum B.  
pin. ☉

Lapathum aquaticum folio cubitali B. pin.  
Hydrolapathum majus Obs. Lob. ☉

Lappa major, Arcium Dioscoridis B. pin.  
Bardana, sive Lappa major Dod. ☿

Lappa minor, Xanthium Dioscoridis B. pin.  
Xanthium Fuchs. ☿

Larix Dod.

Laserpitium Gallicum B. pin. è regione  
Massiliæ repertum Ad. Lob. ☉

Laserpitium alterum. ☿ ☉

\* Laserpitium fol. Lobatis augustis. ☿ ☉

\* Laserpitium fol. Lobatis latioribus sem.  
crispo, costus amara sem. crispo J. B. ☉

Lathy-

(III)

Lathyris major B. pin. Cataputia vulgaris  
hort. Eyst. ♀

Lathyrus sativus flore fructuque albo B.  
pin. Aracus .f. Cicera Dod. Idem flore  
purpureo. ♀

Lathyrus sylvestris minor B. pin. Catanance  
Dodonæi hist. Lugd. ♀

Lathyrus latifolius B. pin. Clymenum Mat-  
thioli Clus. ☉

Lathyrus latifolius annuus siliquâ hirsutâ.  
☿ ☉

Lathyrus sylvestris luteus foliis viciæ B. pin.  
Legumen terræ glandibus simile Dod. ☉

Lathyrus arvensis repens tuberosus B. pin.  
Terræ glandes Dod. ☉

Lathyrus flore obsoleto, siliquâ pisi mino-  
ris. ☿ ♀

Lathyrus Baticus flore luteo Park. ♀

\* Lathyrus Narbonensis angustifol. major  
J. B. ☉

\* Lathyrus angustifol. Baticus elegans si-  
liquis Orobi Park. ♀

\* Lathyrus *πυλαβόλος*, siliquâ breviori,  
fol. tenuiori, flore rubro. J. B. ♀

\* Lathyrus *πυλαβόλος*, siliquâ pisi minoris  
flore rubro. ☿ ♀

\* La-

\* Lathyrus λεπιδόλοϛ, sem. hexedro, flore  
cœruleo. ♂ ♀

\* Lathyrus λεπιδόλοϛ, sem. rotundo, flore  
rubello. ♂ ♀

Lavandula latifolia B. pin. Nardus Italica.  
Matth. ed. B. ☉

Lavandula angustifolia B. pin. altera Dod.  
Eadem flore albo quæ

Lavandula alba Icon. Lob. ☉

Lavandula folio dissecto B. pin. Lavendula  
multifido folio Clus. ♀

Laureola Dod. sempervirens flore viridi;  
quibusdam Laureola mas B. pin. ☉

Laureola folio deciduo, flore purpureo B.  
pin. Mezereum Germanicum Obs. Lob.

Idem flore albo B. pin. descr. ☉

Laurus vulgaris B. pin. Laurus Matth. ed. B.

Laurus tinus cœruleâ baccâ Icon. Lob. syl-  
vestris Corni fœminæ foliis subhirsutis B.  
pin,

\* Laurus Indica hort. Ferneliani.

Laurus Alexandrina fructu pediculo infi-  
dente B. pin. Hippoglossum Dod. ☉

Laurus



Laurus Alexandrina fructu folio insidente  
B. pin. Alexandrina vera hist. Lugd. ☉

Laurus Alexandrina fructu longis pediculis  
caulibus alligato. ☿ ☉

Lenticula palustris quadrifolia B. pin. Lem-  
na Theophrasti hist. Lugd. ♀

Lens vulgaris B. pin. minor Dod. ♀

Lens major Tab. B. pin. ♀

Lentiscus Dod. vulgaris B. pin.

Leontopetalon Dod. ☉

Lepidium Plinii Dod. latifolium B. pin. ☉

Lepidium annuum Lobelii hist. Lugd. gla-  
stifolium B. pin. ♀

Lepidium, Dentellaria dictum B. pin. Plum-  
bago quorundam Clus. ☉

Leucoium bulbosum vulgare B. pin. bul-  
bosum hexaphyllum Dod. ☉

Leucoium bulbosum trifolium minus B. pin.  
bulbosum triphyllum Dod. ☉

Leucoium incanum majus B. pin. candidum  
majus Dod. ☉

H

Leu-

*Leucolum purpureum vel rubrum* B. pin.  
flore rubro simplici hort. Eyst. Idem,  
quod violaceum Tab. ☉

*Leucoium incanum majus variegatum sim-*  
plici flore B. pin. ☉

*Leucoium incanum majus multiplex* B. pin.  
flore pleno albo, rubro pleno hort. Eyst.  
Idem flore pleno violaceo. ☉

*Leucoium incanum majus variegatum ple-*  
no flore B. pin. purpureum variegatum  
flore pleno hort. Eyst. ☉

*Leucoium maritimum sinuato folio* B. pin.  
marinum majus Clus. ☉

*Leucoium maritimum angustifolium* B. pin.  
marinum minus Clus. ☉

*Leucoium alyssoides clypeatum majus* B.  
pin. Alysson Dioscoridis Dod. ♀

*Leucoium incanum siliquis rotundis* B. pin.  
marinum Patavinum Obs. & Icon. Lob.  
*Eruca peregrina* Clus. ☉

*Leucoium album odoratissimum folio viri-*  
di B. prodr. ☉

*Leucoium luteum magno flore* B. pin. flos  
Keiri simplex medius hort. Eyst. ☉

*Leucoium luteum vulgare* B. pin. luteum  
Dod. ☉

Leu-

*Leucoium luteum sylvestre angustifolium*

B. pin. sylvestre Clus. ☉

*Leucoium flore luteo pleno majus hort.*

Eyst. B. pin.

Idem flore pleno variegato. ☉

*Leucoium flore luteo pleno minus hort.*

Eyst. ☉

\* *Leucoium montanum flore pedato Col.*

☉

*Libanotis latifolia altera .s. vulgatio* B.

pin. Sefeli Æthiopicum herba Dod. ☉

*Libanotis latifolia Aquilegiæ folio* B.

prodr. ☉

*Libanotis Ferulæ folio, semine anguloso* B.

pin. Cachrys verior, Libanotis Galeno

Obs. Lob. ☉

*Libanotis Ferulæ folio & semine* B. pin.

Panaces Asclepium Dod. ☉

*Ligusticum vulgare, An Libanotis fertilis*

Theophrasti B. pin. Levisticum vulgare

Dod. ☉

*Ligusticum, quod Sefeli officinarum* B. pin.

Siler montanum Dod. ☉

*Ligusticum .s. Siler montanum angustifoli-*

um B. prodr. ☉

H 2

L7

*Ligustrum* Matth. ed. B. Germanicum B. pin.

*Ligustrum* foliis laciniatis B. pin. nigrum  
Prosp. Alp. de exot. Agem Lilag Persa-  
rum Cornuti.

*Lilium* candidum Dod. album flore erecto  
& vulgare B. pin.

*Lilium* album inodorum flore pleno. ☉

*Lilium* purpureo-croceum majus B. pin. He-  
merocallis Matth. ed. B. ☉

*Lilium* floribus reflexis montanum B. pin.  
montanum flore purpurascente puncta-  
tum hort. Eyst. ☉

*Lilium* floribus reflexis alterum lanugine  
hirsutum B. pin. flore purpurascente non  
punctatum hort. Eyst. ☉

*Lilium* floribus reflexis albis non punctatis  
B. pin. montanum minus album non pun-  
ctatum hort. Eyst. ☉

*Lilium* purpureo-sanguineum flore reflexo B.  
pin. Hemerocallis Chalcedonica purpu-  
ro-sanguinea polyanthos Obs. Lob. ☉

*Lilium* flavum angustifolium B. pin. monta-  
num flavo flore Lobel. Ad. part 2<sup>a</sup>. ☉

*Lilium* .s. Corona imperialis B. pin. Corona  
imperialis Dod. ☉



*Lilium* .f. *Corona imperialis* flore luteo B.  
pin. descr. & Clus. descr. ☉

*Lilium* .f. *Corona imperialis* duplici coronā  
B. pin. *Corona imperialis* florum classe  
duplici hort. Eyst. ☉

\* *Lilium* .f. *Corona imperialis* fol. vario  
☉ ☉

*Lilium* *Persicum* Dod. ☉

*Lilium* luteum *Asphodeli* radice B. pin. *Li-*  
*lialsphodelus* luteo flore Clus. ☉ *Angu-*  
*stifolius* flore luteo. ☉

*Lilium* rubrum *Asphodeli* radice B. pin. *Li-*  
*lialsphodelus* puniceus Clus. descr. ☉

\* *Liliasphodelus* latifolius flore luteo.

☉ ☉

\* *Lilium* .f. *Martagon Canadense*. ☉ ☉

*Lilionarcissus* Indicus Bapt. Ferr. ☉

*Lilium* convallium Matth. ed B. album B.  
pin. ☉

*Lilium* convallium flore rubente B. pin. flo-  
re suaverubente Icon. Lob. ☉

*Lilium* convallium minus B. pin. *Monophyl-*  
*lon* Matth. ed. B. ☉

*Limonium* Matth. ed. B. maritimum majus  
B. pin. ☉

*Limonium parvum* Bellidis minoris folio B.  
pin. pumilum Clus. descr. ☉

*Limonium Rauwolfii* .s. peregrinum Clus.  
cur. post. peregrinum foliis Asplenii B.  
pin. ♀

*Linaria latifolia* Dalmatica magno flore B.  
prodr. ♀

*Linaria* Bellidis folio B. prodr. purpurea o-  
dorata Obs. & Icon. Lob. ☉

*Linaria scoparia* B. pin. Osyris Dod. ♀

*Linaria vulgaris* lutea flore majore B. pin.  
prima Dod. ☉

*Linaria lutea* flore minimo B. pin. ♀

*Linaria aurea* Tragi Obs. & Icon. Lob.  
folioso capitulo luteo major B. pin. ☉

*Linaria* folioso capitulo luteo minor B. pin.  
aurea minor Tab. ☉

*Linaria purpurea* major odorata B. pin.  
altera purpurea Dod. ☉

*Linaria arvensis* cœrulea erecta B. prodr. ♀

*Linaria montana* flosculis albicantibus B.  
pin. Anthyllis montana hist. Lugd. ☉

*Linaria quadrifolia* lutea B. pin. tetraphylla  
lutea Col. ♀

*Linaria cœrulea* repens B. pin. Osyris pur-  
purocœrulea

purocœrulea repens Icon. Lob. Eadem  
flore albo. ☉

Linaria minima hirsuta flore cbsoleto. ☿ ♀

Linaria minor cœrulea recta Park. ♀

\* Linaria minor viscosa flore luteo. ☿ ♀

\* Linaria Armoriaca flore saturate vio-  
laceo. ☿ ♀

\* Linaria major angustifolia glabra flore  
luteo maj. ☿ ♀

Lingua cervina officinarum B. pin. Phyllitis  
Dod. ☉

Lingua cervina multifido folio B. pin, Phil-  
litis laciniata Dod. ☉

Linum sativum Dod. B. pin. ♀

Linum sylvestre luteum foliis subrotun-  
dis B. pin. Campanula lutea linifolia Pe-  
næ hist. Lugd. ☉

Linum maritimum luteum B. pin. marinum  
luteum Narbonense Obs. & Icon. Lob. ☉

Linum sylvestre angustifolium floribus di-  
lutè purpurascens, vel carneis B. pin.  
sylvestre sextum angustifolium Clus.  
descr. ☉

Linum sylvestre minus B. pin, Chamælinum

.f. *Linum sylvestre perpusillum* Obs. &  
Icon. Lob. ♀

*Linum pratense flosculis exiguis* B. pin.  
sylvestre catharticum Ger. *Linocarpus*  
Thal. ♀

\* *Linum annuum luteum folio latiore.* ☸  
♀

\* *Linum annuum luteum folio angustiore.*  
☸ ♀

\* *Linum perenne cœruleum sativo æmu-*  
*lum.* ☸ ☉

\* *Linum minimum stellatum* B. prodr. ♀

*Lithospermum arundinaceum* Dal. hist.  
Lugd. arundinaceum forte *Dioscoridis*  
& *Plinii* B. pin. ♀

*Lithospermum majus erectum* B. pin. minus  
Dod. ☉

*Lithospermum minus repens latifolium* B.  
pin. repens majus Clus. ☉

*Lithospermum arvense radice rubra* B. pin.  
nigrum Dal. hist. Lugd. ♀

*Lithospermum Linariæ folio Germanicum*  
B. pin. *Linaria altera botryoides montana*  
Col. ♀

Lonchitis



*Lonchitis aspera* Dod. minor B. pin. ☉

*Lotus hortensis odora* B. pin. *Trifolium odoratum* alterum f. *Lotus sativa* Dod. ♀

*Lotus* f. *Melilotus pentaphyllos minor glabra* B. pin. *Trifolium corniculatum primum* Dod. ☉

*Lotus pentaphyllos minor hirsutus siliquâ angustissimâ* B. pin. *Trifolium corniculatum minus pilosum ejusdem prodr.* descr. ☉

*Lotus pentaphyllos siliquosus villosus* B. pin. *hæmorrhoidalis major* f. *Trifolium hæmorrhoidale majus* Park. ☉

*Lotus siliquosus glaber flore rotundo* B. pin. *Lybica* Dal. hist. Lugd. ☉

*Lotus fruticosus incanus siliquosus* B. pin. *asperior fruticosa* f. *Narbonensis incana* Obs. & Icon. Lob. ☉

*Lotus pratensis siliquosus luteus* B. pin. *trifolia pratensis siliquosa Monspeliensium* Icon. Lob. ☉

*Lotus ruber siliquâ angulosâ* B. pin. *tetragonolobus Camerarii hort.* Eyst. ♀

*Lotus siliquis Ornithopodii* B. pin. *peculiaris siliquis Ornithopodii* Cam. ♀

*Lotus*

**Lotus pentaphyllos** vesicaria B. pin. Trifolium halicacabum Cam. ♀

\* **Lotus** siliquis singularibus, binis Ternisve J. B. ♀

**Loto** affinis vulneraria pratensis B. pin. Anthyllis leguminosa Belgarum Obs. & Icon. Lob. ☉

**Loto** affinis hirsuta flore subrubente B. pin. Anthyllis leguminosa purpurascente flore Clus. descr. ☉

**Lotus arbor** Obs. Lob. **Lotus** fructu Ceraci B. pin.

**Lotus latifolia** Africana B. pin. Guajacum Patavinum Obs. & Icon. Lob.

**Lupinus sativus** Dod. sativus flore albo B. pin. ♀

**Lupinus sylvestris** flore cœruleo B. pin. sylvestris Dod. ♀

**Lupinus flavo** flore Clus. sylvestris flore luteo B. pin. ♀

**Lupinus Indicus** Cornuti peregrinus major, vel villosus cœruleus major B. pin. Sativus major hort. Eyst. ♀

\* **Lupinus medius** cœruleus Park. ♀

**Lupulus**

*Lupulus* Dod. *Lupulus* mas B. pin. ☉

*Luteola* Obs. & Icon. Lob. *Luteola* herba  
salicis folio B. pin. ♀

*Lychnis hirsuta* flore coccineo major B. pin.  
Flos Constantinopolitanus miniatus hort.  
Eyst. Eadem quæ

Flos Constantinopolitanus incarnatus  
hort. Eyst.

Flos Constantinopolitanus albus hort.  
Eyst. ☉

*Lychnis Chalcedonica* flore pleno minia-  
to. ☉

*Lychnis coronaria* Dod. *coronaria* flore ru-  
bro simplici hort. Eyst. *coronaria* Diof-  
coridis sativa B. pin. ☉

*Lychnis coronaria* flore albo simplici hort.  
Eyst. ☉

*Lychnis coronaria* flore incarnato punctato  
hort. Eyst. ☉

*Lychnis coronaria* flore rubro pleno hort.  
Eyst. ☉

*Lychnis sylvestris* alba multiplex B. pin. O-  
cimoïdes majus Matthioli hist. Lugd. ☉

*Lychnis sylvestris* alba multiplex B. pin.  
sylvestris

sylvestris flore pleno albo hort. Eyst. ☉  
 Lychnis sylvestris, seu aquatica purpurea  
 simplex B. pin. sylvestris rubello flore  
 Obs. Lob. ☉

Lychnis segetum major B. pin. Pseudome-  
 lanthium Matth. ed. B. ☿

Lychnis segetum rubra foliis Perfoliatæ B.  
 pin. Vaccaria Dod. Eadem flore albo. ☿

Lychnis sylvestris quæ Been album vulgò  
 B. pin. Behen album .s. Polemonium Dod.

☉

\* Lychnis, Papaver spumeum angustifo-  
 lium glabrum flore purpureo. ☿ ☉

\* Lychnis Papaver spumeum latifolium  
 vulgare hirsutum. ☿ ☉

Lychnis sylvestris latifolia calyculis turgi-  
 dis striatis B. pin. sylvestris secunda Clus.  
 Eadem flore albo. ☿

Lychnis noctiflora B. pin. Ocimoïdes no-  
 ctiflora Cam. Ocimastrum noctiflorum  
 flore albo hort. Eyst. ☉

Lychnis maritima repens B. pin. marina An-  
 glica Ad. Et Icon. Lob. ☉

Lychnis montana viscosa alba latifolia B.  
 pin. sylvestris nona Clus. ☉

Lychnis sylvestris viscosa rubra angusti-  
 folia



folia B. pin. viscosa sylvestris flore incarnato hort. Eyft. ☿

Lychnis sylvestris viscosa rubra altera B. pin. sylvestris tertia Clus. ☿

Lychnis viscosa purpurea latifolia lævis B. pin. Muscipula flore rubro hort. Eyft. Eadem flore albo, quæ

Muscipula flore albo hort. Eyft. ☿

Lychnis viscosa flore muscoso B. pin. Sesamoïdes magnum Salmanticum Clus. ☉

Lychnis plumaria Tab. ☉

Lychnis sylvestris lanuginosa minor B. pin. sylvestris hirta minima Obs. & Icon. Lob. ☿

Lychnis, vel Ocimoïdes repens montanum B. pin. Ocimoïdes repens Polygoni folio Ad. Lob. ☉

Lychnis Alpina glabra Caryophylli holostii flore. ☿ ☉

Lychnis viscosa minor saxatilis. ☿ ☉

Lychnis Alpina pumila folio gramineo .s. Muscus Alpinus Lychnidis flore B. pin. Ocimoïdes muscosus Ponæ descr. mont. Bald. ☉

\* Lychnis flore muscoso capillaceo. ☿ ☿

\* Lychnis maritima repens strictissimis foliis. ☿ ☉

\* Lych-

\* *Lychnis minor Alpina* glabra foliis longis, an *Caryophylli minima* species flore albo J. B. ☉

\* *Lychnis minor Alpina hirsuta* petalis non bifidis latiori fol. ☿ ☉

\* *Lychnis minor Alpina hirsuta* petalis non bifidis juniperinis fol. .s. auricula muris pulchro flore, fol. tenuissimo J. B. ☉

*Lycium* facie *Pruni sylvestris* .s. *Italicum* B. pin. *Spina infectoria pumila* secunda Clus.

*Lycopsis* B. pin. altera *Anglica* Obs. & Icon. Lob. ♀

*Lycopsis Monspeliaca* floribus dilutè purpureis. ♀

*Lycopsis Monspeliaca* floribus albis. ☿ ♀

*Lysimachia lutea* Fuchs. lutea major quæ *Dioscoridis* B. pin. ☉

*Lysimachia lutea corniculata* B. pin. app. ♀

\* *Lysimachia corniculata minor lutea Canadensis*. ☿ ♀

\* *Lysimachia lutea* flore globoso Park. Ger. ☉

*Lysima-*

- Lyfimachia filiquosa hirsuta magno flore* B.  
 pin. *purpurea* Fuchf. ☉  
*Lyfimachia filiquosa hirsuta parvo flore* B.  
 pin. *filiquosa secunda* Tab. ☉  
*Lyfimachia filiquosa glabra major* B. pin.  
*filiquosa* Obs. & Icon. Lob. ☉  
*Lyfimachia filiquosa glabra minor* B. pin.  
 minor Tab. ☉  
*Lyfimachia Chamænerion dicta latifolia* B.  
 pin. *Chamænerion hort.* Eyft. *Onagra*  
*hif.* Lugd. ☉  
*Lyfimachia Chamænerion dicta angustifo-*  
*lia* B. pin. *Pseudolyfimachium purpureum*  
*minus* Dod. ☉  
*Lyfimachia spicata purpurea* B. pin. *purpu-*  
*rea communis major* Cluf. ☉  
*Lyfimachia purpurea spicata lanuginosa:*  
 ☉ ☉  
*Lyfimachia spicata cœrulea* B. pin. *cœruleo*  
*flore* Cluf. ☉  
*Lyfimachia cœrulea galericulata, vel gra-*  
*tiola cœrulea* B. pin. *galericulata* Obs.  
 & Icon. Lob. ☉  
*Lyfimachia galeata minor purpurea. Gra-*  
*tiola latifolia* Ger. ☉

## M.

**M**AJORANA vulgaris B. pin. Majorana  
 .f. Marum Dod. ☉

Malva sylvestris folio rotundo B. pin. syl-  
 vestris pumila Dod. ☉

Malva sylvestris folio sinuato B. pin. sylve-  
 stris procerior Dod. Eadem flore al-  
 bo. ☉

Malva foliis crispis B. pin. crispa Dod. ♀

Malva trimestris Clus. ♀

Malva folio vario B. prodr. ♂ ♀

Malva rosea folio subrotundo B. pin. hor-  
 tensis flore simplici rubro, incarnato, &  
 albo hort. Eyft. ☉

Malva rosea folio subrotundo flore pleno  
 B. pin. hortensis flore pleno rubro, atro-  
 rubente hort. Eyft. ☉

Malva rosea multiplex flore albo incarnato  
 hort. Eyft. ☉

Malva hortensis flore luteo simplici. Eadem  
 flore pleno. ☉

Malva rosea folio ficus B. pin. rosea simplex  
 peregrina Tab. ☉ Malva



Malva Hispanica. ♂ ♀

\* Malva Betonica folio. ♂ ♀

\* Malva marina arborea nostras Park. ♀

Malus Dod. hist. Lugd.

Malus cydonia fructu oblongo; cydonia  
foemina Rob. Steph. præd. rust.

Malus cydonia fructu rotundo. Cotonea  
Dod.

Malus medica B. pin. citria malus Clus.

Malus Limonia Dod. Limonia acida B. pin.

Malus aurantia Dod. arantia major B. pin.

Malus arantia humilis B. pin. Poma auran-  
tia nana dicta hort. Eyf.

Malus Adami B. pin. Assyria Dod.

Malus punica Dod. punica sativa B. pin.

Malus punica flore pleno. Balauftia hort.  
Eyf.

Malus Persica Dod. Persica molli carne, &  
vulgaris & alba B. pin.

Malus Persica succo quasi sanguineo B. pin.

Malus Persica dura carne candida aliquan-  
do ex albo subrubente B. pin. Persica  
duracina alba Tab.

Malus Armenia major hist. Lugd. Mala  
Armeniaca majora B. pin.

*Malus Armenia minor* hist. Lugd. *Armeniacia minor* B. pin.

*Mandragora mas* Fuchs. fructu rotundo B. pin. ☉

*Mandragora foemina* Clus. fructu pyri B. pin. ☉

*Marum*, *Mastic Gallorum*, & *Anglorum* Ad. Lob. *Sampsuchus*, .f. *Marum Mastichen redolens* B. pin. ☉

\* *Marum Prosp. Alpini*. ☉

*Marrubium Cardiaca dictum* B. pin. *Cardiaca* Dod. ☉

*Marrubium aquatile* Dod. palustre glabrum B. pin. ☉

*Marrubium nigrum foetidum*, *Ballote Dioscoridis* B. pin. *Ballote* .f. *Marrubium nigrum* Dod. Idem flore albo. ☉

*Marrubium nigrum rotundifolium* B. pin. *Ocimastrum Valentinum* Clus. ☉

*Marrubium nigrum longifolium* B. pin. *Herba venti*, *Parietaria Cordi* hist. Lugd. ☉

*Marrubium album vulgare* B. pin. album Obs. & Icon. Lob. *Marru-*

Marrubium album villosum B. prodr. ☉

Marrubium album latifolium peregrinum  
B. pin. candidum alterum Hispanicum  
Obs. & Icon. Lob. ☉

\* Marrubium aquatile foliis tenuius disse-  
ctis. ☿ ☉

\* Marrubium album angustifolium pere-  
grinum C. B. P. rectum Dod, Ger. ☉

Matricaria Dod, vulgaris B. pin. ☉

Matricaria flore pleno B. pin. duplici flore  
Icon. Lob. ☉

Matricaria maritima B. pin. Parthenium  
maritimum minimum hist. Lugd. ☉

\* Matricaria nuda nobis, bullatis foliis  
Park, descr. ☉

Melampyrum purpurascens coma B. pin.

Melampyrum Triticum vaccinum Obs.  
& Icon. Lob. ♀

Melampyrum cristatum flore purpureo. J.  
B. ♀

Melampyrum luteum latifolium B. pin. Cra-  
teogonon Obs. & Icon. Lob. ♀

Melampyrum perpusillum luteum Ad. Lob.  
luteum minimum B. pin. ♀ Vide Ra-  
nunculus.

Melilotus officinarum Germaniæ B. pin.

Germanica Obs. & Icon. Lob. ♀

Melilotus procera filiquis longioribus. An  
meliloti tertium genus Dod. descr. ♀

Melilotus major candida Tragi B. pin. ♀

Melilotus Italica folliculis rotundis B. pin.  
Italica Cam. ♀

Melissa Dod. hortensis B. pin. ☉

\* Melissa Romana hirsutior. ☿ ☉

Melissa peregrina folio oblongo B. pin.  
Moldavica flore cœruleo, albo hort.  
Eyst. ♀

Melissa Moluccana odorata B. pin. Con-  
stantinopolitana Matth. ed. B. ♀

\* Melissa Moluccana spinosior Lob. Ad. ♀

Melissa Batica. ☿ ♀

Melo hist. Lugd. vulgaris B. pin. ♀

Melo rotundus parvus B. pin. saccharatus I-  
con. Lob. ♀

Melopepo clypeiformis B. pin. Cucurbita  
laciniata hist. Lugd. ♀

Melopepo compressus B. pin. compressus  
alter Tab. ♀

Mentha



*Mentha hortensis corymbifera* B. pin. *Costus hortensis* hist. Lugd. ☉

*Mentha hortensis verticillata* Ocimi odore  
B. pin. *Romana angustifolia* .f. *Mentha*  
*cardiaca* Ad. & Icon. Lob. ☉

*Mentha crispa verticillata* B. pin. *sativa*  
*Dodonæi prima* hist. Lugd. ☉

*Mentha rotundifolia crispa spicata* B. pin.  
*altera* Dod. ☉

*Mentha crispa Danica*, aut *Germanica* spe-  
*ciosa* Park. ☉

*Mentha rotundifolia spicata altera* B. pin.  
*Sisymbrium hortense* Matth. ed. B. ☉

*Mentha spicata folio variegato* B. pin. *Men-*  
*thastrum niveum Anglicum* Penæ & Lo-  
*belii* hist. Lugd. ☉

*Mentha sylvestris longiore folio* B. pin. *Men-*  
*thrastrum* Dod. ☉

*Mentha montana verticillata* B. pin. *Men-*  
*thastrum secundum montanum* Clus. ☉

*Mentha tuberosâ radice* B. pin. *Mentha-*  
*strum tertium tuberosâ radice* Clus. ☉

\* *Menthastrum tuberosâ radice flore vio-*  
*laceo majus*. ☉ ☉

\* *Menthastrum tuberosâ radice flore vio-*  
*laceo minus*. ☉ ☉

Menthastrum glabrum floribus violaceis.



Mentha rotundifolia palustris .s. aquatica  
major B. pin. Sisymbrium Dod. ☉

Mentha cataria vulgaris & major B. pin.  
Cattaria herba Dod. ☉

Mentha cataria minor B. prodr. ☉

\* Mentha cataria folio longiori Dod. ☉

\* Mentha cataria media tenuifolia Hispanica Clus. ☉

Mercurialis mas Dod. testiculata .s. mas Dioscoridis & Plinii B. pin. ☿

Mercurialis foemina Dod. spicata .s. foemina Dioscoridis & Plinii B. pin. ☿

Mercurialis montana testiculata B. pin. Cynocrambe, Mercurialis sylvestris Dod. ☉

Mercurialis montana spicata B. pin. Cynocrambe foemina Matth. ed. B. ☉

Mespilus Dod. Germanica folio laurino non ferrato B. pin.

Mespilus aronia Dod. Apii folio laciniato B. pin.

Mespilus Apii folio sylvestris spinosa .s. Oxyacantha B. pin. Spina acuta Dod.

Meum

- Meum Dod. foliis Anethi B. pin. ☉  
 Meum adulterinum Matth. ed. B. latifolium adulterinum B. pin. ☉  
 Milium Dod. semine albo B. pin. ♀  
 Milium semine luteo B. pin. ♀  
 Milium semine nigro B. pin. nigrum Dod. ♀  
 Milium arundinaceum subrotundo semine  
 Sorgo nominatum B. pin. Melica .f. Sor-  
 gum Dod. ♀  
 Millefolium vulgare album B. pin. militaris  
 .f. Millefolium terrestre vulgare Obs.  
 Lob. ☉  
 Millefolium vulgare purpureum minus B.  
 pin. terrestre purpureis floribus Obs. &  
 Icon. Lob. ☉  
 Millefolium rubro flore Clus. purpureum  
 majus B. pin. ☉  
 Millefolium odoratum minus Monspeliensium. ☉ ☉  
 Millefolium album foliis minus dissectis. ☉ ☉  
 ☉  
 Millefolium tomentosum luteum B. pin. luteum Obs. Lob. ☉  
 \* Millefolium Taneceti foliis flore purpureo. ☉ ☉ \* Mil.

\* *Millefolium Tanacetii* foliis flore albo.



*Mollugo* Dod. montana angustifolia, vel  
*Gallium album latifolium* B. pin. ☉

*Moly latifolium liliflorum* B. pin. *Moly*  
*Theophrasti* Clus. Idem flore albo. ☉

*Moly latifolium Indicum* B. pin. *Indicum*  
*Clus.* ☉

*Moly montanum latifolium flavo flore* Clus.  
hist. app. alt. *latifolium luteum* odore  
*Allii primum* B. pin. ☉

*Moly Dioscoridis* Clus. angustifolium um-  
bellatum B. pin. ☉

*Moly moschatum capillaceo folio* B. pin. &  
prodr. ☉

\* *Moly Indicum* Dod. caucaphon voca-  
tum Lob.

*Morus* Dod. fructu nigro B. pin.

*Morus candida* Dod. fructu albo B. pin.

*Myagrum filiquâ longâ* B. pin. alterum  
*Thlaspi effigie* Obs. Lob. ♀

*Myagrum sativum* Matth. ed. B. ejusdem  
pin. ♀

\* *Mya-*



- \* Myagrum sylvestre minus B. pin. ♀  
 Myagrum monospermon latifolium B. pin.  
 & prodr. ♀  
 Myagro similis filiquâ rotundâ B. prodr. ♀  
 Myrrhis Dod. major, vel Cicutaria odorata  
 B. pin. ☉  
 Myrrhis sylvestris seminibus lævibus B. pin.  
 Myrrhis Fuchf. hist. Lugd. ☉  
 \* Myrrhis perennis alba fol. hirsutis. ☿ ☉  
 \* Myrrhis perennis alba foliis hirsutiori-  
 bus. ☿ ☉  
 \* Myrrhis perennis alba foliis hirsutissimis.  
 ☿ ☉  
 \* Myrrhis perennis lutea Daucoïdes. ☿ ♀  
 \* Myrrhis annua nodosa semine aspero.  
 ☿ ♀  
 Myrrhis sylvestris seminibus asperis B. pin.  
 sylvestris nova Æquicclorum Col. ♀  
 Myrtus latifolia Romana B. pin. Romana  
 Matth. ed. B. ☉  
 Myrtus flore pleno Cornuti. ☉  
 Myrtus minor vulgaris B. pin. Tarentina  
 hist. Lugd. ☉  
 \* Myrtus latifolia maxima Park. Clusii  
 hist. fol. confertim nascentibus Laurinis.  
 N.

## N.

**N**A P U S Dod. sativa B. pin. ☿

Narcissus mediopurpureus Dod. albus circulo purpureo B. pin. ☉

Narcissus Orientalis medius totus albus polyanthos hort. Eyft. Orientalis medius albus B. pin. ☉

Narcissus totus albus major B. pin. Orientalis polyanthos minor totus albus hort. Eyft. ☉

Narcissus medioluteus Dod. pallidus circulo luteo B. pin. ☉

Narcissus medioluteus Donas Narbonensium Icon. Lob. medioluteus copioso flore odore gravi B. pin. ☉

Narcissus de Argiers polyanthos totus luteus hort. Eyft. luteus polyanthos Lusitanicus B. pin. ☉

Narcissus latifolius flore prorsus flavo Clus. luteus Constantinopolitanus B. pin. ☉

Narcissus angustifolius flavus magno calice B. pin. juncifolius primus amplo calice Clus. ☉

Nar-

*Narcissus juncifolius major* Dod. *juncifolius-oblongo calice luteus major* B. pin.



*Narcissus juncifolius flore rotundo roseo* B. pin. *juncifolius flore rotundo circinato* Swert. ⊙

*Narcissus maximus pallidus amplo calice flavo* Clus. cur. post. descr. *latifolius pallidus calice amplo alter* B. pin. ⊙

*Narcissus latifolius sulphureus, vel albus brevi calice* B. pin. *sulphurei coloris brevi calice* Swert. ⊙

*Narcissus luteus sylvestris* Dod. *sylvestris pallidus calice luteo* B. pin. ⊙

*Narcissus major totus luteus calice prælongo* B. pin. *Pseudonarcissus major Hispanicus* Clus. ⊙

*Narcissus totus luteus florum foliis reflexis* B. pin. *totus luteus oblongo calice, & reflexis foliis hort.* Eyst. ⊙

*Narcissus oblongâ tubâ totus albus* Swert. *albus oblongo calice* B. pin. ⊙

*Narcissus montanus alter flore fimbriato* B. pin. *montanus juncifolius minimus alter flore luteo fimbriato* Mutoni Icon. Lob.



*Narcissus*

Narcissus nobilis Orientalis polyanthos  
mixtus hort. Eyf. Orientalis flore mul-  
tiplici, & pleno albo-luteo B. pin. ☉

Narcissus incomparabilis flore pleno partim  
flavo, partim croceo. ☉

Narcissus exoticus .f. Constantinopolitanus  
Cam. major flore multiplici hort. Eyf.  
latifolius albus medioluteus B. pin. ☉

Narcissus totus niveus multiplex B. pin.  
albus pleno flore Swert. ☉

Narcissus sylvestris stellatus hort. Eyf. syl-  
vestris multiplex calice carens B. pin. ☉

Narcissus Septentrionalis flore pleno luteo  
hort. Eyf. flore pleno variegato B. pin. ☉

Narcissus juncifolius luteus flore pleno  
hort. Eyf. juncifolius aureus multiplex  
Anemones formâ B. pin. ☉

Narcissus maritimus B. pin. Pancratium hist.  
Lugd. ☉

Narcissus Constantinopolitanus tertius Mat.  
ed. B. Illyricus Liliaceus B. pin. ☉

\* Narcissus Indicus puniceus gemino lati-  
ore folio Bap. Ferr. ☉

\* Narcissus Indicus sphaericus flore Lilia-  
ceo Bap. Ferr.

Nardus



Nardus montana radice olivari B. pin. montana Matth. ed. B. ☉

Nardus montana radice oblongâ B. pin. montana altera Matth. ed. B. ☉

Nasturtium hortense vulgatum B. pin. hortense Dod. ♀

Nasturtium hortense crispum B. prodr. ♀

Nasturtium pratense magno flore B. pin.

Cardamine altera simplici flore Clus. ☉

Nasturtium pratense flore pleno B. pin. Cardamine altera flore pleno Clus. ☉

Nasturtium pratense flosculis minimis, ♂ ♀

Nasturtium aquaticum supinum B. pin. aquaticum Dod. ☉

Nasturtium aquaticum minus B. pin. Cardamine quarta Dal. hist. Lugd. ☉

Nasturtium Alpinum trifolium B. pin. Cardamine Alpina trifolia Clus. ☉

Nasturtium Alpinum Bellidis folio minus B. pin. Plantula Cardaminis alterius æmula Clus. ☉

Nasturtium sylvestre tenuissimè divisum B. pin. Sophia Chirurgorum Obs. & Icon. Lob. ♀

Nasturtium Indicum Dod. Indicum majus B. pin. ♀ \* Na-

\* Nasturtium hortense latifolium B.  
prodr. ♀

\* Nasturtium Alpinum insipidum Ger.  
Tab. Cardamine Alpina insipida Col. ♀

\* Nasturtium sylvestre minus B. prodr. ♀

Nerion floribus rubescentibus B. pin. flore  
rubro hort. Eyft.

Nerion floribus albis B. pin. Nerion .f. Rho-  
dodendron flore albo hort. Eyft.

Nicotiana major latifolia B. pin. Nicotiana  
.f. Tabacum hist. Lugd. ♀

Nicotiana major angustifolia hort. Eyft. B.  
pin. ♀

Nicotiana minor B. pin. minor .f. Hyoscy-  
mus luteus hort. Eyft. ♀

Nigella arvensis cornuta B. pin. Melanthi-  
um sylvestre Dod. ♀

Nigella latifolia flore majore simplici cœ-  
ruleo B. pin. Melanthium Hispanicum  
majus hort. Eyft. ♀

Nigella flore majore pleno cœruleo B. pin.  
Melanthium Damascenum flore pleno  
hort. Eyft. ♀

Nigella

*Nigella flore minore pleno & albo* B. pin.  
*citrina* Ad. Lob. descr. Eadem flore simplici semine nigro. ♀

\* *Nigella sylvestris flore luteo pallido.* ♂  
 ♀

*Nummularia* Dod. major lutea B. pin. ☉

*Nummularia flore purpurascente* B. prodr.  
 ☉

*Nux juglans* Dod. *Nux juglans* .f. *Regia vulgaris* B. pin.

\* *Nux juglans putamine fragili & fructu tenero* C. B. P.

\* *Nymphæa maj. alba* C. B. Pin. alba Matth. Dod. candida Fuchf.

\* *Nymphæa maj. lutea* C.B.P. lutea Dod. Fuchf.

\* *Nymphæa minima alba* C. B. P. morsus Ranæ Dod. Lob. Icon.

O.

## O.

**O**CHRUS folio integro capreolos emit-  
tente B. pin. Ervilia sylvestris Dod. ☿

Ocimum caryophyllatum maximum B. pin.  
latifolium magnum hort. Eyft. ☿

Ocimum Citri odore B. pin. Citratum .f.  
Citri odore hort. Eyft. ☿

Ocimum vulgatus B. pin. Basilicum .f. Oci-  
mum medium vulgatus hort. Eyft. ☿

Ocimum medium foliis ex nigro virescen-  
tibus flore albo & violaceo. ☿

Ocimum Anisi odore B. pin. hort. Eyft. ☿

Ocimum minimum B. pin. minimum cary-  
ophyllatum hort. Eyft. ☿

Ocimum minimum foliis rubescentibus. ☿  
☿

\*Ocimum rubrum pleno flore. ☿ ☿

Oenanthe Apii folio B. pin. secunda Matth.  
ed. B. hist. Lugd. ☉

Oenanthe angustifolia Obs. & Icon. Lob.



Oenanthe



*Oenanthe aquatica* B. pin. *Juncus odoratus*  
*aquatilis* Dod. ☉

\* *Oenanthe Chærophylli foliis* C.B.P. *Ci-*  
*cutæ facie* Ad. Lob. *Succo viroso cicutæ*  
*facie* Lobelio J. B. ☉

*Olea* Dod. *sativa* B. pin.

*Olea sylvestris folio duro subtus incano* B.  
 pin. *sylvestris* Clus.

*Olea Bohemica* .f. *Elæagnos* Matth. ed. B.  
*sylvestris folio molli incano* B. pin.

*Onobrychis* Dod. *foliis Viciæ*, *fructu echi-*  
*nato major* B. pin. *Caput gallinaceum*  
*Belgarum* Obs. & Icon. Lob. ☉

*Onobrychis fructu echinato minor* B. pin.  
*Caput gallinaceum minus ejusdem prod.*  
*descr.* ☉

\* *Onobrychis flore saturate rubro.* ☉

*Onobrychis semine clypeato aspero major*  
 B. pin. *Hedysarum clypeatum flore sua-*  
*viter rubente hort.* Eyf. ☿

*Onobrychis arvensis, vel Campanula arven-*  
*sis erecta* B. pin. *Viola pentagonia, Pen-*  
*tagonium* Tab. ☿

\* *Onobrychis viola pentagonia perfoliata.*

☿ ☿

K

\* Ono-

\* *Onobrychis viola pentagonia latiori folio oblongo.* ♂ ♀

*Ophioglossum* Dod. vulgatum B. pin. ☉

*Ophrys* Plin. *Ophris* Fuchf. *bifolia* B. pin. ☉

*Orchis morio mas foliis maculatis* B. pin.

*Testiculus morionis mas* Dod. ☉

*Orchis morio fœmina* B. pin. *Testiculus morionis fœmina* Dod. Eadem flore roseo & albo. ☉

*Orchis flore simiam referens* B. pin. altera *oreades cercopithecophora* Col. ☉

*Orchis odore hirci longiore, angustioréque folio* B. pin. *saurodes*, vel *scincophora lacertarum æmulatione* Gemmæ Obs. & Icon. Lob. ☉

*Orchis hermaphroditica secunda* Gemmæ .s. *psychodes diphylla* Obs. & Icon. Lob. *bifolia altera* B. pin. ☉

*Orchis hermaphroditica flore flavescente.* Forte, *Serapias batrachites* vel *myodes* Icon. Lob. ☉

*Orchis .s. Testiculus minor violaceis floribus* Cord. fucum referens major foliolis superioribus

perioribus candidis & purpurascensibus  
B. pin. ☉

Orchis melitias, .s. Apis cadaverulum ex-  
primens Obs. & Icon. Lob. fucum referens  
flore subvirente B. pin. ☉

Orchis muscæ corpus referens minor, vel  
galeâ & alis herbidis B. pin. Orchis Se-  
rapias tertius Dod. ☉

Orchis ornithopora, vel ornithes folio lævi  
Obs. & Icon. Lob. papilionem expansum  
herbacei coloris referens B. pin. ☉

Orchis spiralis major. Tetrorchis, vel Tri-  
orchis alba Gemmæ hist. Lugd. Trior-  
chis, vel Tetrorchis alba odorata major  
B. pin. ☉

Orchis spiralis minor .s. Testiculus odoratus  
Obs. & Icon. Lob. Triorchis alba odo-  
rata minor B. pin. ☉

Orchis palmata pratensis latifolia longis  
calcaribus B. pin. Satyrium basilicum mas  
Dod. ☉

Orchis palmata pratensis maculata B. pin.  
Satyrium basilicum foemina Dod. Eadem  
flore candido Dod. descr. ☉

Orchis palmata minor calcaribus oblongis  
B. pin. Palma Christi minor mas Tab.  
Eadem flore albo, ☉ K 2 Or-

Orchis palmata palustris latifolia B. pin. Sa-  
tyrium basilicum foliosum Dod. ☉

\* Orchis hermaphroditica flore luteo pal-  
lido. ☉

\* Orchis palmata flore Fusco. ☿ ☉

Origanum sylvestre .s. vulgare Dod. sylve-  
stre, Cunila bubula Plinii B. pin. Idem  
flore albo, quod

Origanum album Tab. sylvestre al-  
bum B. pin. ☉

Origanum heracleoticum Matth. ed. B. hist.  
Lugd. heracleoticum, Cunila gallinacea  
Plinii B. pin. Idem flore albo. ☉

Origanum fistulosum Canadense Cornuti. ☉

Origano cognata Zatarendi B. pin. Zatar-  
hendi. Origanum Indicum Vell. Obs. in  
Prosp. Alp. ☉

\* Origanum sylvestre humile B. prodr. ☉

Ornithogalum umbellatum medium angu-  
stifolium B. pin. Bulbus leucanthemus  
minor .s. Ornithogalum Dod. ☉

Ornithogalum angustifolium majus floribus  
ex albo virescentibus B. pin. Asphodelus  
bulbosus Galeni Dod. ☉

Ornithogalum



Ornithogalum spicatum flore viridi lactescente B. pin. pannonicum albo flore Clus. ☉

Ornithogalum Neapolitanum Clus. app. alt. exoticum magno flore, minore innato B. pin. ☉

\* Ornithogalum Arrabicum Clus. Eyst. ☉  
Ornithogalum angustifolium bulbiferum B. pin. angustifolium campestre luteum minimum bulbiferum Col. ☉

Ornithopodium Dod. majus B. pin. ♀

\* Ornithopodium *αἰσχίος* nobis, scorpioides leguminosa Lob. ♀

\* Ornithopodium *διέσας* minus nobis, scorpioides altera leguminosa J. B. ♀

\* Orobanche planta clandestina Lugd. app. ☉

\* Orobanche radice dentata maj C. B. P. Dentaria *ἀρύν* ☉ 3 Clus. ☉

\* Orobanche radice dentata minor C. B. P. Dentaria *ἀρύν* ☉ 3 Clus. ☉

Orobis siliquis articulatis semine majore B. pin. receptus herbariorum Obs. & Icon. Lob. ♀

K 3

Oro-

Orobis pannonicus primus Clus. Sylvaticus  
purpureus vernus B. pin. ☉

Orobis sylvaticus foliis Viciæ B. pin. A-  
stragaloides altera herbariorum Icon.  
Lob. ☉

Oxyacantha Dioscoridis .f. Spina acuta py-  
ri folio B. pin. Pyracantha Ad. Lob.

## P.

**P**ÆONIA mas Dod. folio nucis Gern. hort.  
folio nigricante splendido quæ mas B.  
pin. ☉

Pæonia communis vel fœmina B. pin. rubra  
flore simplici hort. Eyf. ☉

Pæonia promiscua .f. neutra Obs. Lob. fœ-  
mina altera B. pin. ☉

Pæonia folio subtus incano flore albo, vel  
pallido B. pin. mas flore albo hort. Eyf.  
☉

Pæonia polyanthos flore rubro hort. Eyf.  
fœmina flore pleno rubro majore B. pin.  
☉

Pæonia

*Pæonia* pleno flore albescente, minor Clus.  
flore exalbido pleno, major & minor B.  
pin. ☉

*Palma* minor B. pin. *Camæriphe*s Dod. ☉

*Panaces* *carpimon* .s. *racemosa* *Canadensis*  
*Cornuti*. ☉

*Panax* *Pastinacæ* folio, An *Syriacum* Theo-  
phraſti B. pin. *Panaces* peregrinum Dod. ☉

*Panicum* Dod. *Germanicum*, .s. paniculâ  
minore B. pin. ♀

*Panicum* *Italicum*, .s. paniculâ majore B.  
pin. *fativum* hist. Lugd. ♀

*Papaver* *hortense* semine albo B. pin. album  
*fativum* Icon. Lob. ♀

*Papaver* *hortense* nigro semine B. pin. ni-  
grum *fativum* Dod. ♀

*Papaver* *cristatum* floribus & semine album  
B. pin. *fimbriatum*, aut *cristatum* album  
Icon. Lob. ♀

*Papaver* *cristatum* floribus rubris semine  
nigro B. pin. *fativum* rubrum *fimbriatum*  
Dal. hist. Lugd. ♀

- Papaver laciniatum rubrum unguibus pur-  
 pureis hort. Eyst.  
 Papaver hortense flore simplici dilutissimè  
 violaceo. ☿  
 Papaver hortense flore simplici placidè ru-  
 bro unguibus plumbeis. ☿  
 Papaver flore multiplici purpurascente  
 hort. Eyst. ☿  
 Papaver flore miniato pleno hort. Eyst. ☿  
 Papaver flore pleno violaceo. ☿  
 Papaver flore pleno, argentei coloris hort.  
 Eyst. ☿  
 Papaver flore pleno album B. pin. polyan-  
 thos Tab. ☿  
 Papaver flore pleno incarnato hort. Eyst ☿  
 Papaver flore pleno rubro hort. Eyst. ☿  
 Papaver flore pleno dilutè violaceo. ☿  
 Papaver erraticum majus B. pin. erraticum  
 Dod. ☿  
 Papaver erraticum flore pleno B. pin. Idem  
 flore pleno igneo, flore pleno rubro, &  
 crispo. ☿  
 \*Papaver erraticum Pyrennium flore fla-  
 vo C.B.P. Argemone Cambrobritannica  
 Park. ☉  
 Papaver corniculatum luteum B. pin. cor-  
 niculatum majus Dod. ☉ \*Pa-



- \* *Papaver corniculatum phœniceum hirsutum* C. B. flore phœniceo Clus. ♀
- \* *Papaver corniculatum violaceum* C. B. Lob. ♀
- Papaver spinosum* B. prodr. ♀
- Parietaria* Dod. officinarum, & Dioscoridis B. pin. ☉
- Pastinaca tenuifolia sylvestris* Dioscoridis, vel *Daucus officinarum* B. pin. *Daucus vulgaris* Clus. ♀
- Pastinaca sylvestris hirsuta echinato fructu* B. pin. *Daucus λασόκτυλλος* Thal. ♀
- \* *Pastinaca tenuifolia lucida*. ☼ ♀
- Pastinaca tenuifolia sativa*, radice lutea, vel alba B. pin. *tenuifolia sativa* Dod. ♀
- Pastinaca tenuifolia sativa*, radice atrorubente B. pin. *sativa rubens* Dod. ♀
- Pastinaca tenuifolia* radice & umbellâ luteâ. ☼ ♀
- Pastinaca sativa latifolia* Dod. B. pin. ♀
- Pastinaca sylvestris latifolia* Dod. *Elaphoboscum* Matth. ed. B. ♀
- Pedicularis Alpina* Filicis folio minor B. pin.

pin. Alektorolophos secunda Clus. descr.

⊙

Pedicularis pratensis purpurea B. pin. Fistularia Dod. ♀

Pedicularis pratensis lutea, vel crista Galli B. pin. Crista Galli Dod. ♀

\*Pentaphylloides fragariae folio. ☞ ⊙

Peplus Dod. Peplus .s. Esula rotunda B. pin. ♀

\*Peplis Clus. hist. maritima folio obtuso C. B. P. ♀

Pepo major oblongus Dod. oblongus B. pin. ♀

Pepo rotundus major Dod. compressus major B. pin. ♀

Pepo rotundus minor Dod. compressus minor B. pin. ♀

Pepo rotundus Melonis effigie B. pin. Indicus minor rotundus Tab. ♀

Pepo rotundus Aurantii formâ B. pin. Cucurbita Aurantii formâ hort. Eyst. ♀

Pepo minor clypeatus B. pin. Indicus minor clypeatus Tab. ♀

Pepo

Pepo minor angulosus B. pin. Indicus minor angulosus Tab. ♀

Perfoliata Dod. vulgarissima .s. arvensis B. pin. ☉

Perfoliata montana Cam. montana latifolia B. pin. ☉

Perfoliata minor angustifolia Bupleuri folio B. pin. minima Bupleuri folio Col. descr. ♀

Periclymenum non perfoliatum Septentrionalium Obs. & Icon. Lob. non perfoliatum Germanicum B. pin. ☉

Periclymenum perfoliatum serotinum flore rubro. ☉

Periclymenum perfoliatum B. pin. perfoliatum calidarum regionum Obs. & Icon. Lob. ☉

Perficaria Dod. mitis maculosa, & non maculosa B. pin. Eadem flore albo. ♀

Perficaria urens .s. hydropiper B. pin. Hydropiperi Dod. ♀

Perficaria pusilla repens Obs. & Icon. Lob. minor B. pin. ♀

Peta-

Petasites Dod. major & vulgaris B. pin. ☉  
 Petasites flore albo hort. Eyft. minor B.  
 pin. ☉

Petasites minor folio Tuffilaginis. ☿ ☉

Peucedanum majus Italicum Lobelii hist.  
 Lugd. B. pin. ☉

Peucedanum Dod. Germanicum B. pin. ☉

\* Peucedanum minus fol. Lobatis angu-  
 ftis. ☿ ☉

\* Peucedanum minus C. B. Pin. felinum  
 montanum pumilum Cluf.

Phalangium parvo flore non ramosum B.  
 pin. non ramosum Dod. ☉

Phalangium parvo flore ramosum B. pin.  
 ramosum Dod. ☉

\* Phalangium Allobrogicum. ☉

Phalangium Virginianum Tradescanti Ger.  
 Idem flore albo. ☉

\* Phalangium Virginianum amplo flore  
 rubro. ☉

\* Phalangium Virginianum amplo flore  
 coeruleo .f. Azureo. ☉

Phalaris Dod. major semine albo B. pin. ♀  
 \* Phalaris



\* Phalaris minore semine nigro. ♂ ♀

Phaseolus vulgaris Obs. & Icon. Lob. Dolichus .s. Phaseolus Dod. fructu albo, cœruleo, nigro, flavo, obsoleto, amethystino, cineraceo, albo nigris lituris distincto, purpureo nigris lituris variegato.

♀

Phaseolus flore puniceo Cornuti. Idem fructu albo, & variegato. ♀

Phaseolus minimus fructu viridi ovato. ♂

♀

\* Phaseolus minor Colossinus filiquis longissimis. ♂ ♀

\* Phaseolus minor albus, macula nigra umbilico notato J. B. ♀

Phillyrea Clus. latifolia spinosa B. pin.

Phillyrea folio leviter serrato B. pin. secunda Clus.

Phillyrea folio Ligustri B. pin. tertia Clus.

Phillyrea angustifolia prima B. pin. quarta Clus.

Phyllum marificum Clus. testiculatum B. pin. ○

Phyllum

*Phyllum foeminificum* Clus. *spicatum* B. pin.



*Picea* hist. Lugd. major prima, .s. *Abies rubra* B. pin.

*Pilosella* major Dod. major repens *hirsuta* B. pin. ⊙

Eadem folio variegato. ⊙

*Pilosella* major repens minus *hirsuta* B. pin.

*Lactucella sylvestris repens* Cam. descr.



*Pilosella Indica* Cornuti descr. *Hieracium peregrinum* hort. Eyst. ⊙

\* *Pilosella umbelifera Macrocaulos* Col. ⊙

\* *Pilosella* major *glabra*. ☼ ⊙

*Pimpinella*, *Saxifraga* major *umbellâ candidâ* B. pin. major Fuchf. ⊙

*Pimpinella*, *Saxifraga* major altera B. pin. minor Fuchf. ⊙

*Pimpinella*, *Saxifraga* minor B. pin. *crispa* .s. *petræa* Tab. ⊙

*Pimpinella sylvestris*, *Sanguisorba* major Dod. *Pimpinella*, *Sanguisorba* major B. pin. ⊙

Pimpi.

Pimpinella maxima Canadensis Cornuti. ☉

Pimpinella maxima Canadensis spicâ longâ  
rubrâ. ☿ ☉

Pimpinella maxima Canadensis spicâ rubrâ  
glomeratâ. ☿ ☉

Pimpinella, Sanguisorba minor hirsuta B.  
pin. Pimpinella, Sanguisorba Dod. ☉

Pimpinella, Sanguisorba minor lævis B. pin.  
☉

Pimpinella agrimonoïdes. ☿ ☉

Pinus domestica Matth. ed. B. sativa B. pin.

Pinus sylvestris montana Matth. ed. B. syl-  
vestris B. pin.

Piper Indicum vulgatissimum B. pin. Indi-  
cum medium hort. Eyf. Capficum, Piper  
Indicum Obs Lob. ☿

Piper Indicum propendentibus filiquis ob-  
longis recurvis B. pin. Capficum recurvis  
filiquis Dod. ☿

Piper Indicum filiquis flavis hort. Eyf. ☿

Piper Indicum propendentibus filiquis ro-  
tundis B. pin. Indicum cordatum hort.  
Eyf. ☿

Piper Indicum filiquis surrectis, & oblongis  
P.

B. pin. Indicum medium longum erectum hort. Eyst. Idem fructu flavo. ♀  
 Piper Indicum minimum erectum hort. Eyst. ♀  
 Piper Indicum siliquis surrectis Cerasi formâ B. pin. Capsicum minimis siliquis Dod. ♀

Pistacia Matth. ed. B. peregrina fructu racemoso .s. Terebinthus Indica Theophrasti B. pin.

Pistacia sylvestris B. pin. Staphylodendron Matth. ed. B. ☉

Pistacia Virginea sylvestris trifolia. ☿ ☉

Pisum majus quadratum B. pin. majus Dod. ♀

Pisum umbellatum B. pin. proliferum Tab. ♀

Pisum hortense majus B. pin. ramulare hist. Lugd. Idem fructu rubro variegato B. pin. descr. ♀

Pisum arvense B. pin. minus Dod. ♀

Pisa sine cortice duriore B. pin. leptoloba Cam. ♀

Pisa nana rotunda. ☿ ♀

\* Pisum



\* *Pisum sylvestre* Viciæ fructu. ☉ ☿  
*Pisum repens* perenne, aliud maritimum  
 Britannicum Park. ☉

*Pisum vesicarium* fructu nigro alba macula  
 notato B. pin. cordatum Ad. & Icon.  
 Lob. ☿

*Plantago maxima* tota glabra B. prodr.  
 maxima Hispanica Cornuti. ☉

*Plantago latifolia* sinuata B. pin. major  
 Dod. ☉

*Plantago latifolia* incana B. pin. media  
 Dod. ☉

*Plantago latifolia* rosea flore expanso B. pin.  
 rosea hort. Eyft. ☉

*Plantago latifolia* rosea floribus quasi in spi-  
 ca dispositis B. pin. rosea spicata hort.  
 Eyft. ☉

*Plantago latifolia* incana spicis variis B. pin.  
 peregrina latifolia Gareti Clus. ☉

*Plantago quinquernervia* Obs. & Icon. Lob.  
 angustifolia major B. pin. ☉

\* *Plantago marina*, quinquenervia incana  
 ☉ ☉

*Plantago aquatica* latifolia B. pin. aquatica  
 Dod. ☉

L

Plantago

*Plantago aquatica angustifolia* B. pin. a-  
quatica humilis angustifolia, & longifolia  
Icon. Lob. ☉

*Plantago aquatica stellata* B. pin. *Damaso-*  
*nium stellatum* hist. Lugd. ☿

*Platanus* Dod. Clus.

\* *Platanus Virginiana* Park. ☉

*Polium Lavendulæ folio* B. pin. recentio-  
rum scemina *Lavendulæ folio* Obs. &  
Icon. Lob. ☉

*Polium montanum luteum* B. pin. luteum  
Dal. hist. Lugd. ☉

*Polium montanum album* B. pin. montanum  
primum Clus. ☉

*Polium montanum secundum flore albo*  
Clus. descr. ☉

\* *Polium rubrum majus flore dilutiori.*  
☿ ☉

\* *Polium rubrum minus, montanum* 5  
*purpureum* Clus. hist. ☉

*Polygala vulgaris* B. pin. *Flos ambarvalis*  
Dod. Eadem quæ

*Polygala cocculea* Tab.

*Polygala alba* Tab. ☿

Po-

*Polygala repens nivea* B. pin. *repens nup-  
rorum* Obs. & Icon. Lob. ♀

*Polygala Valentina* Clus. altera B. pin. ☉

*Polygonatum* Dod. *latifolium vulgare* E.  
pin. ☉

*Polygonatum latifolium flore majore odo-  
ro* B. pin. *latifolium* Fuchf. Dod. ☉

*Polygonatum latifolium hellebori albi fo-  
liis* B. pin. *tertium latiore folio* Clus.  
descr. ☉

*Polygonatum latifolium ramosum* B. pin.  
*ramosum* Dod. ☉

*Polygonatum angustifolium non ramosum*  
B. pin. *angustifolium* Fuchf. hist. Lugd.  
☉

*Polygonatum spicatum sterile* Cornuti. ☉

*Polygonatum ramosum flore luteo majus*  
Cornuti. ☉

*Polygonum latifolium* B. pin. *Polygonum*  
*mas* Dod. ♀

*Polygonum maritimum latifolium* B. pin.  
*marinum prius* Dal. hist. Lugd. ♀

*Polygonum flosculis herbaceis ex alis pro-  
deuntibus.* Polycarpum hist. Lugd. ♀

L 2 *Polygonum*

Polygonum flosculis albis in summitate.

Saxifraga Anglica Ad. Lob. ♀

Polygonum Caryophylli holostii flore. ♂

♀

Polygonum palustre alfinefolium, Saxifraga

palustris alfinefolia Ger. ♀

Polygonum montanum minimum niveum

Obf. Lob. minus candicans B. pin. ♀

Polygonum littoreum minus flosculis spadiceo-albicantibus B. prodr. descr. ♀

Polygonum minus .f. Millegrana major B.

pin. Herniaria Dod. ♀

Polygonum minus .f. Millegrana major foliis glabris B. pin. descr. ♀

Polygonum minus maritimum incanum. ♂

♀

Polygonum minimum .f. Millegrana minima

B. pin. Millegrana minima Icon. Lob. ♀

\* Polygonum marinum minus Serpilli fol.

C. B. P. ♀

Polypodium majus Dod. vulgare B. pin. ○

Populus alba Dod. B. pin.

Populus nigra Dod. B. pin.

Populus tremula B. pin. Lybica Dod.

Porrum



Porrum commune capitatum B. pin. capitatum Fuchf. ☿

Porrum folio latissimo B. pin. Syriacum Tab. ☿

\* Porrum sylvestre Vinearum C.B.P. Ampeloprasum Lugd. ☿

Porrum sectivum juncifolium B. pin. Schœnoprasum Dod. ☉

Portulaca hortensis Fuchf. latifolia .s. fativa B. pin. ☿

Portulaca hortensis folio flavo. ☿ ☿

Portulaca sylvestris Dod. angustifolia .s. sylvestris B. pin. ☿

\* Portulaca minima alba. ☿ ☿

\* Potamogeton salicis fol. C. B. Pin. potamogeton Dod. ☉

Potentilla Fuchf. Argentina .s. Potentilla Dod. ☉

Poterion Obs. & Icon. Lob. Poterio affinis, foliis Pimpinellæ, spinosa B. pin. ☉

Prunus Dod.

*Prunus fructu rotundo nigropurpureo dulci* B. pin. *Prunus myrobalanus* Clus.  
*Prunus sylvestris* Obs. & Icon. Lob. B. pin.

*Pseudodictamnus verticillatus inodorus* B. pin. *Pseudodictamnus* Dod. ☉

*Psyllium Plinianum* forte, radice perenni  
 supinum Obs. & Icon. Lob. majus supinum B. pin. ☉

*Psyllium* Dod. majus erectum B. pin. ☿

\* *Ptarmica Virginiana folio Helenii*. ☿  
 ☉

\* *Ptarmica foliis scabrosæ* B. prodr. ☉  
 Vide *dracunculus*.

*Pulegium latifolium* B. pin. regium hist.  
 Lugd. Idem flore albo. ☉

*Pulegium angustifolium* B. pin. cervinum  
 hist. Lugd. Idem flore albo. ☉

\* *Pulegium densi saraculis* Park. ☉

*Pulsatilla* Dod. folio crassiore, & majore  
 flore B. pin. ☉

*Pulsatilla* flore albo B. pin. albo Lobelii hist.  
 Lugd. ☉ Py-

(167)

Pyrola Dod. rotundifolia major B. pin. ☉

Pyrus Dod. fativa B. pin.

Pyrus sylvestris B. pin. Pyra sylvestria Tab.

---

Q.

\* QUADRIFOLIUM albo flore phæum  
Fuchf. Lugd. ☉ A luxuriante na-  
tura à Trifolio in quadrifolium macula-  
tum, degenerans.

Quercus cum longo pediculo B. pin. He-  
meris etymodrys hist. Lugd.

\* Quercus vulgaris brevi pediculo.

\* Quercus, incanis subtûs foliis, pediculo  
brevi.

\* Quercus incanis subtûs foliis, longo pe-  
diculo.

\* Quercus calyce echinato, glande ma-  
jore.

Quinquefolium majus repens B. pin. majus  
luteum Fuchf. ☉

Quinquefolium minus repens lanuginosum  
luteum B. pin. Pentaphyllum .s. Quin-  
quefolium minus Tab. ☉

Quinquefolium folio argenteo B. pin. cre-  
ctum incanum Matth. ed. B. ☉

Quinquefolium rectum luteum B. pin. Pen-  
taphyllum majus Obs. Lob. ☉

Quinquefolium montanum erectum hirsu-  
tum luteum B. prodr. ☉

\* Quinquefolium siliquosum Prosp. Alp ♀

\* Quinquefolium Alpinum repens seroti-  
num. ☿ ☉

\* Quinquefolium Canadense erectum. ☿  
☉

Quinquefolium fragiferum B. pin. fragife-  
rum quintum Clus. ☉

Quinquefolium fragiferum repens Tab.  
Pentaphyllum supinum Potentillæ facie  
Clus. Quinquefolio fragifero affinis B.  
pin. ☉

Quinquefolium palustre rubrum B. pin. ru-  
brum Dodonæi hist. Lugd. ☉



## R.

**R**ANUNCULUS sylvarum Clus. nemorosus Obs. Lob. Anemone nemorosa flore majore B. pin. Idem flore roseo. ☉

\* Ranunculus nemorosus flore pleno albo. ☉

Ranunculus nemorosus luteus B. pin. Icon. Lob. ☉

Ranunculus auricomus dulcis Tragi Icon. Lob. nemorosus vel sylvaticus folio rotundo B. pin. ☉

Ranunculus nemorosus Thalictri folio B. pin. præcox secundus Thalictri folio Clus. ☉

Ranunculus Thalictri folio minor Asphodeli radicibus Park. Oenanthe Myconi hist. Lugd. malè à B. pin. Oenanthe hederæ foliis. ☉

Ranunculus nemorosus Muscatellina dictus B. pin. Moschatella Cord. hist. ☉

Ranunculus pratensis surrectis cauliculis Obs. & Icon. Lob. pratensis erectus acris B. pin. ☉

Ranunculus

- Ranunculus pratensis* erectus dulcis B. pin.  
*hortensis* erectus flore simplici luteo hort.  
 Eyft. ☉  
*Ranunculus pratensis* reptante cauliculo  
 Obs. & Icon. Lob. *pratensis* repens hir-  
 sutus B. pin. ☉  
*Ranunculus pratensis* repens hirsutus ma-  
 culatus. ☿ ☉  
*Ranunculus bulbosus* Obs. & Icon. Lob.  
*pratensis* radice verticilli modo rotundâ  
 B. pin. ☉  
*Ranunculus hortensis* erectus flore pleno B.  
 pin. erectus *hortensis* flore pleno luteo  
 hort. Eyft. ☉  
*Ranunculus pratensis* reptante cauliculo  
 flore pleno. An *Ranunculus hortensis* in-  
 clinans B. pin. ☉  
*Ranunculus dulcis* flore pleno B. pin. dulcis  
 multiflorus Tab. ☉  
*Ranunculus tuberosus* flore multiplici Dod.  
 radice tuberosâ flore pleno, & prolifero  
 B. pin. ☉  
*Ranunculus folio Aconiti* flore albo multi-  
 plici B. pin. niveus *polyanthes* Lobelii  
 hist. Lugd. ☉  
*Ranunculus arvensis* echinatus B. pin. arvo-  
 rum Icon. Lob. ♀ Ra-

Ranunculus Creticus echinatus latifolius  
 Prosp. Alp. de exot. Stellatus echinatus  
 Creticus B. pin. ☿

Ranunculus palustris Apii folio lævis B. pin.  
 palustris rotundiori folio Obs. & Icon.  
 Lob. ☿

Ranunculus longifolius palustris major B.  
 pin. lanceatus major Tab. ☉

Ranunculus longifolius palustris minor B.  
 pin. flammeus aquaticus angustifolius  
 Obs. & Icon. Lob. ☉

Ranunculus palustris ferratus B. pin. aqua-  
 tilis angustifolius ferratus Obs. & Icon.  
 Lob. ☉

Ranunculus montanus folio gramineo B.  
 pin. pumilus gramineis foliis Icon. Lob.  
 ☉

Ranunculus Illyricus major Clus. descr. la-  
 nuginosus angustifolius grumosa radice  
 major B. pin. ☉

Ranunculus Illyricus Dod. lanuginosus an-  
 gustifolius grumosa radice minor B. pin.  
 ☉

Ranunculus lanuginosus Apii folio, Aspho-  
 deli radice B. pin. alter saxatilis Aspho-  
 deli radice Col. Idem flore pleno. ☉

Ranunculus

Ranunculus Asiaticus grumosa radice flore  
phoeniceo ruberrimo hort. Eyst. Idem  
flore flavo, subalbido. ☉

Ranunculus Creticus grumosa radice flore  
niveo hort. Eyst. ☉

Ranunculus creticus latifolius Clus. Aspho-  
deli radice Creticus B. pin. ☉

Ranunculus Asiaticus grumosa radice flore  
flavo rubris venis distincto Clus. cur.  
post. ☉

Ranunculus Asiaticus flore albo colore sua-  
viter rubente per oras mixto B. pin.  
descr. ☉

Ranunculus Asiaticus grumosa radice, flore  
pleno Clus. Asphodeli radice flore pleno  
sanguineo B. pin. ☉

Ranunculus flore pleno ruberrimo hort.  
Eyst. Asphodeli radice flore subphœ-  
niceo rubente B. pin. ☉

Ranunculus Asiaticus grumosa radice, flore  
pleno sanguineo prolifero hort Eyst. As-  
phodeli radice prolifer miniatus B. pin.  
☉

Ranunculus Asiaticus grumosa radice flore  
ex flavo, & rubro mixto pleno. ☉

Ranunculus Constantinopolitanus gigas  
flore coccineo, ☿ ☉

Ra-



Ranunculus Constantinopolitanus gigas flore byssino. ☞ ☉

Ranunculus montanus Aconiti folio albus flore majore B. pin. albus flore simplici Icon. Lob. ☉

Ranunculus montanus Aconiti folio albus flore minore B. pin. Aconitum batrachioïdes Ad. & Icon. Lob. ☉

Ranunculus montanus Aconiti folio flore globoso B. pin. Ranunculus flore globoso Dod. ☉

\* Ranunculus annuus arvensis flore minimo luteo. ☞ ♀

\* Ranunculus grumosa radice .s. pthora valdensium Clus. ☉

\* Ranunculus præcox rutæ folio 1<sup>a</sup> Clus. ♀

\* Ranunculus ferulaceus spica falcata nobis perperâm, Melampyrum perpusillum Lob. ♀

\* Raphanus sylvestris major flore luteo. ☞ ☉

\* Raphanus aquaticus minimus luteus. ☞ ☉

Raphanus niger B. pin. Icon. Lob. ♀

Raphanus minor oblongus B. pin. Radicula sativa minor Dod. ♀ Ra-

Raphanus rusticus .s. vulgaris Matth. ed.  
B. rusticus B. pin. ☉

Raphanus aquaticus foliis in profundas laciniis divisis B. pin. & prodr. ☉

Raphanus aquaticus alter B. pin. & prodr.  
Raphistrum aquaticum Tab. ☉

\* Raphistrum monospermum B. prodr. ♀

Raphistrum arborum Obs. & Icon. Lob. flore  
luteo B. pin. ♀

Raphistrum flore albo, siliqua articulata B.  
pin. flore albo Erucae foliis Icon. Lob. ♀

Raphistrum flore albo, siliquis in rotundum  
articulatis, alterum arborum Park. ♀

Raphistrum maximum monospermon Cornuti. ♀

\* Rapum vulgare album rotundum. ♀

\* Rapum vulgare album oblongum. ♀

\* Rapum luteum. ☿ ♀

Rapunculus esculentus B. pin. Rapunculum  
Dod. ♀

Rapunculus minor foliis incisissimis B. pin. Erini  
.s. Rapunculi minimum genus Col. phy-  
tob. ♀

Rapunculus

*Rapunculus spicatus* B. pin. *alopecuroïdes*  
longiori spicâ Clus. Idem flore albo. ☉

*Rapunculus folio oblongo spicâ orbiculari*  
B. pin. *Rapuntium corniculatum mon-*  
*tanum* Col. ☉

*Rapunculus scabiosæ capitulo cœruleo* B.  
pin. *Rapuntium montanum capitatum*  
Col. ☿

*Rapunculus persicifolius magno flore* B. pin.  
*Campanula persicifolia nostras* Obs. &  
Icon. Lob. Idem flore albo. ☉

*Rapunculus nemorosus angustifolius mag-*  
*no flore, major* B. pin. *sylvestris major*  
*hort.* Eyst. ☿

*Rapunculus hortensis latiore folio .f. Pyra-*  
*midalis* B. pin. *lactescens campanula ma-*  
*ior Lobelii hist.* Lugd. ☉

\* *Rapunculus Creticus campanula Pyra-*  
*midalis altera* C. B. P. *Petromarula Cre-*  
*tica* J. B. ☉

*Rapuntium maximum coccineo spicato flo-*  
*re* Col. in hist. Mex. .f. *Flos Cardinalis*  
*Barberini. Trachelium Americanum flo-*  
*re rubro* Bapt. Ferr. ☉

*Rapuntium urens Soloniense violaceo flore.*  
☿ ☉ Rese d

*Reseda vulgaris* B. pin. Plinii neoterico-  
rum Belgis, *Eruca peregrina* vel *Canta-*  
*brica* Icon. Lob. ☿

*Reseda latifolia* flore flavo. ☿ ☿

*Reseda foliis Calcitrapæ* flore albo. ☿ ☿

*Resedæ affinis*, *Phyteuma* B. pin. *Phyteuma*  
*Monspeliensium* Icon. Lob. ☿

*Reseda alba minor* B. pin. *Sesamoides* par-  
vum *Salmanticum* Clus. ☉

*Rhamnus spinis oblongis* flore candicante B.  
pin. primus Clus.

*Rhamnus Salicis* folio angusto fructu flavesc-  
cente B. pin. *Germanicus* Matth. ed. B.

*Rhamnus* folio subrotundo fructu com-  
presso B. pin. *Paliurus* Dod.

*Rhamnus catharticus* B. pin. hist. Lugd. so-  
lutivus Dod.

*Rhamnus catharticus minor* B. pin. *Spina*  
*infectoria pumila* prima Clus.

*Rhaponticum* Prosp. Alp. de exot. folio  
*lapathi majoris* glabro B. pin. ☉

*Rhodia radix* Dod. Clus. ☉

*Rhus*



*Rhus folio ulmi* B. pin. *Rhus Obsciorum*  
& *Coriariorum* Clus. ☉

*Rhus Virginianum* B. pin. app. ☉

*Rhus myrtifolia* *Monspeliaca* B. pin. *myr-*  
*tifolia* *Monspeliensium* Ad. & Icon. Lob.  
☉

*Rhus myrtifolia* *Belgica* B. pin. *Chamae-*  
*agnus* Dod. ☉

*Ricinus* Dod. *vulgaris* B. pin. ♀

*Ricinus Americanus* *major* *semine nigro* B.  
pin. *Syriacus* Cam. descr. ♀

\* *Ricinus minimus* *Americanus minor* C.  
B. P. ♀

*Rosa rubra* B. pin. *provincialis* Dod. descr.  
☉

*Rosa rubra pallidior* B. pin. *Damascena*  
*rubra hist* Lugd. descr. ☉

*Rosa purpurea* B. pin. *pallida* Ad. Lob. ☉

*Rosa versicolor* B. pin. *prænestina* *versico-*  
*lor* Clus. descr. ☉

*Rosa maxima multiplex* B. pin. *centifolia*  
*Batavica* Clus. ☉

*Rosa alba vulgaris major* B. pin. *alba flore*  
*simplici hort.* Eyst. ☉

M

Rosa

- Rosa flore pleno albo hort. Eyst. ☉  
 Rosa moschata simplici flore B. pin. muscata  
 alba Tab. ☉  
 Rosa moscata flore pleno B. pin. muscata  
 alba multiplex Tab. ☉  
 Rosa spinis carens flore majore B. pin. sine  
 spinis Clus. ☉  
 Rosa sylvestris vulgaris flore odorato in-  
 carnato B. pin. sylvestris Dod. ☉  
 Rosa sylvestris flore pleno B. pin. sylvestris  
 odorata flore multiplici Icon. Lob. ☉  
 Rosa sylvestris foliis odoratis B. pin. Eglen-  
 teria hort. Eyst. ☉  
 Rosa odore Cinamomi flore pleno B. pin.  
 Cinamomea pleno flore Clus. ☉  
 Rosa lutea simplex B. pin. lutea hist. Lugd  
 ☉  
 Rosa lutea multiplex B. pin. lutea maxima  
 flore pleno hort. Eyst. ☉  
 Rosa punicea Cornuti descr. ☉  
 Rosa sylvestris pomifera minor B. pin. pin  
 pinellæ folio Ger. ☉  
 \* Rosa versicolor .f. Striata omnium mini  
 ma. ☉ ☉

Rosmarinus hortensis angustiore folio B  
 pin

pin Rosmarinum coronarium Dod. ☉  
 Rosmarinus hortensis folio aureo. ☿ ☉  
 \* Rosmarinum latifolium Park. ☉

Rubia tinctorum sativa B. pin. Rubia major  
 Clus. ☉

Rubia sylvestris hist. Lugd. sylvestris as-  
 pera, quæ sylvestris Dioscoridis B. pin. ☉

Rubia cynanchica B. pin. Gallium tetra-  
 phyllon montanum cruciatum Col. ☉

Rubia angustifolia spicata B. prodr. ♀

\* Rubia spicata Cretica Clus. ♀

Rubeola arvensis cœrulea repens B. prod. ♀

Rubeola repens lutea foliis spinosis B. pin.

Rubia minima Obs. & Icon. Lob. ♀

\* Rubeola maritima lutea. ☿ ☉

\* Rubeola minima alba. ☿ ♀

Rubus Dod. vulgaris .s. Rubus fructu ni-  
 gro B. pin. ☉

Rubus vulgaris spinis carens. ☿ ☉

Rubus repens fructu cælio B. pin. reptans  
 Ad. Lob. ☉

Rubus idæus spinosus B. pin. Rubus idæus  
 Dod. Idem fructu albo Clus. descr. ☉

Rubus idæus lævis B. pin. Rubus idæus Placæ Clus. ☉

Rubus odoratus Cornuti. ☉

Ruscus Matth. ed. B. Ruscum Dod. ☉

Ruta hortensis latifolia B. pin. graveolens hortensis Dod. ☉

Ruta sylvestris major B. pin. sylvestris graveolens Dod. ☉

Ruta sylvestris minor B. pin. montana legitima Clus. app. alt. Peganon Narbonensium .f. Rutula Ad. Lob. ☉

\* Ruta Syriaca Adv. Lob. Harmala Dod. ☿

Ruta muraria Dod. B. pin. ☉

---



## S.

**S**ABINA Dod. folio Tamarisci Dioscoridis  
B. pin. ☉

*Salix vulgaris alba arborescens* B. pin. alba  
perticalis vulgaris hist. Lugd.

\* *Salix latifolia inferne incana* J. B.

\* *Salix latifolia pumila folio rotundo* J. B.

\* *Salix angustifolia hirsuta alba* J. B.

\* *Salix angustifolia fol. crispis subtus al-*  
*bicantibus* J. B.

\* *Salix angustifolia Amygdalinis fol.* J. B.

\* *Salix angustifolia lutea rubrave* J. B.

\* *Salix angustifolia humilis repens.*

*Salvia major* Matth. ed. B. Dod. major, An  
sphacelus Theophrasti B. pin. Eadem fo-  
liis ex luteo variegatis, ex purpureo &  
albo variegatis. ☉

*Salvia minor aurita, & non aurita* B. pin.  
minor Dod. Eadem foliis ex albo vi-  
rescentibus. ☉

*Salvia Cretica non pomifera* Clus. ☉

\* *Salvia ferrata crispa* J.B. *latifolia ferrata*  
B. prodr. ☉

*Sambucus* Fuchf. fructu in umbella nigro B.  
pin. ☉

*Sambucus* fructu in umbella viridi B. pin.  
*Sambuci* altera species Dod. descr. ☉

*Sambucus racemosa rubra* B. pin. *montana*  
*racemosa* Ad. & Icon. Lob. ☉

*Sambucus folio laciniato* B. pin. *lacinioso*  
*folio* Dod. ☉

*Sambucus aquatica flore simplici* B. pin. *a-*  
*quatica* hist. Lugd. ☉

*Sambucus aquatica flore globoso pleno* B.  
pin. *rosea hort* Eyst. ☉

*Sambucus humilis*.l. *Ebulus* B pin. *Ebulus*  
Dod. ☉

*Sanicula* Dod. *officinarum* B. pin. ☉

*Sanicula Alpina lutea* B. pin. *Auricula urfi*  
Dod. *Eadem flore pallido & aureo.* ☉

*Sanicula Alpina purpurea* B. pin. *Auricula*  
*urfi flore purpureo* Icon. Lob. *Eadem*  
*flore atropurpureo, albo.* ☉

*Sanicula Alpina flore variegato* B pin. *Au-*  
*ricula urfi tertia* Clus. descr. ☉

\* *Sani.*

\* *Sanicula montana* flore calcari donato  
C. B. P. *pinguicula* Clus. hist.

*Sanicula Alpina* foliis *Borraginis* villosa B.  
pin. *Auricula urfi* Myconi hist. Lugd. ☉

*Sanicula montana* latifolia laciniata B. pin.  
*Cortusa* Matthioli hist. Lugd. ☉

*Sanicula montana* Americana .s. *Cortusa*  
*Americana stapelii* in Theoph. ☿ ☉

*Sanicula montana* rotundifolia major B.  
pin. *montana* secunda Clus. guttata Cam.  
☉

*Sanicula montana* crenata umbilico pallido.  
☿ ☉

*Sanicula montana* crenata umbilico rubro.  
*Sedum montanum* serratum guttato flore  
Park. ☉

*Saponaria* Dod. major lævis B. pin. ☉

*Saponaria* flore pleno Cornuti descr. ☉

*Saponaria* concava Anglica B. prodr. ☉

*Satureia* Dod. domestica hort. Eyst. hor-  
tensis .s. *Cunila sativa* Plinii B. pin. ♀

*Satureia montana* B. pin. *Thymbra* Dod.  
*perenni radice*. ☉

*Saxifraga rotundifolia alba* B. pin. alba  
*Chelidonides* Obs. & Icon. Lob. ☉

*Saxifraga aurea* Dod. *rotundifolia aurea* B.  
 pin. ☉

\* *Saxifraga aurea longifolia humilior.* ☿  
 ☉

*Scabiosa vulgaris major* Dod. *pratensis hirsuta* quæ officinarum B. pin. Eadem  
 flore albo. ☉

*Scabiosa montana calidarum regionum* Obs.  
 & Icon. Lob. *fruticans angustifolia alba*  
 B. pin. ☉

*Scabiosa prolifero flore* Clus. *prolifera* B.  
 prodr. *prolifera folio latiore ejusdem*  
 pin. ♀

*Scabiosa Alpina centauroïdes hort* Eyst.  
*Alpina foliis Centaurii majoris* B. pin. ☉

*Scabiosa latifolia rubra non laciniata* secunda  
 B. pin. *rubra Austriaca* Icon Lob.  
 ☉

*Scabiosa argentea angustifolia* B. prodr. ☉

*Scabiosa peregrina rubra capitulo oblongo*  
 B. pin. *Indica flore saturatè rubro hort.*  
 Eyst. Eadem quæ

*Scabiosa Indica flore dilutè rubro*  
 hort Eyst. ♀ Sca-



Scabiosa capitulo globoso major B. pin.  
minor .f. Columbaria Obs. & Icon. Lob.



Scabiosa capitulo globoso minor B. pin. an-  
gustifolia flore subcœruleo hort. Eyst.  
Eadem flore albo, & roseo. ⊙

Scabiosa stellata folio laciniato major B.  
pin. major Hispanica, .f. prima Clus. ♀

Scabiosa stellata folio non dissecto B. pin.  
arborea Prosp. Alp. de exot. ⊙

\* Scabiosa gramineis foliis glabris. ♂ ⊙

\* Scabiosa dissectis fol. flore amplo semine  
lanuginoso. ♂ ⊙

\* Scabiosa 2 Hispanica Clus. ♀

\* Scabiosa minima annua semine anguloso.  
♂ ♀

Scammonia Syriaca B. pin. Scammonium  
Dod. ⊙

Scammonia Monspeliaca foliis rotundiori-  
bus B. pin. Scammonium Monspeliense  
Ad. & Icon. Lob. ⊙

Scandix semine rostrato vulgaris B. pin.  
Scandix, Pecten Veneris Dod. ♀

Scilla

Scilla Dod. vulgaris radice rubra B. pin. ☉

Scolymus Theophrasti, Eryngium luteum  
Monspeliensium Obs. & Icon. Lob. Sco-  
lymus chrysanthemos B. pin. ☉

Scolymus chrysanthemos annuus. ☿ ♀

Scordium Dod. B. pin. ☉

Scordium alterum .s. salvia agrestis B. pin.  
Salvia sylvestris Bock. ☉

Scordium semine talari, flore cœruleo.  
Idem flore roseo. ☿ ☉

Scorpioïdes Bupleuri folio B. pin. repens  
Bupleuri folio Obs. & Icon. Lob. ♀

Scorpioïdes siliquâ crassâ Boëlii Ger. app.  
♀

Scorpioïdes siliquâ striatâ minus hirsutâ. ☿  
♀

Scorpioïdes Matthioli Dod. portulacæ fo-  
lio. B. pin. ♀

Scorzonera latifolia sinuata B. pin. major  
Hispanica prima Clus. ☉

Scorzonera foliis nervosis B. pin. Germa-  
nica angustifolia Tab. ☉

Scor-

Scorzonera pulverifera. ☿ ☉

Scorzonera latifolia humilis nervosa B. pin.  
humilis latifolia pannonica secunda Clus.

☉

Scorzonera angustifolia prima B. pin. hu-  
milis angustifolia pannonica tertia Clus.

☉

\* Scorzonera angustifolia subcœrulea C.  
B.P. angustifolia elatior pannonica quar-  
ta Clus. ☉

\* Scorzonera sem. lanuginoso nobis, Tra-  
gopogon hirsutum Apulum humile Col.

☉

Scrophularia Dod. nodosa foetida B. pin. ☉

Scrophularia aquatica major B. pin. Beto-  
nica aquatilis Dod. ☉

Scrophularia folio Urticæ B. pin. peregrina  
Cam. ♀

Scrophularia flore luteo B. pin. Lamium  
pannonicum secundum exoticum Clus. ♀

Scrophularia foliis & caule hirsutis. ☿ ☉

Scrophularia ruta canina dicta vulgaris B.  
pin. Ruta canina Clus. ☉

\* Scrophularia Sambuci fol. Park. ☉

\* Scutellaria

\* *Scutellaria Americana* Malvæ folio. ☞  
○

*Secale Fuchf. hybernum* vel majus B. pin.

*Securidaca lutea* major B. pin. vera Clus. ♀

*Securidaca dumetorum* major flore vario  
filiquis articulatis B. pin. *Hedysarum*  
*purpureum* Tab. ○

*Securidaca minor lutea* filiquis articulatis.  
☞ ♀

*Sedum majus arborescens* flosculis candidis  
B. pin. *Sempervivum* .s. *Sedum arbo-*  
*rescens majus* Dod. ○

*Sedum majus Fuchf. majus vulgare* B. pin.  
○

*Sedum minus teretifolium album* B. pin.  
*Sempervivum minus alterum* Dod. ○

\* *Sedum longifolium* Citrino flore. ☞ ○

\* *Sedum arvense* flore rubente B. prodr.  
♀

\* *Sedum teretifolium majus album.* ☞ ○

*Sedum minus teretifolium album alterum*  
*Sempervivum minus æstivum* Obs. & I-  
con. Lob. ♀

*Sedum*



*Sedum minus folio circinato* B. pin. *Aizoon*  
*dasyphyllum* Dal. hist. Lugd. ☉

*Sedum minus luteum folio acuto* B. pin.  
*Aizoon hæmatoïdes* Icon. Lob. Idem  
flore albo. ☉

*Sedum minus luteum ramulis reflexis* B. pin.  
*Aizoon scordioïdes* Icon. Lob. ☉

*Sedum minus causticum hort* Eyst. *Semper-*  
*vivum minus vermiculatum acre* B. pin.  
☉

*Sedum minus*, s. *Vermicularis insipida hort.*  
*Eyst. Sempervivum minus vermiculatum*  
*insipidum* B. pin. ☉

*Sedum minus fruticosum* B. pin. *minimum*  
*arborescens vermiculatum* Obs. & Icon.  
Lob. ☉

*Sedum Alpinum hirsutum luteum* B. pin.  
*Phyllum thelygonon* hist. Lugd. ☉

*Sedum Alpinum foliolis crenatis asperis* B.  
prodr. ☉

*Sedum Pyrenæum ferratum longifolium*.  
☉ ☉

*Sedum Pyrenæum ferratum flore albo pun-*  
*ctis purpureis consperso.* ☉ ☉

*Sedum montanum tomentosum* B. pin. *Sem-*  
*pervivum rubrum montanum* γυαπαλῶσις  
Col. ☉ *Sedum*

*Sedum tridactylites* Alpinum majus album  
B. pin. Saxifraga alba petræa Pon. descr.  
mont. Bald. ☉

*Sedum tridactylites* tectorum B. pin. Paro-  
nychia altera rutaceo folio Obs. & Icon.  
Lob. ♀

*Selinum* Sii foliis Ger. Park. ♀

*Senecio* minor vulgaris B. pin. *Erigerum*  
minus Dod. ♀

*Senecio* incanus pinguis B. pin. *Erigerum*  
majus Dod. ♀

\* *Senecio* Jacobææ fol. nobis, fortê folio  
non laciniato J. B. ♀

\* *Senecio* Canadensis acris alba. ☿ ♀

*Serpyllum* vulgare majus B. pin. album  
primum vel secundum Tab. ☉

*Serpyllum* foliis citri odore B. pin. citratum  
hort. Eyst. ☉

*Serpyllum* vulgare minus B. pin. vulgare  
Dod. Idem flore albo, quod

*Serpyllum* minus flore albo Tab. ☉

*Serpyllum* latifolium hirsutum B. prodr. ☉

*Serpyllum* angustifolium hirsutum B. pin.  
pannonicum tertium Clus. ☉ Ser-

Serratula Matth. ed. B. Dod. ☉

Serratula foliis non incis. Tinctoria prima Tab. ☉

Seseli montanum Cicutæ folio glabrum B. pin. primum montanum pannonicum Clus. ☉

Seseli Creticum Dod. Creticum minus B. pin. Vide tordylium. ♀

Seseli Æthiopicum frutex Dod. Æthiopicum Salicis folio B. pin. ☉

Seseli Massiliense fœniculi folio B. pin. Massiliense fœniculi folio crassiore Icon. Lob. ☉

Seseli foliis tenuioribus. Fœniculus tortuosus Dal. hist. Lugd. ☉

Seseli palustre lactescens B. prodr. & pin. ☉

Seseli pratense Lobelii hist. Lugd. pratense, Silaus forte Plinii B. pin. ☉

Sideritis foliis hirsutis profundè crenatis B. pin. Monspeliaca scordioides floribus luteis Ad. & Icon Lob. ☉

Sideritis vulgaris prima Clus. ☉

Sideritis Alpina hyssopifolia B. pin. montana Icon. Lob. ☉

Sideritis

Sideritis Alfinis trixaginis folio B. pin. & prodr. ☿

Sideritis arvensis latifolia glabra B. pin. Alyssum majus Tab. ☿

Sideritis arvensis angustifolia rubra B. pin. Ladanum segetum hist. Lugd. Eadem flore albo. ☿

Sideritis glutinosa odorata. ☿ ☉

\* Sideritis salviae folio nostras donato Park. ☉

\* Sideritis verticillis spinosis J. B. ☿

Siliqua edulis B. pin. Ceratonia Dod. Carobe vulgò.

Siliqua sylvestris rotundifolia B. pin. Arbor Judæ Dod.

Sinapi Rapi folio B. pin. fativum Erucæ aut Rapi folio Obs. & Icon. Lob. ☿

Sinapi Erucæ folio B. pin. sylvestre Dod. ☿

Sinapi siliquâ hirsutâ B. pin. fativum alterum Icon. Lob. app. ☿

\* Sinapi siliquâ hirsutâ, semine rubro. ☿ ☿

Sisarum Dod. Germanorum B. pin. ☉

Sison



Sison .f. Petroselinum Macedonicum Dodonæi hist. Lugd. Sison quod Amomum officinis nostris B. pin. ☿

Sium Dod. Sion .f. Apium palustre foliis oblongis B. pin. ☉

Sium alterum Olusatris facie Obs. & Icona Lob. Sium erucæ folio B. pin. ☉

Sium repens umbellis ad geniculos dispositis. ☿ ☉

\* Sium minimum ferulaceis foliis. ☿ ☉

Smilax aspera rutilo fructu Clus. aspera fructu rubente B. pin. ☉

Smilax aspera nigro fructu Clus. aspera minus spinosa fructu nigro B. pin. ☉

Smyrniū Fuchf. Hipposelinum Theophrasti, vel Smyrniū Dioscoridis B. pin. ☉

Smyrniū Creticum Matth. ed. B. Amanī montis Dod. peregrinum rotundo folio B. pin. ☿

Solanum officinarum B. pin. hortense Fuchf. Dod. Idem baecis nigris. ☿

Solanum vesicarium Dod. B. pin. Idem foliis variegatis. ☉

N

So-

Solanum vesicarium Indicum B. pin. halicacabum, five Solanum Indicum Cam. hort. Eyft. ☿

Solanum Virginianum vesicarium fructu luteo. Virginianum .f. halicacabum, .f. Alkekengi Virginenſe Park. ☿

Solanum lethale, Belladonna Cluſ. Solanum *μυλονοχικον* B. pin. ☉

Solanum somniferum Cluſ. somniferum verticillatum B. pin. ☉

Solanum fruticosum bacciferum B. pin. Amomum Plinii Obſ. Lob. ☉

Solanum quadrifolium bacciferum B. pin. Herba Paris Dod. ☉

Solanum scandens .f. Dulcamara B. pin. Dulcamara Dod. Idem flore albo quod Dulcis amara flore albo hort. Eyft. ☉

Solanum scandens foliis ex albo variegatis. ☿ ☉

\* Solanum Virginianum flore cœruleo. ☿ ☉

\* Solanum Virginianum flore albo. ☿ ☉

\* Solanum marinum humile flore cœruleo. ☿ ☉

\* Solanum marinum humile flore albo. ☿ ☉

Solanum

*Solanum tuberosum* esculentum Matth ed.

B. *Arachidna* Theophrasti forte, Pappas  
Perüarorum Clus. ☉

*Solanum racemosum* Indicum. Magnum  
*Virginianum rubrum* Park. ☉

*Solanum* foliis & caule spinosis, ☿ ☉

*Solanum pomiferum* fructu rotundo striato  
molli B. pin. Pomum amoris hist. Lugd.

☿

\* *Solanum Pomum amoris* fructu striato  
molli aureo. ☿ ☿

*Solanum pomiferum* fructu rotundo parvo  
molli. ☿ ☿

*Solanum pomiferum* fructu rotundo striato  
duro B. pin. Mala Æthiopica Dod. ☿

*Solanum pomiferum* fructu oblongo B. pin.  
Mala insana Dod. ☿

*Solanum pomo spinoso rotundo longo flore*  
B. pin. *Strammonia* Fuchf. Dod. ☿

*Solanum foetidum* pomo spinoso oblongo  
B. pin. *Datura Turcarum* hort. Eyst.

Idem flore violaceo. ☿

*Solanum foetidum* pomo grandibus aculeis  
donato. ☿ ☿

*Solanum foetidum* pomo spinoso rotundo  
semine pallido B. pin. *Datura Ægyptia*

Vell. Obs. in prosp. Alp. Idem triplici  
calice. ♀

Solanifolia Circæi dicta major B. pin. Cir-  
cæa lutetiana Obs. & Icon. Lob. ☉

Solanum Mexiocanum flore magno B. pin.  
Admirabilis Perūana rubro flore Clus.  
Idem flore luteo, luteo ex rubro mixto,  
albo rubris lineis distincto. ♀

Soldanella Dod. maritima minor B. pin. ☉

Soldanella Alpina minor Clus. Alpina ro-  
tundifolia B. pin. ☉

Sonchus asper non laciniatus B. pin. asperior  
Lobelii hist. Lugd. ♀

Sonchus asper laciniatus & non laciniatus B.  
pin. asper Dod. ♀

Sonchus lævis laciniatus latifolius B. pin. læ-  
vis Dod. ♀

Sonchus lævis laciniatus muralis parvis flo-  
ribus B. pin. alter folio, profundis laciniis  
sinuato hederaceo Obs. & Icon. Lob. ☉

Sonchus angustifolius maritimus B. prodr.  
♀

Sonchus lanatus Dal. hist. Lugd. villosus lu-  
teus major B. pin. ♀

\* Sonchus



\* *Sonchus Austriacus lævis* tertius cœruleo flore Clus. hist. ☉  
*Soncho affinis*, *Lampfana domestica* B. pin.  
*Lampfana* Dod. ♀

*Sorbus* Dod. *fativa* B. pin.  
*Sorbus sylvestris foliis domesticæ similis* B. pin.  
*Ornus* Dod.

\* *Sparganium ramosum*, & non ramosum  
 C. B. P. *platanaria* Dod. ☉

*Spartium arborescens* seminibus lenti similibus B. pin. *Genista Italica* Dod. ☉

\* *Spartum* 2 Clus. hist. *Spartum Monospermon Hispanicum* flore luteo Park. ☉

*Sphondilium* Dod. vulgare hirsutum B. pin.  
 ♀

\* *Sphondylium hirsutum* fol. angustioribus B. pin. ♀

\* *Spiræa Theophr.* fortê Clus. frutex spicatus foliis *Salignis ferratis* C. B. Pin.

*Stachys* Fuchf. Dod. major Germanica B. pin. ☉

*Stachys Cretica* B. pin. *Pseudostachys Cretica* ejusdem prodr. ☉

\* *Stachys Cretica angustifolia* nobis, *Pseudostachys* B. prodr.

\* *Stachys* fol. obscure virenti flore ferrugineo. ☿ ☉

*Stachys palustris foetida* B. pin. *Clymenum minus* Dal. hist. Lugd. ☉

*Staphisagria* Fuchs. Dod. ☿

*Stoebe major* folijs cichoraceis, mollibus lanuginosis B. pin. *Salmantica prima* Clus. Eadem flore albo. ☉

*Stoebe caliculis argenteis* B. pin. *Salmantica tertia* Clus. *argentea Salmantica minor* Obs. & Icon Lob. Eadem flore albo. ☉

*Stoebe incana* Cyano similis tenuifolia B. pin. *Austriaca humilis* Clus. descr. ☉

\* *Stoebe humilis* Clus. *incana tenuifolia cyano similis* C. B. P. ☉

*Stoechas Arabica* Cord. hist. brevioribus ligulis Clus. purpurea B. pin. ☉

\* *Stoechas folio serrato* Ger. Dod. folio crispo Clus. hist. ☉

*Styrax*

*Styrax* hist. Lugd. folio mali cotoneæ B.  
pin.

*Suber latifolium* perpetuo virens B. pin.  
*Phellos* .f. *suber* Dod.

*Succisa* Fuchf. glabra B. pin. Eadem flore  
albo, roseo. ☉

*Symphytum*, *Consolida* major B. pin. majus  
.f. *Consolida* major Matth. ed. B. Idem  
flore purpureo, pallido. ☉

*Symphytum tuberosum* majus Clusf. majus  
tuberosa radice B. pin. ☉

*Symphytum maculosum* .f. *Pulmonaria* la-  
tifolia B. pin. *Pulmonaria vulgaris* ma-  
culoso folio Clusf. Idem flore albo. ☉

*Symphytum* .f. *Pulmonaria angustifolia* ru-  
bente cœruleo flore B. pin. *Pulmonaria*  
foliis *Echii* Icon. Lob. ☉

*Syringa cœrulea* B. pin. flore cœruleo hort.  
Eyst. *Lillach* Dod. Eadem flore albo quæ  
*Syringa* flore lacteo hort. Eyst.

*Syringa Italica* flore simplici albo hort. Eyst.  
alba .f. *Philadelphus Athenæi* B. pin.

## T.

**T**AMARIX Narbonensis hist. Lugd. altera folio tenuiore .f. Gallica B. pin.

Tanacetum Dod. vulgare luteum B. pin. ☉

Tanacetum crispum Dod. foliis crispis B. pin. ☉

Tanacetum minus album odore Camphoræ B. pin. minus Dod. Achillea .f. millefolium nobile Tab. ☉

Tanacetum montanum purpureum. Vide Millefolium. ☉

Tanacetum montanum inodorum minore flore B. pin. inodorum Dod. ☉

Tanacetum inodorum flore majore B. pin. inodorum primum Clus. Vide bellis. ☉

Tanacetum .f. flos Africanus major flore pleno B. pin. Othonna major polyanthos Obs. & Icon. Lob. ♀

Tanacetum Africanum majus simplici flore B. pin. Flos Africanus major simplici flore luteo Icon. Lob. ♀

Tanacetum Africanum .f. flos Africanus minor



nor B. pin. Caryophyllus Indicus flore  
luteo rubescence simplici minor hort.  
Eyst. Idem flore pleno qui Caryophyllus  
Indicus plenus flore luteo rubescence  
minor hort. Eyst. ♀

Tanacetum .s. flos Mexicanus flore fistuloso  
simplici B. pin. Caryophyllus Mexicanus  
fistuloso flore, simplex Col. ♀

Tanacetum .s. flos Mexicanus flore fistuloso  
pleno B. pin. Caryophyllus Mexicanus  
alter polyanthos fistuloso flore Col. ♀

Taxus Dod.

Telephium vulgare B. pin. album Fuchf. ☉

Telephium purpureum majus B. pin. pur-  
purascens Fuchf. ☉

Telephium purpureum minus B. prodr. ☉

Telephium latifolium peregrinum B. pin.  
primum Hispanicum Clus. ☉

Telephium repens folio deciduo B. pin.  
Sextum, Cepæa Pancii Clus. ☉

\* Telephium Portulacæ folio. ☿ ☉

\* Telephium peregrinum rubens. ☿ ☉

Telephium repens folio non deciduo B.  
pin. legitimum Imperati septimum Clus.  
☉ Tere-

*Terebinthus* Dod. vulgaris B. pin.

*Teucrium* B. pin. vulgare fruticans .s. primum Clus. *Chamædrys assurgens* Dod.

⊙  
\* *Teucrium fruticans* flore purpureo. ⌘

⊙  
\* *Teucrium Bæticum fruticans* Clus. hist. *Bæticum* Ger. Tab. ⊙

*Thalictrum majus* siliquâ angulosâ, aut striatâ B. pin. *Ruta pratensis* herbariorum Obs. & Icon. Lob. ⊙

*Thalictrum pratense* maximum *Monspeliensium* asperioribus foliis. ⌘ ⊙

*Thalictrum majus* florum staminibus purpurascentibus B. pin. quartum Dod. descr. ⊙

*Thalictrum Canadense* Cornuti. ⊙

*Thalictrum minus* Dod. B. pin. *Hypecoum* hist. Lugd. ⊙

*Thalictrum minimum* foetidissimum B. prodr. ⊙

*Thapsia latifolia villosa* B. pin. prima Clus. ⊙

*Thapsia*

*Thapsia Carotæ folio* B. pin. vulgaris *Carotæ effigie* Obs. & Icon. Lob. ☉

*Thlaspi arvense siliquis latis* B. pin. latius Dod. ☿

*Thlaspi vulgatum serrato folio* Matth. ed. B. ☿

*Thlaspi arvense perfoliatum majus* B. pin. Oleraceum Tab. ☿

*Thlaspi umbellatum arvense Iberidis folio* B. pin. amarum Tab. ☿

\* *Thlaspi Iberidis folio tenuissimè diviso.* ☿

*Thlaspi umbellatum Creticum Iberidis folio* B. pin. *Candiæ umbellatum Iberidis folio* Obs. & Icon. Lob. ☿

Idem flore albo, quod *Cappadocicum* flore albo hort. Eyst. ☿

*Thlaspi Alpinum Bellidis coeruleæ folio* B. pin. montanum *Bursæ pastoris fructu* Col. ☉

*Thlaspi montanum sempervirens* B. pin. montanum candidum hist. Lugd. ☉

*Thlaspi parvum saxatile flore rubente* B. pin. *Lithothlaspi quartum carnosum rotundo folio* Col. ☉

*Thlaspi*

*Thlaspi montanum incanum luteum* B.  
prodr. *Supinum luteum* Icon. Lob. ☉

*Thlaspi*, *Alyssum dictum campestre minus*  
B. pin. *Alyssum minus* Dal. hist. Lugd. ☿

\* *Thlaspi Alyssum minimum*. ☿ ☿

*Thlaspi maritimum* Dal. hist. Lugd. *Thlaspi*  
*Alysson dictum maritimum* B. pin. ☿

*Thlaspi clypeatum* Clus. *biscutatum aspe-*  
*rum hieracifolium* & *majus* B. pin. ☉

*Thlaspi biscutatum annuum*. *Leucoium A-*  
*lyssoides umbellatum montanum* Col. ☿

*Thlaspi clypeatum Serpylli folio* B. pin.  
*Ionthlaspi minimum spicatum lunatum*  
Col. ☿

*Thlaspi fruticosum spinosum* B. pin. *fruti-*  
*cosum spinosum Narbonense* Obs. & I-  
con. Lob. ☉

*Thlaspi incanum Machliniense* Clus. *fruti-*  
*cosum incanum* B. pin. ☉

*Thuya Theophrasti* B. pin. *Arbor vitæ*  
Dod.

*Thymelæa* Dod. *foliis lini* B. pin. ☉

*Thymelæa foliis candicantibus serici instar*  
*mollibus* B. pin. *Tartonraire Gallopro-*  
*vinciæ*



vinciæ Massiliensium Ad. & Icon. Lob. ☉

Thymus Fuchs. vulgaris folio tenuiore B.  
pin. ☉

Thymus vulgaris latiore folio B. pin. Thymum durius Dod. ☉

Thymum cephaloton Dod. Thymus capitatus qui Dioscoridis B. pin. ☉

Thymum Creticum frutescens. Marum forte Matth. ed. B. hist. Lugd. ☉

Tilia Dod. fœmina folio majore B. pin.

Tithymalus characias amygdaloïdes Obs. & Icon. Lob. B. pin. ☉

Tithymalus characias rubens peregrinus B. pin. characias Monspeliensis Clusii & Matthioli Icon. Lob. ☉

Tithymalus characias folio lanuginoso B. pin. characias secundus Clus. descr. ☉

Tithymalus characias angustifolius B. pin. myrsinites tertius angustifolius Tab. ☉

Tithymalus characias radice repente. ☿  
☉

Tithymalus myrtifolius arboreus B. pin. arboreus Prosp. Alp. de exot. dendroïdes Matth. ed. B. ☉ Ti-

- Tithymalus myrsinites* Dod. *myrsinites latifolius* B. pin. ☉  
*Tithymalus myrsinites* fructu verrucæ simili B. pin. verrucosus Dalechampii hist. Lugd. ☉  
*Tithymalus maritimus* B. pin. paralius ex locis maritimis Dod. ☉  
*Tithymalus maritimus* .s. *Esula* rara Venerorum flore albo. ☉  
*Tithymalus latifolius* Hispanicus B. pin. *platyphyllos* Clus. ☉  
*Tithymalus helioscopius* Dod. B. pin. ♀  
*Tithymalus cyparissias* Fuchf. Dod. B. pin. Idem capitulo rubente. ☉  
*Tithymalus leptophyllos* Matth. ed. B. hist. Lugd. *Tithymalus* .s. *Esula* exigua B. pin. ♀  
*Tithymalus* foliis Pini forte *Dioscoridis Pityusa* B. pin. *Esula* minor Dod. ☉  
*Tithymalus palustris* fruticosus B. pin. *Esula* major Dod. ☉  
*Tithymalus montanus* non acris B. pin. *Esula* dulcis Tragi hist. Lugd. ☉  
*Tithymalus* foliis brevibus aculeatis B. pin. *Pityusa* Matth. ed. B. ♀  
*Tithymalus Epithymi* fructu Col. *Peplios* altera species B. pin. ☉ \*Ti-

\* *Tithymalus linariæ* fol. flore lunato Col.



\* *Tithymalus salicis* fol. ☿ ⊙

\* *Tithymalus caracias* pyriformi radice.



\* *Tithymalus Esula* exigua fol. obtusis B.  
in prodr. ♀

\* *Tordylion majus* vide *Caucalis major*  
Clus. ♀

\* *Tordylion minimum* *Apulum* Col. vide  
*Seseli Creticum minus*. ♀

\* *Tordylion Syriacum* sem. Granulato no-  
bis, *Gyngidium* I. Dod. *Gyngidium*  
*latifolium Syriacum* Park. *Caucalis Sy-*  
*riaca* cum maximo sem. J. B. ♀

*Tormentilla* Dod. *sylvestris* B. pin. ⊙

*Tormentilla Alpina* folio sericeo B. pin.  
*candida* Dal. hist. Lugd. *Heptaphyllon*  
Clus. ⊙

*Frachelium umbelliferum* *cœruleum* Pon.

*Cervicaria Valerianoïdes* *cœrulea* B.  
pin. ⊙

*Tragacantha*

Tragacantha Matth. ed. B. hist. Lugd. B.  
pin. ☉

Tragopogon pratense luteum majus B. pin.  
luteum Obs. & Icon. Lob. ☿

\* Tragopogon pratense minus Park, descr.  
☿

\* Tragopogon laciniatum luteum C. B. P.  
☿

\* Tragopogon Coronopi folio minus B.  
pin. ☿

Tragopogon Coronopi folio B. pin. ☿

Tragopogon gramineo folio radice villosa  
B. pin. Barbula hirci minor Tab. ☿

Tragopogon purpureocæruleum Porri folio  
B. pin. purpureum hort. Eyst. Idem flore  
dilutiore. ☿

Tragopogon gramineis foliis hirsutis B. pin.  
alter gramineo folio suaverubente flore  
Col. ☿

Tragoriganum Prosp. Alp. exot. ☉

Tribulus terrestris Dod. terrestris Ciceris  
folio fructu aculeato B. pin. ☿

Trichomanes



Trichomanes Fuchf. Dod. Trichomanes .s.  
polytrichum officinarum B. pin. ☉

\* Trichomanes ramosum C. B. P. ☉

Trichomanes minus & tenerius B. pin. mi-  
nor mas Tab. candidum Thal. ☉

Trifolium bituminosum Dod. bitumen re-  
dolens B. pin. ☉

Trifolium pratense purpureum B. pin. pra-  
tense Dod. ☉

Trifolium pratense album Fuchf. B. pin. ☉

Trifolium pratense luteum capitulo brevi-  
ore B. pin. pratense luteum Fuchf. ☉

Trifolium pratense luteum capitulo Lupuli  
vel agrarium B. pin. luteum minimum  
Penæ & Lobelii hist. Lugd. ☿

Trifolium pratense majus caule fistuloso  
foliis subtùs punctatim nigris. ☿ ☿

Trifolium montanum purpureum majus B.  
pin. majus secundum Clus. descr. ☉

Trifolium montanum purpureum folio a-  
cuto crenato B. prodr. ☿

Trifolium montanum album B. pin. majus  
primum Clus. ☉

Trifolium Alpinum flore magno radice sub-  
amarâ. Angustifolium Alpinum Pon.  
O descr.

deser. mont. Bald. ☉

Trifolium spicâ subrotundâ rubrâ B. pin.

Lagopus major folio Trifolii Dod. ♀

Trifolium spicâ oblongâ rubrâ B. pin. majus tertium Clus. ☉

Trifolium montanum spicâ longissimâ rubente B. pin. Lagopus altera folio pinato Obs. & Icon. Lob. ☉

Trifolium lagopoïdes flore pallidè luteo. ☿ ☉

Trifolium montanum angustissimum spicatum B. pin. Lagopus altera angustifolia Ad. & Icon. Lob. ♀

Trifolium arvense humile spicatum, .s. Lagopus B. pin. Lagopus .s. Pes leporis Matth. ed. B. Obs. & Icon Lob. ♀

Trifolium stellatum B. phytop. ♀

Trifolium Salmanticensi affine. ☿ ♀

Trifolium fragiferum Clus. cur. post. Idem flore albo. ☉

Trifolium album angustifolium floribus velut in capitulum congestis B. pin. Dorycnium Monspelienſium Icon. Lob. ☉

Trifolium nodiflorum. ☿ ♀

Trifolium cochleatum fructu latiore B. pin. cochleatum primum Dod. ♀

Trifolium

*Trifolium cochleatum turbinatum*, s. fructu compresso oblongo B. pin. *Medicæ species secunda* Ad. Lob. ☿

*Trifolium cochleatum* fructu globoso plano. ☿ ☿

\* *Trifolium cochleatum spinosum majus* spinis sursum, & deorsum tendentibus. ☿ ☿

\* *Trifolium cochleatum spinosum minus nigrum ciliare*. ☿ ☉

\* *Trifolium cochleatum spinosum minus, polycarpon minus hispidum*. ☿ ☿

\* *Trifolium cochleatum spinosum minus coronatum* Cherleri J. B. ☿

*Trifolium cochleatum maritimum tomentosum* B. pin. *Medica marina* Clus. ☉

*Trifolium cochleatum fructu nigro hispido* B. pin. *cochleatum alterum* Dod. ☿

*Trifolium cochleatum folio cordato maculato* B. pin. *Medica Arabica* Cam. ☿

*Trifolium cochleatum echinatum minus* B. prodr. ☿

*Trifolium cochleatum glomerulis* Personata Cherleri J. B. ☿

*Trifolium echinatum arvense* B. pin. *Tribulus terrestris minor repens* hist. Lugd.

☿

O 2

Tri-

Trifolium subterraneum Tricoccon. ♂ ♀  
 Trifolium filiquâ cornutâ .s. Medica B. pin.  
 Medica Dod. ☉

Trifolium sylvestre luteum filiquâ cornutâ,  
 vel Medica frutescens B. pin. Medica  
 flavo flore Clus. flore albo, cinereo, vio-  
 laceo nigricante, herbaceo, purpureo. ☉

\* Trifolium vesicarium rubello flore. ♂  
 ♀

\* Trifolium capitulo glomerato rigido J.  
 B. ♀

\* Trifolium corniculatum lusitanicum flo-  
 re rubro Park. in app. ad Theatr. ♀

Trifolium acetosum vulgare B. pin. aceto-  
 sum Dod. Idem flore purpurascens. ☉

Trifolium acetosum corniculatum B. pin.  
 Oxys flavo flore Clus. ♀

\* Trifolium acetosum corniculatum Indi-  
 cum erectum. ♂ ♀

Trifolium hepaticum flore simplici B. pin.  
 Hepatica trifolia cœruleo flore Clus. ru-  
 bro flore ejusdem flore albo hort. Eyft.  
 ☉

Trifolium hepaticum flore pleno B. pin.  
 Hepatica trifolia cœruleo pleno flore  
 Clus. ☉

Tripolium



*Tripolium* Dod. majus cœruleum B. pin. ☉

*Triticum* Hyberum aristis carens B. pin.

*Triticum* Dod. ☿

*Triticum* spicâ multiplici B. pin. Icon. Lob.

☿

*Triticum* aristis longioribus spicâ albâ B.  
pin. *Typhinum* quartum Tab. ☿

*Tulipa* Dod. *Tulipa* Turcarum Gesn. app.  
ad Cord. hist. ☉

*Tulipa* serotina πολυκλαδής major Clus. sero-  
tina ramosa major B. pin. ☉

*Tulipa* serotina flore pleno B. pin. ☉

*Tulipa* dubia pumilio Clus. pumilio latifo-  
lia rubra B. pin. ☉

*Tulipa* Apenninea Clus. minor lutea Italica  
B. pin. vulgò Bononiensis. ☉

*Tulipa* Persica hort. Eyst. variegata Persica  
B. pin. ☉

*Tussilago* Fuchs. vulgaris B. pin. ☉

## V.

**V**ALERIANA hortensis Dod. hortensis,  
Phu folio Olusatri Dioscoridis B. pin.



Valeriana foliis calcitrapæ B. pin. annua .s.  
æstiva Clus. ♀

Valeriana sylvestris major B. pin. sylvestris  
Dod. ⊙

Valeriana Græca Dod, cœrulea B. pin. E-  
adem flore albo quæ

Valeriana Græca flore albo hort. Eyst.



Valeriana palustris minor B. pin. Phu mini-  
mum Matth. ed. B. ⊙

\* Valeriana Urticæ folia flore albo Corn.

\* Valeriana Alpina sylvestris prima lati-  
folia Clus. ⊙

Valeriana rubra Dod. B. pin. Eadem flore  
albo. ⊙

Valeriana rubra angustifolia B. prodr. ⊙

Valeriana campestris inodora major B. pin.  
album olus Dod. ♀

Valerianella

Valerianella altera nudo umbilicato, & bre-  
vi semine Col. ♀

Valerianella cornucopioïdes echinata Col.  
echinata B. pin. ♀

Valerianella altera tenuifolia semine scabi-  
osæ stellato Col. semine stellato B. pin. ♀

\* Valerianella nostras major scabiosæ se-  
mine. ♂ ♀

\* Valerianella semine hirsuto minore ro-  
tundo. ♂ ♀

\* Valerianella Indica Clus ♀

\* Valerianella vulgaris major serotina. ♂  
♀

\* Valerianella umbilicato nudo semine  
oblongo. ♂ ♀

Valerianella semine, acinis uvarum simili .s.  
hirsuto, extremo umbilicato. ♂ ♀

Verbascum mas latifolium luteum B. pin.  
mas & candela regia Obs. Lob. ♀


Verbascum foemina flore luteo magno B.  
pin. album foemina luteo flore Dod. Gall.  
ed. ♀

Verbascum ramosum floribus luteis parvis.  
Candidum foemina Fuchs. ♀

Verbascum ramosum floribus parvis albis.  
♂ ♀ O 4 Ver-

Verbascum nigrum Dod. nigrum flore ex  
luteo purpurascens B. pin. ☿

Verbascum perenne nigrum floribus albis.



\* Verbascum nigrum Papaveris cornicu-  
lati folio C. B. P. laciniatum Lugd. ☿

Verbascum salvifolium fruticosum luteo  
flore Ad. & Obs. Lob. latis Salviæ foliis  
B. pin. ☉

Verbascum salvifolium fruticosum flore  
purpureo. ☿ ☉

Verbascum angustis Salviæ foliis B. pin.  
Phlomis Lychnitis Clus. ☉

Verbasculum pratense odoratum B. pin.

Primula veris flavo flore elatior Clus. ☉

Verbasculum pratense, vel sylvaticum ino-  
dorum B. pin. Primula veris pratensis ino-  
dora luteo-pallida Obs. & Icon. Lob. ☉

Verbasculum sylvarum majus singulari flore  
B. pin. Primula veris pallido flore hu-  
milis Clus. ☉

Verbasculum Constantinopolitanum. Car-  
chicheæ Turcæarum Cornuti. Idem flore  
albo, sulphureo, dilutè violaceo ☉

Verbasculum sylvestre magno, plenoque  
flore



flore B. pin. *Primula veris* flore pleno  
hort. Eyst. ☉

*Verbasculum proliferum* B. pin. *Primula*  
*veris gemino* flore hort. Eyst. ☉

\* *Verbasculum majus umbellatum* purpu-  
reum. ☉

\* *Verbasculum majus umbellatum* album.  
☉

\* *Verbasculum proliferum* C. P. B. flore  
alteri, altero innato purpureo. ☉

\* *Verbasculum proliferum* C. P. B. flore  
alteri, altero innato luteo. ☉

\* *Verbasculum minus Alpinum umbella-*  
*tum purpureum.* ☉

\* *Verbasculum minus Alpinum umbella-*  
*tum album.* ☉

*Verbena communis* flore cœruleo B. pin.  
*Verbenaca recta* Dod. ☉

*Verbena Urticæ folio* ☉

\* *Verbena nodiflora* Matth. ed. B. *repens*  
*nodiflora* Park. ☉

*Veronica mas supina* & *vulgatissima* B. pin.  
*mas serpens* Dod. ☉

\* *Veronica spicata angustifolia* flore car-  
neo. ☉ Vero-

Veronica spicata minor B. pin. recta minima Clus. Eadem spicâ roseâ. ☉

Veronica pratensis serpyllifolia B. pin. minor serpyllifolia Obs. & Icon. Lob. ☉

Viburnum Matth. ed. B. Lantana Dod. ☉

Vicia Dod. sativa vulgaris semine nigra B. pin. ♀

Vicia maxima dumetorum B. pin. Cracca major Tab. Eadem flore albo. ☉

Vicia Sepium folio rotundiorē acuto B. pin. Aphace Fuchf. ♀

Vicia multiflora B. pin. Aracus Tab. ☉

Vicia sylvestris lutea filiquâ hirsutâ B. pin. ♀

Vicia lutea foliis Convolvuli minoris B. pin. Orobanche legumen hist. Lugd. ♀

Vicia semine rotundo nigro B. pin. Craccæ primum genus Dod. ♀

Vicia segetum cum filiquis plurimis hirsutis B. pin. Aracus .f. Cracca minima Obs. & Icon. Lob. ♀

Vicia filiquis glabris flore violaceo. Minima cum filiquis Glab. J. B. ♀

Vicia minima præcox Soloniensis. ☿ ♀  
Vicia

*Vicia* Sesamacea Apula Col. ♀

\* *Vicia* maxima annua foliis serratis perperam authoribus, faba Græcorum. ♀

*Viola* martia purpurea flore simplici odoro

B. pin. nigra .f. purpurea Dod. ☉

*Viola* martia alba B. pin. candida Dod.

descr. martia flore albo hort. Eyst. ☉

*Viola* martia inodora sylvestris B. pin. syl-

vestris inodora Dod. ☉

*Viola* martia multiplici flore B. pin. *Viola*

flore multiplici Dod. Eadem flore pleno cinereo. ☉

*Viola* Alpina rotundifolia lutea B. pin.

montana prima Clus. ☉

\* *Viola* Granadilla folio. ☼ ☉

\* *Viola* longifolia montana lutea grandi-

flora Cam. C. P. B. *Violæ* montanæ 3.

alterum Genus Clus. hist. ☉

*Viola* tricolor erecta B. pin. assurgens tri-

color Dod. ☉

*Viola* tricolor Dod. tricolor hortensis re-

pens B. pin. ♀

*Viola* bicolor arvensis B. pin. Sylvestris I-

con Lob. ♀

*Viola*

Viola lunaria major filiquâ rotundâ B. pin.

Lunaria Græca annua hort. Eyst. ♀

Viola lunaria major filiquâ oblongâ B. pin.

Lunaria Græca perennis hort. Eyst. ☉

Virga aurea major vel Doria B. pin. Herba  
Doria Dod. ☉

Virga aurea latifolia serrata B. pin. aurea  
margine crenato Dod. ☉

Virga aurea foliis lævibus non serratis. ☿  
☉

Virga aurea angustifolia serrata B. pin. So-  
lidago Sarracenica Dod. ☉

Virga aurea Americana foliis serratis subtus  
nervosis. ☿ ☉

Virga aurea Americana hirsuta. ☿ ☉

Virga aurea Limonii folio paniculâ uno  
versu dispositâ. Mexicana B. pin. app.  
☉

Virgo aurea humilis. ☿ ☉

\* Virga aurea longis glabris foliis nervosis.  
☿ ☉

\* Virga aurea serratis foliis hirsutis. ☿  
☉

\* Virga aurea Solidago aurea foliis minùs  
spissis. ☿ ☉

Vitex

Vita  
mod  
bo.

Vitis v  
Vitis C  
Vitis la  
Vitis fr  
Tra

Vitis  
nig  
Vitis r  
bacc  
☉

Ulmus  
pin.  
Ulmus  
latif

Urtica  
perio  
Urtica  
Obs.  
Urtica  
Fuch



*Vitex* Dod. foliis angustioribus *Cannabis*  
modo dispositis B. pin. Eadem flore al-  
bo, ☉

*Vitis* vinifera Fuchf.

*Vitis* Corinthiaca.

*Vitis* laciniatis foliis Cornuti.

*Vitis* sylvestris, *Labrusca* B. pin. *Labrusca*  
Tragi hist. Lugd.

*Vitis* idæa foliis oblongis crenatis fructu  
nigricante B. pin. *Vaccinia* nigra Dod. ☉

*Vitis* idæa foliis subrotundis non crenatis  
baccis rubris B. pin. *Vaccinia* rubra Dod.  
☉

*Ulmus* Dod. campestris & Theophrasti B.  
pin.

*Ulmus* montana B. pin. secunda Dod. deser.  
latifolia,

*Urtica* urens maxima B. pin. sylvestris as-  
perior Obs. Lob. ☉

*Urtica* urens minor B. pin. minor acrior  
Obs. & Icon. Lob. ☿

*Urtica* urens pillulas ferens B. pin. Romana  
Fuchf. ☿ Ur-

(222)

*Urtica racemosa* Canadensis. ☼ ☉

*Urtica aculeata* foliis ferratis B. pin. Can-  
nabis sylvestris hist. Lugd. ♀

*Urtica aculeata* foliis ferratis altera B. pin.  
sylvestris spuria tertia Icon. Lob. ♀

---

X.

**X**YRIS Matth. ed. B. *Spatula foetida*  
Fuchf. ☉

---

Y.

**Y**Uca foliis Aloës B. pin. Yuca Ad.  
Lob. part. alt. ☉

---

Z.

Z.

**Z**E A, Brisa dicta vel monococcus Germanica B. pin. Monococcon Dod.  
♀

\*Zea Amylea, vel Zeopyrum Amyleum C.  
B. P. Triticum trimestre Cordi. ♀

Zeopyron Dod. Zeopyrum .s. Triticospeltum B. pin. ♀

---

PLAN-

*[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side]*

—

MA 11

P  
H  
B  
Ne  
Brec  
A  
210





PLANTARUM  
IN  
HORTO REGIO  
B L E S E N S I

*Aucto, Contentarum:*

Nemini hucusque Scriptarum:

*Brevis & succincta Delineatio.*

---

A.

Ⓔ **A** CANTHIUM lusitanicum :  
Vulgari Acanthio simile, nisi  
quod folia habeat, magis incana,  
albidiora, densioreque lanugine obdu-  
cta;  
P

ſta; caules emittit altiores, aliquandò quinos, ſenſve pedes altos. Capita habet minora, cœterâ vulgari ſimile.

☞ Acanthium Illyrico accedens capitibus minoribus, flexuoſis: Illyrico adeo accedit, ut niſi propiùs intuenti, non animadvertitur differentia, caules emittit, non, tam ſpinis armatos: Capita habet minora, quaſque, cernua & flexuoſa.

☞ Aconitum, ſpica florum Pyramidali: Quoad folia & radices; aliorum Aconitorum more, provenit. Solummodò ſpicam fert, florum cœruleorum cucullatorum, ad baſin latioreſ; quæ tandem, in Mucronem deſinit Pyramidalem; atque hac notâ quam facillime à cœteris ſuæ ſortis diſtinguitur.

☞ Ageratum purpureum villoſum: Ab Agerato purpureo Dalechampii hiſt. Lugd. neutiquam diſcrepat, niſi quod folia & caules ejus, villis obducuntur; vulgaris autem purpurei Dalechampii, folia ſunt viridia glabra.

☞ Alaternus, foliis ex albo variegatis: Folia habet partim alba partim viridia.

☞ Alaternus, foliis ex luteo variegatis : Hujus folia, partim sunt lutea, partim viridia. Utriusque folia sic sunt variegata, ex calce radici supposita, aut pari mixtura calcis cum terra ruderosa, ita plurimæ aliæ plantæ, ex hac, aut simili mixtura, variegantur in foliis ; ut solanum lignosum seu dulcamara, clematis daphnoïdes, Ilex baccifera, ligustrum, Hyssopus, Rosmarinum, pilosella & cœteræ ludente sic natura : insuper nota ex seminibus prædictarum, satis ; provenire plantas, quæ pristinum recuperant statum, viridémque induunt colorem ; éstque quasi morbus superveniens foliis, à succo, radicibus attracto ; qui pangendo, in perennibus durat ; satione evanescit.

☞ Alcea vesicaria capitis bonæ spei : A vulgari Alcea venetorum, in paucis differt, nisi quod caulem producat rectum, firmum, pedalem aut sesquipedalem ; folia habet firmiora rotundiora & Glabriora florémque majorem, elegantiorisque coloris, cœterâ ei par.

☞ Alchimilla minor : Vulgari Clus. in omnibus accedit, nisi partium parvitate. Est enim triplo vulgari, in omnibus minor, ejusque folia dilutius virent.

☞ Alline inaperto flore .s. unicaulis noctiflora : Caules producit triunciales, quorum nodis apponuntur bina foliola, è regione disposita, mucronata, linguæ passerinæ similia, in caulium summis nascuntur flores, singuli, quinque petalis albis, ad medium bifidis ( aliarum Lychnidum & alfinarum more ) constantes. Qui vix interdiu, lucente sole conspiciuntur : propter tenuitatem partium : hoc valde familiare est, pluribus Lychnidum. Crescit in arvis, sylvosis humidis & udis.

☞ Alline spergula, semine foliaceo nigro; circulo membranaceo albo, cincto : Vulgari spergulæ, quoad reliquas omnes partes, adeò est similis, ut passim in agris arenosis conspiciere licet, nec distingui à vulgari poterit nisi semine, quod est compressum foliaceum seu membranaceum, album exterius, circularitèr cingens in medio, semen nigrum.



nigrum. Reperitur & alia, prope rupellam: cujus semen in medio est compressum fuscum, circulo paritè foliaceo albo cinctum; vulgaris autem spargulæ semen est rotundum, Alfines vulgaris modo.

⌘ Althæa peregrina, semine rostrato, flore luteo minimo: Hujus folia sunt quasi carpini foliorum æmula, bina è regione, caulem ambientia, rotundum, sesquipedalem, in cujus summis fastigiis, innascuntur flosculi lutei, minores, quibus deciduis succedunt, arctè in circumlo disposita, semina, aculeis pungentia; Unde rostrati ei nomen imposuimus.

⌘ Amaranthus spica erecta: Est flore obsoletè rubro, viridique, cujus utriusque semen est nigrum; vel spica est erecta, cujus semen est album.

⌘ Amaranthus auriculatus: Species est Amaranthi; quinquagesimo septimo anno, supra millesimum, sexcentesium, detecta; & ex Americæ insulis adjacentibus, in Angliam delata. Cujus singula folia, ad appositionem, bina habent foliola Lobata .s. auriculata, qua nota, ab

omnibus aliis (multos ante annos) dete-  
ctis, differt estque à flore .s. spica florum,  
aut luteus, aut stramineus, ruber aut  
phoeniceus, spicatus vel cristatus.

☞ *Amygdalus pumila*: Bipedalem ha-  
bet altitudinem, vix pollicarem crassi-  
tatem, obtinent ejus caudices, in quorum  
summis alis, sub exitum hyemis prove-  
niunt flosculi Colossini coloris, minores;  
*Amygdali* majoris more; quibus succe-  
dunt pariter fructus parvi triplo mino-  
res, *Amygdali* vulgaris fructu.

☞ *Anagallis* omnium minima: Planta  
est in humidis proveniens, vix biuncia-  
lis, flosculos gerit cœruleos, vulgaris  
*Anagallidis* triplo minores; capsulas se-  
minales pariter minores.

☞ *Anonis* purpurea non spinosa: A  
vulgari nulla nota differt nisi quod spi-  
nis Careat.

☞ *Anonis montana* præcox, purpurea  
frutescens: Suffrutex hic, est Bipedalis,  
Trifolii species, perpetua fronde virens,  
flores fert pendentes leguminosos .s. Pa-  
pileaceos, elegantèr purpureos: exe-  
unte hyeme floret; quorum singulis suc-  
cedunt

cedunt singulæ filiquæ, hirsutæ biunciales, natricis Plinii filiquis, multò crassiores, semina in se continentes majora; deliquia (cœterarum Anonidum, seminum more) patientia, qua nota specifica, indigitantur Anonides, à cœteris, trifoliorum classibus. Perperàm ergò Parisiensibus Botannicis, cicer perenne (me discipulo sub Vespasiano Robino) dicebatur.

⚔ Anonis purpurea, erecta annua mitis: Hujus caules sunt Bipedales nonnunquam Tripedales erecti, in quorum summis fastigiis spicatim, proveniunt flosculi. Dilutè purpurei, quibus fatiscen-  
tibus succedunt, Siliculæ lentiformes, erectæ, vulgaris Anonidis ritu, semina in se continentes, deliquium patientia, quæ est nota essentialis, & Generica, Anonidum omnium. Et præcipuè, hac nota ab omnibus aliis trifoliis distinguitur: ut clarius docebimus, in universali nostra Historia Plantarum, per Tabulas cognationis dispositarum.

⚔ Apocynum Canadense foliis Androsæmi: Planta est radice longè latèque

per terram subtûs repente, prædita; caules suggerente Bipedales, quibus binatim, adhærent folia Androsæmi foliorum adinstar: in caulium summis enascuntur flores obsoletè rubri. Quoad formam; aliorum Apocynorum floribus accedentes. Quibus euanidis succedunt, siliquæ oblongæ, in medio crassæ, membranaceæ, Asclepiadis aut Apocyni vulgaris, ritu, semina continentes compressa, subrufa, intermixta, materiæ cuidam papposæ succum lacteum Apocynorum more, quælibet pars rupta fundit.

☞ Apocynum Canadense, angustifolium flore aurantio: Hæc Apocyni species vix Bipedalem, excedit altitudinem, folia gerit, angusta longiora multò Apocyno surrecto umbellifero Cornuti; in caulium summis fastigiis, flores aureos aut aurantii coloris gerit. Quibus singulatim, succedunt siliquæ membranaceæ, papposæ materiæ, intermixta semina compressa rufa (cæterorum ritu) gerentes.

☞ Apocynum Virginianum, flore herbaceo siliqua longissima: Hujus folia sunt



sunt lata glabra Bedelzar Arabum foliis, magnitudine accedentia. Caules habet ternos quaternos, pedes altos: subrubros, in summis alis caulium proveniunt flosculi herbacei, ejusdem cum cœteris suæ fortis, formæ; sed multò minores, quibus flaccidis succedunt siliquæ, Dodranta-les tenuissimæ, papposam materiam, & semina compressa, aliorum more continentes. Lactescit etiam aliorum Apocynorum & Asclepiadum modo.

⚔ Argemone capitulo longiori, glabro: Folia habet magis dissecta, quam sunt papaveris Rhæadis folia, minùs autem, quam sunt Argemones, capitulo hirsuto. Florem fert Phœniceum, cui succedit capitulum biunciale, glabrum, per loculamenta triangularia, continens minuta semina, aspera, aliorum papaverum tum Argemonarum modo.

⚔ Artemisia foliis variegatis: Sola variegatione foliorum, à vulgari Artemisia differt.

⚔ Arum Indicum bicubitale, amplo flore: Folia habet ampla, cannacori æmula, è quorum gremio, surgit caulis bicubitalis, in

in summo gerens florem amplum, album  
Lilii candidi flore multò majorem, uni-  
folium cui deciduo, succedunt, race-  
matim, in spica, grana plurima rubra,  
spicatum seinvicem contingentia, vul-  
garis (ut paucis dicam) ritu, disposita.

☞ Aster serotinus, angustifolius, Cana-  
densis flore cœruleo : Planta est longè  
latèque serpens, caules emittit tripeda-  
les, foliis angustis glabris, saturè viren-  
tibus, è regione dispositis onustos. E  
summis caulium exeunt flosculi, cœrulei;  
sub exitum æstatis, aut ineunte hyeme,  
aliquando tardiùs : cœterorum more, in  
pappum abeuntes.

☞ Aster præcox, flore cœruleo majore :  
Hæc, Canadensis seu exotici asteris, est  
species, caulis humilior flos major (si  
comparetur cum sequenti congeneri)  
media æstate floret cœrulei coloris est.

☞ Aster elatior flore cœruleo minore,  
Bellidis minoris : Hic longe sub terram  
hac, Illac, repit serpitive ; caules emittit  
tripedales, foliis angustis glabris, saturè  
virentibus, è regione dispositis, onustos.  
Flores sustinentes, (quoad magnitudi-  
nem)

nem) Bellidis minoris, sed cœrulei coloris, versus hyemis initium (cœterorum more) in pappos abeunt.

☞ Aster Tripolii flore latifolius. Hic omninò accedit minori, Narbonensium. Si non quod folia producat glabriora & latiora, floresque paulò majores, deniq; tota Plantæ est major, quoad omnes ipsius partes.

☞ Aster Conyzoides Monspeliensium : Est planta Bipedalis, cujus folia sunt villosa .s. lanuginosa, Conyzæ in modum, quin & contrectata ejus folia, Conyzæ odorem spirant. In summis, caulium fastigiis, flores fert luteos, multos, imo ad alas foliorum, quibus deciduis, succedunt semina solida Angulosa, quæ nota debet jure merito appellari, Chrysanthemum Conyzoides Monspeliensium. Conyzoides apte dicitur, quia Conyzæ habet odorem. Monspeliensis dicitur quia frequentèr circa oppidum illud reperitur. Omnis asteris flos, abit in pappos, qua sola nota essentiali & generica, differt aster, à Corymbosis seu Corymbiferis, quippe producentibus, flores

flores etiam stellatos, quemadmodum aster, sed semina solida, ergò potiore jure Chrysanthemum Conyzoides Montpellierensium denominabitur, ut clariùs demonstrabimus in tabulis nostris cognitionis. Conyza fundit odorem, sed nec odor nec sapor, nec color indignant plantas, per se, sed per accidens tantùm: ad designandas species, subalternas inserviunt. Idem dicendum de astere luteo, foliolis ad florem rigidis, itèm de astere cernuo col. seu foliis circa florem mollibus; paritèr de astere Attico supino Dod. & multis aliis hujus Farinæ, ab Authoribus, asterum classì assignatis, ut prolixius in Tabulis affinitatis seu cognitionis, clare demonstrabimus.

☞ Aster ramosus annuus Canadensis: Hac planta folia producit oblonga, in margine sinuata, supernè hirta, caules edit Bipedales ramosos, flores albos, Bellidis instar. Qui abeunt in pappos: ergò aptiùs retulimus, ad suæ classis consortes. Nempe pappescentes, vide Bellis ramosa umbellifera Cornuti in horto Regio Blesensi.

Atriplex



⌘ Atriplex folio hastato seu Deltoïde :  
 Hæc atriplicis species passim in fossis,  
 Suburbanis provenit, folio est Trian-  
 gulari acuto, mucronato, hastæ cuspidi  
 simili : caulibus procumbentibus, pe-  
 dalibus & sesquipedalibus ; pediculis  
 longis innixo. In quorum summis alis,  
 semina multa proveniunt : singula binis  
 foliolis (ut in Atriplice sativo, Polygani  
 folio, marino, aliisque) inclusa.

⌘ Atriplex procumbens folio sinuato  
 crasso : Planta pedalis, procumbens,  
 folia habet sinuata in margine, ut plu-  
 rimùm & caules & folia sunt rubra ; se-  
 mine onerantur summi caules, racemoso,  
 cœterarum sylvestrium more.

---

## B.

⌘ **B**ELLIS pratensis duplici petalorum serie: Non alià ratione differt à Bellide pratensi vulgari, nisi quod natura luxuriante, duplicem petalorum latorum, umbonem luteum cingentium, seriem profert.

⌘ Bellis hortensis flore Herbaceo: Hortensi in omnibus convenit, nisi quod florum petala, in folia herbacea degenerent.

⌘ Bellis hortensis flore prolifero: Hæc notu facilima, ex primo intuitu, quia plures flores exeuntes, ex uno, (Calendulæ proliferæ more) producit.

⌘ Bellis ramosa umbellifera Cornuti: Cum ejus flos abit in pappos, ad Asteris classem retulimus vide suprâ, Aster ramosus annuus Canadensis.

⌘ Bellis Virginiana densiori folio: Folia habet latiora, serrata, densiora, quam ulla, Bellidum sylvestrium majorum: majorésque fert flores. Forte Bellis alpina Cas. Banh, in prodr. ⌘

⚔ Bellis radice repente, foliis latioribus  
ferratis: Hæc omnium Bellidum majo-  
rum, folia habet latiora magisque ferra-  
ta, flores itidem maximos, radices longe  
latéque subter terram, repentes.

⚔ Bellis montana minor & major Tana-  
ceti folio: Vide Tanacetum montanum  
inodorum flore majore & minore in  
horto Regio Blæsenfi aucto. An non po-  
tiore jure Bellis Tanaceti folio, desig-  
natur. Examinent quicunque voluerint.

⚔ Beta radice vulgaris, costa ampla au-  
rea: Hujus folia sunt Platyneura, ali-  
quando aurea, aliquandò rubra, non-  
nunquam alba.

⚔ Blattaria folio verbasci, flore luteo  
amplo: Hæc folia habet verbasci, In-  
cana mollia, mucronata, è quorum gre-  
mio exit caulis, Bipedalis aut Tripedalis,  
in fastigio, gerens flores luteos, amplos  
verbasci instar. Quibus tamen deciduis  
succedunt, capsulæ bivalves, seu binis  
loculamentis, distinctæ. Non in Pyra-  
midem verbasci capsularum more, sed  
sunt crassæ, rotundæ; qua nota sola à  
verbasco distinguitur Blattaria.

☞ *Blattaria purpurea* radice perenni: Folia edit incanè viridia, sinuata, flosculos cœruleos, quatuor petalis conflatos, quibus deciduis succedunt capsulæ, prioris capsularum æmulæ, similiaque in se, continentes semina. Datur & hujus species foliis majoribus, *Symphyti* foliis, quam proxime accedens, quæ flores edit elegantèr carneos vel gilvos. Capsulasque edit minores; natura est adedò intenta productioni, hujus: longè latèque rependo ut vix in Gallia, multò minùs in Anglia, semen suum perficeat.

☞ *Blitum Polyspermon*, folio elatines subrotundo: Hæc *Bliti* species folia habet, hirta, seu villosa, subrotunda, quemadmodùm elatine folio subrotundo; binatim è regione, cingunt, caules pedales & sesquipedales; ad alas, enascuntur racematim semina multa subnigra aut fusca, lata tumidiuscula: viridibus capsulis minimis (*Atriplicis* aut *Bliti* modo) contenta.

☞ *Brunella Alpina*, glabro folio, angustio, integro: Folia edit mucronata, glabra, angusta rigida, caulibus semipedalibus



pedalibus è regione adnascencia : quorum summis apicibus verticillatim, dense dispositi, innascuntur flores, galeati cœrulei, nonnunquam purpurei, qui decidui, capsulas verticillatas, in spicam degenerentes, relinquunt : aliarum prunellarum more.

⚥ Brunella Bætica annua foliis lacinia-  
tis : Folia inferiora profert sinuata, per  
terram strata, caulescente planta : folia  
edit laciniata, è regione disposita. Sum-  
mis caulibus innascuntur, verticillatim  
ampli flores cœrulei, qui exsiccati, re-  
linquunt spicatim, seu densissimè dispo-  
sitas capsulas verticillatas quinquafari-  
am in margine partitas; vide Melissa Bæ-  
tica in horto Regio Blesensi aucto, cum  
qua nullam habet affinitatem sed omni-  
nò Brunellæ accedit. Ut clariùs postea  
docebitur.

⚥ Buglossum lusitanicum bullatis foliis :  
Hæc Buglossi species, folia ( si seratur  
autumno) exeunte hyeme profert viri-  
dia, bullis albis elegantè conspersa :  
è quorum medio, exit caulis, dodran-  
talis, aliquando pedalis, per terram stra-  
tus,

tus, in summitate, sustinens flores elegantè cœruleos, parvos quadripartitos, quibus deciduis, succedunt semina, viperini capitis æmula, aliorum Buglossorum more. Hujus est, & alia varietas, priori in omnibus similis, nisi, quod flores edit rubros striis albis, elegantè pictos.

☞ Buglossum procumbens annuum, pullo minimo flore: Hujus cauliculi bipedales per terram strati sunt, folia gerunt villosa, floresque minimos; pulli seu obscurè ferruginei coloris; Buglossi in modum, undè aptius Buglossum minimum procumbens, pullo flore, dicitur. Quam Echium; quia Echium, seu Lycopsis, flore donatur corniculato integro: qua nota, ab invicem distinguuntur, Buglossum: Echium seu Lycopsis, ut in Tabulis nostris cognationis, clarius patebit. Vide Echium procumbens, flosculis atrorubentibus; in horto Regio Blæfensi aucto.

☞ Buxus foliis aureis: Sola variegatione foliorum, à vulgari differt: quod in multis aliis arboribus, fruticibus, & subfruticibus, plantisque, accidit. C.

## C.

**C**ACHRYS peucedani foliis, semine fungoso sulcato: Hujus folia sunt dissecta, peucedani instar, caules Bipedales, umbellas sustinent luteas, quibus satiscensibus, floribus singulis, succedunt bina semina, striata, fungosa substantia inclusa, oblonga, nucis Myristicæ, ferè magnitudine, Melonum instar sulcata, à lævitate una, semine sulcato lævi, altera semine sulcato aspero dicitur. Hinc, duæ species, sola seminis fungosa substantia, lævi & aspera sulcata, distinctæ, utraque species, folia gerit peucedani. Vide Libanotis Cachrifera, seu Cachrys verior, in horto Regio Blesensi aucto; cujus folia sunt ferulacea, aut fœniculacea semina itidè striata gerit, substantia fungosa, plana, inclusa, nucis Myristicæ paritèr ad formam, & quasi magnitudinem.

\* Calceolus mariæ luteus: Folia vulgaris edit, flores ejusdem formæ nisi



quod luteos gerit, éstque Helleborines species, à forma floris, sic denominatur Calceolus mariæ.

☞ Campanula .f. viola pentagonia perfoliata : Hujus folia sunt serrata, subrotunda, binatim ex adverso, caulem ambiunt Dodrantalem: ita, ut ab ipso caule perforari, videantur. In summis, caulium, nascuntur flores, Campanulati, violæ Pentagoniæ vulgaris æmali, quibus succedunt Siliculæ pares, Triplici loculamento distinctæ, semina Pellucida, subrufa, paria, cum vulgaris, Campanula seminibus : continentes.

☞ Campanula .f. viola Pentagonia, folio oblongo latiori : Hæc vulgari perquam similis, nisi quod folia edat longiora, latioraque : totaque planta est major vulgari. Reperimus & vulgarem, intrasata, Regiæ Chambort, flore cœruleo pleno, utraque hæc species lactescit aliarum Campanularum more. Vide Onobrychis arvensis in horto Regio Blesensi aucto.

☞ Carduus Leucographis .f. mariæ hirsutus, capitulo minore: Hic Carduus folia edit



edit longiora, & angustiora, obscurè maculata, secundo anno caulem emittit Bipedalem, aut Tripedalem, in cuius cimis nascuntur capita, minora, purpureos ferentia, tubulos, seu, flores; quibus fatiscantibus, succedunt, semina rotunda, Crassa, & solida: annua est planta.

☞ **Carduus mariæ non maculatus:** Carduo vulgari mariæ, in omnibus accedit: nisi quod folia edit maculis .i. lineis albis, destituta.

☞ **Carduus Leucoii foliis:** Planta est pedalis aut sesquipedalis, cujus caulem ambiunt ex adverso disposita, bina folia Leucoii murorum seu Keiri instar: superne viridia, subtus seu inferne incana; ad quorum appositionem sunt binæ spinæ. Flosculos gerit minimos, purpureos, qui in pappos resoluti, relinquunt semina Crassa, magna satis, pro plantæ tenuitate.

☞ **Carduus exoticus minor, albis maculis notatus:** Hic autumnò sese ferit. Atque per hyemem, folia per terram strata gerit; laciniata, elegantèr lineis albis notata. Caules pedales & sesquipedales,

caputque parvum rubrum fert, cui pap-  
pescenti, succedunt, semina glutinosa  
pappo, inclusa. An Carduus Galactite:  
Joh. Bauh. passim secus vias, prope Mon-  
speliulum reperitur.

☞ Carduus Polyacanthæ æmulus, seu  
alatus; Polyacanthæ capitulis æmulus:  
Hic Carduus ad Tripedalem, nonnun-  
quam ad quadripedalem assurgit alti-  
tudinem. Caulem habet, quatuor aliis  
undulatis cinctum, folia obscurius vi-  
rent, in margine crispa, rarioribus &  
mitioribus spinis, quam Polyacantha,  
armatur: Hic Carduus passim, se-  
cūs viarum margines, circa Londinum,  
Blæsas, parisos, & cœtera (id genus)  
loca, provenit copiose. Flosculos capi-  
tatos, in caulium fastigiis gerit, rubicun-  
diores pauloque majores, Polyacanthæ  
Theophr. saturatius rubescunt flores:  
nonnunquam variat flos, colore albo,  
cœterorum carduorum rubro colore,  
præditorum; more.

☞ Carduus Sphærocephalus annuus Bæ-  
ticus minor: Hic cœteris Carduis Sphæ-  
rocephalis, minor est. Vix Bipedalem  
excedit

excedit altitudinem: flores cœruleos minores, globulatim fert; capita etiam minora, sed semina multò, cœteris suæ familias seminibus majora fundit.

☞ *Caryophyllata montana minor*, flore nutante purpureo: Hæc à *Caryophyllata majori vulgari*; flore purpureo nutante descripta, differt, in hoc, quod folia edat glabra, minutiùsque dissecta, totaque planta minor est.

☞ *Caryophyllus omnium humillimus & minimus*: Hic in montibus Pyrenæis, & alpibus provenit, pediculos profert unciales & biunciales, sustinentes flosculos minutes, rubros, laciniatos, folia gerit tenuia, muscosa, undè muscosus appellari, meretur.

☞ *Caryophyllus marinus minimus flore globoso*: Hic, folia tenuia, ternas quaternas uncias, longa, flores globosos, omnium hujus generis, minimos fert, eorum qui in maritimis nascuntur. Arearum aut Ambulaeorum margines, hoc conferi (cum propter perennitatem foliorum, tum amœnitatem florum per æstatem durantium) solent.



☞ *Centaurium purpureum minimum* :  
 Caules biunciales vel triunciales rama-  
 tim fert, flores purpureos, semina &  
 capsulas seminales, centaurii vulgaris  
 minoris modo, fert. In humidis (circa  
 stagna) locis, provenit.

☞ *Centaurium luteum minimum* : Hæc  
 plantula etiam in humidis vegetat : vix  
 Palmaris est; flosculos gerit luteos :  
 capsulas, plurima minuta semina (vul-  
 garis more) in se continentes, habet :  
 Forte luteum novum colum.

☞ *Chamæcistus halimi folio oblongo* :  
 Hic subfrutex ad pedalem ut plurimum  
 aliquando Bipedalem assurgit altitudi-  
 nem, folia profert oblonga, mucronata,  
 incana, halimi instar. In Glareosis &  
 Arenosis, circa caput Cenomanorum,  
 copiosè conspicitur flores fert luteos,  
 quibus labentibus, succedunt capsulae,  
 triangulares; minuta multa subrufa se-  
 mina in se continentes cæterorum Cha-  
 mæcistorum ad modum. Vide Petrum  
 Belonium Cenomanum.

☞ *Chamæcistus annuus erectus* : Hic  
 caules rectos palmares & sesquipalma-  
 res,



res, producit; flosculos minimos luteos, quinque petalis, luteis, donatos profert. Quibus deciditibus, succedunt (aliorum more) capsulæ triquetrae. Ad cellam Eremitarum, Milliari, Blesis diffitam; prope pagum dictum la Chaussée & circa pictavium copiosè reperitur; est minor species Cisti, folio Salicis Clus. ad pedalem altitudinem rectè ascendentem, circa pictavium reperimus.

⚔ Chamæmelum inodorum; seu cotula inodora semine nigro: In ora maritima Armorica, satis frequens occurrit; hæc planta, cujus folia, sunt Cotulæ vulgaris foetidæ foliis, magis dissecta, Fœniculi, quasi modo, obscuriùs virent: quin & florum petala, sunt multò ampliora, longiora, discum luteum cingentia. Quibus fatiscitibus succedunt semina nigra, estque hujus species, quæ in hortis colitur, & Cotula inodora flore pleno dicitur, quæ pangendo, propagatur. Semen itidem habet nigrum, quemadmodum, observavimus & penes nos impresentiarum habemus, plurimæ sunt plantæ præcipuè annuæ, etiam si flore pleno

pleno donentur, tamen semen produ-  
cunt. Ut clariùs Enucleabimus in Hi-  
storia generali, seu universali, Planta-  
rum: per Tabulas cognationis, seu af-  
finitatis, disponendarum.

☞ *Chelidonium majus*, foliis tenuissimè  
dissectis: Sola foliorum incisione, multò  
tenuius, dissectorum à *Chelidonio* foliis  
quernis differt: nam florem fert, laci-  
niatum itidem; quare ex hujus semine,  
creditur esse degener planta. Nam se-  
men ex hoc collectum, & à me satum:  
*Chelidonium* foliis quernis laciniato  
flore, produxit.

☞ *Chrysanthemum Hispanicum*, tenui-  
folium: Folia habet minùs tenuiter dis-  
secta, quam *Achillea montana*, florem-  
que duplò majorem: utrumque & hoc  
& *Achillea montana*: *Chrysanthemum*,  
ferulaceis foliis nobis dicitur.

☞ *Chrysanthemum Canadense* latifoli-  
um altissimum: Ad quinos senosve o-  
ctonos nonnunquam pedes, assurgit  
caulis, crassius, supra pollicarem crassi-  
tudinem, quem cingunt alternatim, folia  
rugosa oblonga, lata, plantaginis majoris  
(quoad

(quoad formam) majora. In summis caulium fastigiis, fert flores luteos discum luteum ambientes: (numisma, dimidium taleri) vix æquantes; quibus exsiccatis succedunt semina angulosa, quasi floris solis semina; sed minora.

☞ Chrysanthemum Canadense latifolium humilior: Hoc vix Tripedalem excedit altitudinem, foliis, priori, quam proximè accedit, flores multò minores; semina paritèr minora: ejusdem tamen figuræ, cum præcedentis semine.

☞ Chrysanthemum Americanum laciniato folio majus: Caules producit tricubitales, ad quorum nodos, apponuntur folia laciniata, magna, dilutè viridia: flores fert Corymbiferos luteos, quibus deciduis, succedunt semina quadrangula, oblonga; quæ declarant, non esse Doronicum. Cum omnis Doronici flos abit in pappos.

☞ Chrysanthemum Americanum laciniato folio, obscuriùs virenti, minus: Hoc à priori differt quod sit humilior, folia gerit minora, magis laciniata, & obscuriùs virentia, floresque minores, utrumque

utrumque & superius, & hoc semen fert solidum quadrangulum; neutrum pro Doronico haberi debet. Ut vult Johan. Parkinson, cum utriusque semen sit solidum, Chrysanthemi more; multò minùs, est Aconitum ut vult Jacobus Cornutus; omnis Aconiti flos est Cucullatus, producens filiquas membranaceas, quaternas quinas: multa minuta semina rugosa, in se continentes. s. nigra .s. rufa, ergò aptius, denominatur Chrysanthemum, & redarguendi sunt authores, qui non norunt distinguere inter alterem, Doronicum, Conyzam, Helenium & cœteras pappescentes, & Corymbosas: solida producentes semina. Atque hæc dixisse impræsentiarum sat. est.

☞ Chrysanthemum Canadense minus, alato caule: Hæc Chrysanthemi species, folia habet glabra, angusta, secundum longitudinem caulium, producta, adeò ut alatus caulis dici possit. Caules habet Bipediales Tripediales, flores sustinent luteos: quibus deciduis succedunt, semina solida quadrangula, minimè autem in pappos abeunt Asteris instar: ergò  
malè



malè à Jacobo Cornuto Aster alatus luteus dicitur, ut videre est in horto Regio Blesensi aucto, & in Parkinsono sub Asteris nomine, quam bene Judicent lectores.

⚔ Chrysanthemum Canadense bidens, alato caule: Omnium Chrysanthemorum exoticorum, altissimum est hoc; caules edit senos septenos, nonnunquam duodenos excedentes pedes, quibus, adhærent folia aspera, oblonga, ad appositionem, alas constituentia, secundum longitudinem; caulis. Undè alato caule dicitur: flores in cimis caulium, Corymbatim fert, luteos; umbonem luteum cingentes, valdè exiguos, pro magnitudine plantæ vix Calendulæ flores æquant: quibus fatiscentibus succedunt semina, subrotunda compressa, binis aculeis, in superiore parte seminis, prædita. Undè bidens (adinftar Chrysanthemi Cannabini) appellandum, judicavimus. Malè sub Helenio Canadensi in horto Regio Blesensi. Quædam horum nominantur ut hoc Helenium Canadense præaltum, alato caule Aster virgineus

gineus luteus, membranaceo caule Park. ex semine. Chrysanthemum Canadense bidens, melius nominatur; legentium & perpendentium, esto iudicium.

☞ Chrysanthemum Cannabinum Americanum: A nostrate, cognitu facile, quippe caules edit quadripedales, subrubentes firmiores & rectiores, flosculos, ex multis staminulis luteis, conflatos habet: & semina bidentia, multò, vulgaris Chrysanthemi Cannabini, seminibus majora; vestibis paritèr adhærentia, pari modo ut nostras fert: malè in horto. Regio Blesensi pro Eupatorio, cum authoribus aliis scribitur. Ut postea ad Oculum demonstrabitur.

☞ Cicer arietinum, fructu nigro: Solo fructus colore, à Cicere arietino fructu rubro, & fructus ipsius parvitate, & figura, utriusque enim flores sunt rubri.

☞ Clematis peregrina flore parvo: Hæc Clematidi peregrinæ in omnibus accedit: nisi quod flores profert duplò minores, aut rubros aut albos: semina paritèr minora, ejusdem cum priorum seminibus, formæ.

⌘ Clematis Tetraphyllos Americana :  
Ex inspectione quaternorum foliorum  
cruciatim dispositorum , citò dignosci-  
tur ; nec semen nec florem nobis con-  
spicere licuit : scandere (adhibito bacu-  
lo) observavimus.

⌘ Clematis Hederæ folio : Planta est  
scandens & circa perticam sese invol-  
vens ad altitudinem quinquorum pedum,  
plus minusve ascendit ; cujus folia sunt  
Hederæ, æmula, latiora ; flores fert mi-  
nores , herbaceos ; fructum nunquam  
vidi. Malè citatur in horto Regio Ble-  
senfi. Convolvulus Hederaceus peren-  
nis, cum Convolvulo propriè dicto, la-  
tescente, florem unifolium gerente, nul-  
lam habet affinitatem , nisi quod scan-  
dit.

⌘ Cochlearia, armorica floré parvo,  
subpurpureo : Hæc minor est species,  
Batavicæ ; folia ei similia edit, sed mi-  
nora, angulosa, flores etiam minores,  
subpurpureos, seu dilutè purpureos :  
quibus succedunt, Siliculæ bivalves,  
minores aliarum Cochleariarum more,  
semina in se minora paritèr continentes.



☞ *Consolida regalis hortensis*, flore minore versicolore : Seu *Delphinium minus versicolor* : folia habet, *hortensis Delphinii vulgaris* foliis tenuius dissecta, flores minores rubros, Striis nigris maculatos; & eo ipso nomine, ab aliis quam facillimè distinguitur.

☞ *Convolvulus minor argenteus*, .f. *incanus* radice repente : Radices ut cœteri, ejus classis, sub terram, repentes, habet : folia producit subrotunda, incana : flores, Colossinos, seu purpureos & albos, quorum singulis succedunt semina, nunc plura, nunc pauciora, angulosa : passim, ad oram maritimam, circa *Rupellam*, spontè provenit.

☞ *Conyza acris, annua, alba* : Planta est Bipedalis, cujus folia sunt oblonga, serrata in margine; villosa : flores gerit ramatim, in summis caulibus, albos : erigeri, seu *Conyzae acris cœruleæ*, more, quin *Acria* Gustui, ejus folia masticata; statim apparent. Flores decidui in pappos abeunt, & vento Asportata semina, copiosè sese ferunt, per agros, tam in sylvis quam vinetis *Gallia*, *Anglia* passim.



sim. Aster Canadensis annuus, malè in horto Regio Blesensi aucto nuncupatur, quin & parisiensibus, Aster Canadensis (me discipulo) dicebatur, sed cum non stellatum gerit florem, sed Erigeri aut potius Conyzæ cœruleæ, cui sapor acris accedit, aptius (mea opinione) Conyza acris alba; quam appositè Canadensis dicitur (cum passim reperire est) Judicent lectores.

Cotyledon, radice tuberosa, longa, repente: Hæc Cotyledonis species priori, ab Authoribus discriptæ, quam proximè accedit, nisi quod folia gerit majora, spissiora, nec circularitèr, scutellam .s. Cotyledonem effingunt: Sed juxta, pediculi, superiorem partem aperta; nec circularitèr clausa, prioris & majoris modò, quin & radicem, non promit rotundam & tuberosam, rapi instar, sed longitudinalitèr porrectam, & sub terram repentem, à qua exeunt fibræ multæ exiles, quibus nutritur radix. Flores & semina vulgaris modo, habet.

⌘ Cynoglossum folio molli, incano, flor  
cœruleo striis rubris variegato: Hæ  
Cynoglossi species, folia vulgaris folii  
multò producit minora, mollia, inca  
na. Caules profert Bipedales, quoru  
summis innascuntur: flores dilutè cœ  
rulei, striis rubris variè ducti: quoru  
singulis deciduis, succedunt quatern  
femina (vulgaris & aliorum more) aspe  
ra vestibibus adhærentia, multò minora  
rotunda: pascim secus vias; circa Blasa  
provenit.

## D.

⌘ DENTARIA Monophyllos, Anapo  
daphyllon parisiensibus: Nomina  
batur; planta est vernalis, caulem  
terra Palmarem erigens, cujus apici in  
nitur folium sub exortum complicatur  
processu temporis extensum, orbicula  
ritè, rotundum, sinuatum, in margine  
ad caulis prædicti exortum, è terra pro  
rumpit pediculus, triuncialis plus mi  
nusse

nusve; sustinens. Florem, quinque petalis  
 albis, donatum; cui deciduo succedit  
 capsula, nucis Avellanæ magnitudine,  
 multa minuta in se continens semina.

⚔ Dentariæ affinis, Echii flore, capsula  
 rotunda: Hæc planta ineunte vere, folia  
 promit, sub exortum, Astrantiæ aut Dia-  
 pensæ similia, tandem Dentariæ refe-  
 runt folia, inter quæ exit caulis Palma-  
 ris, flores sustinens quaternos, quinos,  
 albos, Echii floribus similes; quibus e-  
 vanescentibus succedunt capsulæ rotun-  
 dæ Anagallidis capsularum instar: se-  
 mina solida in se continentes, asperulæ  
 odoratæ seminibus quasi paria.

⚔ Digitalis Virginiana Lysimachię fa-  
 cie, foliis subrubentibus, flore violaceo  
 minore: Hæc Digitalis species, caules  
 promit Bipedales subrubentes, quos am-  
 biunt per intervalla bina folia mucro-  
 nata, Limonii majoris (primo ortu) fo-  
 liis haud absimilia, inter quæ sese erigit  
 caulis cubitalis, lignosus, rotundus, pur-  
 purascens: cui ad singula genicula, ex  
 adverso bina adnascuntur folia, Lysima-  
 chiæ quodammodò, æmula, arctè adeo  
 R 2 caulem



caulem cingunt, ut perfoliata planta, dici meritò possit: ex alis ad genicula superiora, enascuntur pediculi, alios procreantes, quibus innascuntur flores, calice & forma Dactylothecae seu digitalis ferrugineae minoris, æmuli, dilute violacei, ore non aliter, quinque incisuris, tribus propendentibus, duabus erectis, diviso; per margines hirsuto: in fundo autem tubi seu floris, quatuor stammina arcuata latent, horum singulorum extremo, aliarum digitalium more, duo apponuntur testiculi rubelli, lentiformes, in superiore floris parte. Est autem stilus (propendens versus inferiorem partem) luteus lanuginosus. Succedunt, post evanidum florem Thecae bicapsulares in mucronem acutum bifurcatum desinentes: continentes in se semina infinita minuta, digitalium omnium more.

☞ Digitalis foliis maximè ferratis: Vide, galeata & verticillata, Persicæ foliis, digitalis æmula: post Horminum & Hyssopum infra.

☞ Digitalis latifolia flore ferrugineo: Hæc Digitalis, folia profert oblonga, sulcata,



fulcata, nervosa, multò digitalis ferrugineæ angustifoliæ foliis latiora, è quorum gremio sese erigit caulis Bipedalis, sustinens fastigiatim complures flores, (Dactylothece vulgaris, instar, elegantis ferruginei coloris) majores; in quorum singulorum locum succedunt Thecæ, bicapsulares mucronatæ, & acutè bifidæ, crassiores, digitalis angustifoliæ, flore ferrugineo, capsulis. Semina itidèm paria, hinc inde in duplici loculamento, rufa, sed majora, continentes.

✠ Doronicum foliis subtûs lanuginosis: Hujus caules sunt pedales, folia suprà obscurius virentia, subtûs incana, oblonga: flores fert luteos stellatos (aliorum more) seminaque abeuntia in pappos.

R 3

E.

## E.

❧ **E**CHIUM procumbens, flosculis atrobubentibus, procumbens annuum : Vide Buglossum pullo minimo flore ; in horto Regio Blesensi aucto.

❧ **E**ruca tanaceti foliis : Hæc folia profert incana viridia ; tanaceti foliis (quoad dispositionem ) haud absimilia, ex quorum gremio exit caulis, sesquipedalis, in cuius summis, nascuntur flosculi lutei, quatuor petalis conflati, quibus pereuntibus singulis, singulæ, superveniunt siliquæ biunciales, bivalves, septo membranaceo medio, utramque seriem seminum, hinc inde terminante. Tota planta Gustui calida & acris : quemadmodum reliquæ erucarum species. Antequàm hæc planta caulescat, caulesque & siliquas producat, folia sunt adeo tanaceti foliis proxima, ut nisi gustus, in opem vocetur, difficile erit terminatu. Sub quo genere militare debet : sed flores & siliquæ bivalves, statim ad *Trapetalas*,

trapetalas, filiquosas, referri debere, indicant.

⌘ *Eruca vinealis*, parvis luteis floribus: Hæc *Eruca* species est annua, inter vineta proveniens, folia edit glabra sinuata, binas vel ternas uncias longa: ex horum sinu, exeunt, cauliculi per terram strati, in summis caulium fastigiis, gerentes flosculos parvos, luteos, quatuor petalis, constantes: quibus succedunt filiquæ unciales & biunciales: seriem duplicem seminum continentes (aliarum filiquosarum more) septo medio membranaceo eandem, dirimente. Nec tantum manuum patiuntur maturæ, aliarum *Erucarum* more. Nec mihi videtur sylvestris minor lutea folio *Bursæ pastoris*, *Banh.* in *Prodr.* cum ejus folia neutiquàm ad *Bursæ pastoris*, folia accedunt.

⌘ *Eruca Barbarea* æmula major: Hujus folia sunt majora, caules altiores, filiquæ crassiores, seminaque grandiora. Etenim planta est perennis: quibus notis, quam facillimè, ab *Eruca Barbarea*, dicta: distinguitur.

☞ *Eryngium* ex plani semine degener :  
 Hoc *Eryngium* ex plani *Eryngii* semine,  
 sato pullulavit, & folia produxit non  
 integra, serrata ut planum, sed multifida,  
 & variè secta, florem cœruleum & se-  
 mina paritèr, neutiquam ab *Eryngio*,  
 plano discrepantia, edidit.

☞ *Eryngium* pannonicum latifolium,  
 album, differt à pannonico Clusii solo,  
 florum colore.

☞ *Euphrasia* lutea viscata, serrata pra-  
 tensis : Planta est *Dodrantal*is in pratis  
 & humentibus agris proveniens, intra  
 septa Regiæ, Chambort, passimque ali-  
 bi, cujus folia sunt serrata longa, tactui  
 viscosa, in summis alis caulium flosculos  
 gerit, satis amplos (pro tenuitate plan-  
 tæ) luteos, Galeatos, qui flaccidi relin-  
 quunt, capsulas oblongas, continentes  
 infinita semina minuta : *Euphrasiæ* vul-  
 garis modo.



## F.

⌘ **F**RAGARIA sterilis incana : Hæc Fragariæ species sterilis dicitur ; quia fraga non edit, sed semina sicca, ut reliquæ pentaphylli species, folia habet tripartita ut Fragaria, sed incana aut pubescentia, nec alia nota, à Fragaria sterili vulgari differt : copiosè in sylvis adjacentibus, pictavio, reperitur. An leucas Dioscoridis Lob. dubitatur.

⌘ Fragaria pentaphylli fructu : Hæc Fragariæ species, sub exortum, folia omninò tripartita, & Fragariæ vulgaris æmula gerit ; sed caules emittit pedales, & sesquipedales, erectos : ut pentaphyllum majus ; Fragariæ folio, meritò dici possit. Flores luteos, capsulas seminales, & semina ibidem contenta, pentaphylli sunt æmula. Vide pentaphylloides hort. Regii Bles. aucti.

⌘ Fraxinus florifera Botryoïdes : Hæc à vulgari Fraxino parùm differt ; primo intuitu, quoad foliorum dispositionem,  
&

& corticem; sed florum profert racemos; Dodrentales albos, pendentes: filiquas seminales nondum vidimus.

☞ Fritillaria ramosa, seu Liliū Persicum minus: folia profert omninò, Liliū Persici florum æmula, sed angustiora, caules edit pedales, in quorum summitate proveniunt ramatim seu Corymbatim, flosculi quini, seni pendentes, pullo colore præditi, Liliū Persici instar.

☞ Frumentum Indicum, spica articulata, radice perenni Spicam longam semipedalem per articulos, semiunciales aut unciales, dispositam gerit, qua sola nota (iuncta duratione) facile cognoscitur.

☞ Fumaria, tenuifolia, semine compresso, lini instar: Hæc Fumariæ species, folia omnium tenuissima gerit, caules promit palmares & sesquipalmares, in quorum summis proveniunt (aliarum more) flosculi Corniculati, ex albo elegantèr purpurei, quibus decidentibus, subveniunt semina, compressa, tumidiuscula lini instar, nec capsulas vulgaris Fumariæ ritu, producit. Et ideò indescriptam esse iudicavimus: à semine primo intuitu, cuilibet

cui libet obvia : crescit in Galloprovincia, & Gallia Narbonensi.

---

## G.

⌘ **G**ALLIUM album tripetalon : Hæc Gallii species folia gerit, oblonga & angusta, vulgaris Gallii haud absimilia, flores fert multò minores. Tribus tantùm petalis donatos. Qua nota, ab aliis suæ classis (quippe quatuor petalis donantur) faciliè distinguitur.

⌘ Geranium Batrachoïdes, minus, perenne versicolor : Hoc folia habet minora, minùsque incana, Ranunculi Batrachoïdis instâr, maculis nigris .f. fuscis notata ; flores fert in summis ramis, striatos, ex albo & nigro ; quemadmodùm Romanum versicolor Park. floribus cadentibus succedunt semina quina minora, subtrusa, rostrum brevius aculeatum terminantia.

⌘ Geranium Batrachoïdes minus annuum purpureocœruleum : Hujus folia omnino

ninò Ranunculi Batrachoïdis; sunt æmula, flores fert magnos, purpurocœruleos, quibus deciduis succedunt semina paritèr quina, nigra; rostrum Grinum biunciale, terminantia, ad basim. Hoc solum Batrachoïdes, annuum est, & ideò inter cœtera notu, facilius.

☞ Geranium Malachoïdes, seu Malvæ folio rotundo, flore albo: Hoc solo florum, colore albo, differt à pede Columbino Dod. seu Geranio Malvæ folio rotundo vulgari B. P.

☞ Geranium Robertianum, flore albo: Solo itidèm florum colore, à vulgari rubro differt.

☞ Glaux major, palustris, flore herbaceo: Hæc in fluviis & ad margines fluviorum: per prata labentium, provenit; caules habet pedales, aquis innatantes, à quorum geniculis nodisve, demittuntur fibræ, in aquam, quarum beneficio nutritur tota planta; ad singula genicula oriuntur bina folia, pulegii Regalis foliis latiora, glabra, mucronata; in caulium alis superioribus, emergunt flores, herbacei coloris qui relinquunt in capsulis oblongis



oblongis, Caryophylli aromatici magnitudine ; in singulis infinita semina minuta, subviridia : etiam, Euphrasie ad modum, continentur.

Æ Gramen Phalaroides perenne, tuberosa radice : Spicam fert, Phalaridis spica, tenuiorem longiorem ; seminaque multò sunt minora. Radices habet tuberosas, lucentes, perlarum instar, per nodos, Typhini graminis radici similes : perehnis est planta.

Æ Grossularia .s. Ribes fructu rubro, Uvæ crispæ folio : Frutex hic ad tripedalem assurgit altitudinem cortice refert Ribem, foliis Uvæ crispam, fructum fert Ribis, rubrum, racematim, seu. Botrys in modum dispositum.

## H.

⌘ **H**EDERA trifolia Canadensis; folio sinuato: Hæc à Hedera trifolia Canadensi Cornuti differt in hoc, quod folia, habet minora, tripartita, in margine autem sinuata, quod non conspiciere licet, in Hedera trifolia Canadensi Cornuti.

⌘ Helenium Indicum tuberosum, radice oblonga: Sola radicum longitudine; (quæ ad semipedem aliquandò accedit) ab Helenio (seu potius Chrysanthemo) tuberoso, radice rotunda, differt.

⌘ Helleborine, herbaceo flore: Ex primo intuitu florum, cognoscitur. Hæc Helleborines species; in collibus, sylvis. Ubi sylvæ sunt cœduæ, cernere ipsam frequentèr licet.

⌘ Helleborus niger, flore roseo, minor Belgicus: Hic, omnibus suis partibus, foliis, caulibus, flore, est vulgari hortensii, seu legitimo, minor: florem fert ex albo roseum.

☞ Hieracium flore parvo luteo, apuli, flore suaverubenti, odore æmulum : Hæc Hieracii species aded odore, Hieracio apulo, flore suaverubenti Col. accedit. Quippe Amygdalas amaras redolet utrumque : ut idem odoratui appareret, sed hoc folia habet angusta, flores minimos luteos, quibus evanidis succedunt, in Calycis, margine exteriori, incurva quasi rostra. In viarum marginibus passim reperitur circa Blesas. Hæc duplici nota, odore & rostris incurvis, in marginibus Calycis, exterioribus : cognitu cuivis obvium.

☞ Hieracium, foliis & floribus dentis Leonis bulbosi, semine curvo : A semine curvo facile distinguitur, hoc Hieracium ab omnibus aliis, suæ classis.

☞ Hieracium angustifolium glabrum, seu pilosella major glabra : Caules edit bipedales, ramosos : folia angusta glabra. Atque sola glabritie, quam facilimum erit, à cæteris hujus ordinis, (quippe villis scatentibus) ipsum distinguere.

☞ Hieracium (pulmonaria non maculata, dictum)

dictum) indiffectis foliis: In sylvis montosis, & collibus sylvosis: Hæc pulmonariæ species, provenit. Foliis nullis maculis conspersis, in margine integris. Hinc à cœteris, notu, non est difficile.

☞ Horminum majus, amplo flore violaceo, Lobis florum, punctis aureis notatis: Hoc Horminum folia profert hirsutiora, cœteris suæ sortis; (excepto solo Æthiopico) ad basin angulosa: inter quæ exeunt, caules Bipedales, aliquandò tripedales, quadrati, quos (ad genicula) amplectuntur, bina folia Dodrantalia (ut superius dictum) auriculata. In summis caulium, verticillatim proveniunt flores ampli, violacei, Lobis florum, lateralibus; punctis aureis aut purpureis, notatis; floribus singulis evanidis, succedunt in capsulis magnis, semina crassa nigra quaterna ut plurimum, majora, cœterorum omnium Horminorum, seminibus. Atque punctis aureis aut purpureis & semine majore: notu facile, à sequenti, cum quo majorem habet affinitatem.

☞ Horminum lapathi unctuosi folio, seu, majus



maius hastato folio: Hoc folia habet hirsuta, angulosa aut auriculata ad basin, ut superius. In mucronem desinunt, hastæ instar cuspidis, quin & formâ lapathi unctuosi, folia representat. Flores fert magnos, omninò violaceos, semina, in omnibus prioris seminibus minora, & subfusci coloris.

⊗ Horminum napi folio: Ex divisione foliorum, napi foliis similium & florum parvitate, lavendulæ, instar. Satis notum facile.

⊗ Horminum Salviæ folio: Hoc Horminum adeò Salviæ majoris foliis habet similia ut principio, à satione. Salviæ (primo intuitu) videretur species: Flores fert purpureos majores. Odore, Horminum sese declarat. Fortè hæc Hormini species est quæ, à prosp. alpino; marum Ægyptiacum denominatur.

⊗ Horminum minus, folio sinuato, flore minore dilutè cœruleo: Caules quadratos, pedales, hirsutos, producit; procumbentes, rariùs ramosos: foliis nonnihil hirsutis (pollicarem latitudinem vix excedentibus) oneratos; uncias

S tres

tres longis, in margine sinuatis. Cauliculi, floribus rarius dispositis ornantur, dilutè violaceis, Lavendulæ florum æmulis. Quibus decidentibus, succedunt in singulis capsulis, quaterna semina minora, nigra aut fusca rotunda. Sylvestris quarti, quinta species Clus. passim hîc in Anglia secus fluvium Thamisin, copiosè provenit, folia habet majora sinuosa, saturatiùs viridia. Caules fert quadratos (ut verticillatæ Galeatæ fere omnes) pedales & sesquipedales erectos. Quorum summis ramis, innascuntur flores paulò majores magisque saturè violacei, quàm prioris descripti, sunt flores; sed florum magnitudine, quàm proximè accedunt.

☞ Hyssopus hirsuta : Ab Hyssopo latifolia vulgari, sola hirsutie foliorum : Quemadmodum, striata seu aurea, à variegatione ; distinguitur à vulgari ; hoc accidit in multis aliis tam arboribus, fruticibus, & plantis, ut superiùs diximus

☞ Galeata & verticillata, Persicæ foliis, digitalis æmula : Hæc Galeata & verticillata

cillata planta, adeò similia producit folia, foliis, *Perficæ mali*, quoad formam & ferraturam, ut nihil magis, flores autem fert *Galeatos*, subpurpureos, amplos, quorum singulis succedunt, quaterna semina angulosa, in capsulis quinque partitis in margine, verticillatarum & *Galeatarum* propriè sic dictarum more. Nec *Thecam bicapsularem*, pyramida-lemve: Hinc indè, infinita semina minuta, subrufa, continentem habet. Ergo perperâ Botanici hucusque, passim pro digitali *Perficæ foliis*, habetur. Vide digitalis, foliis maximè ferratis: in horto Regio Blesensi aucto.

## I.

☞ **J**ACEA lusitanica sempervirens : Planta est tripedalis, folia habet, cœteris, suæ sortis, latiora, durabiliora, per hyemem totam ut plurimum durant, flores, & semina habent majora. Quibus notis, à reliquis, speciebus facilè distinguitur.

☞ Jacobæa foliis amplioribus incanis : Ad sylvarum & vinetorum margines provenit hæc Jacobæa : foliis Jacobææ vulgaris, foliis multò ; sunt latiora, minusque secta, quin & ipsis sunt multò magis incana. At Jacobææ marinæ foliis, multò minus sunt incana : medium inter utramque (quoad canitiem) obtinet locum ; flores & semina paria.

☞ Jacobæa Crithmi litorei foliis : Planta est Bipedalis, folia angusta, crassa, oblonga, viridia, Crythmi Chrysanthemi maritimi instar, habet : florem fert luteum Jacobææ, stellatum : cujus petala lata lutea, cingunt discum luteum, ex plurimis staminulis luteis, conflatum :  
(aliarum



(aliarum Jacobæarum more) flos abit in pappos.

✠ Jacobæa Senecionis folio : Observa, Jacobææ notam genericam & essentialem (quâ distinguitur à Senecione) esse, quod flos Jacobææ, constet multis petalis latis & planis : cingentibus discum, ex plurimis staminulis luteis, conflatum. Senecionis autem flos tantum componitur, ex staminulis plurimis luteis ; nullis petalis planis, latis, easdem cingentibus, qua ratione hæc concluditur esse vera & genuina, Jacobææ species ; cum Jacobææ habeat florem stellatum : ut supra satis dictum. Quoniam folia omnino dissecta habet, ut Senecio : Jacobæa Senecionis folio, aptè dicitur. Desumpta denominatione, à nobiliore parte. Flore videlicet.

✠ Iberis Virginiana, latifolia ramosa : Folia fert Iberidis vulgaris foliis, latiora. Caulesque edit altiores & fruticosiores ; annua est etiam planta, & hac nota à vulgari facile distinguitur.

## L.

⌘ **L**AMIUM parietariæ facie : in omnibus Lamio vulgari accedit. Facile autem dignoscitur, ex primo intuitu, à foliorum cum parietariæ foliis, similitudine.

⌘ Laserpitium alterum, foliis Lobatis angustis, dilutè virentibus : A Laserpitio Gallico distinguitur, quod folia producit dilutius virentia, quam Gallicum, cujus folia, sunt lucide atrovirentia.

⌘ Lathyrus latifolius, luteus, annuus, filiqua hirsuta : Hic Lathyrus inter Sativales adjaçentia, frequentèr satis, provenit ; florem fert dilutè luteum (aliorum more) papileaceum cui, succedit filiqua longa, hirsuta, qua nota præcipuè distinguitur ; à suæ classis, reliquis.

⌘ Lathyrus latifolius, flore obsoleto filiqua Pisi minoris : In arvis satis, circa Rupellam, frequens nobis obvius fuit hic Lathyrus : florem subrubrum vel obsoleti coloris gerit ; cui succedit fili-

qu

qua sesquiuncialis, duplici ala, cavâ parte (qua semina quaterna quina junguntur) prædita.

☞ *Lathyrus angustifolius* λεπτολόκος, semine rotundo, flore rubello : Hæc Lathyri species, folia ut sequens, gerit angusta, Graminea, longa, caulem pedalem & sesquipedalem, habet : in cujus cimis nascuntur flores Rubelli, obsoleti coloris. Quorum singulis, succedit siliqua rotunda, multò sequentis, siliqua longior : in qua continentur semina dena, duodena rotunda.

☞ *Lathyrus angustifolius* λεπτολόκος, semine hexedro, flore cœruleo : Lathyrus hic folia habet angustissima, Graminea, florem fert cœruleum, papileaceum : (cœterorum more) cui succedit siliqua, longa, tenuis : continens minuta semina, angulosa cubum .i. hexedram, referentia.

☞ *Laurus Alexandrina*, fructu longis pediculis, caulibus, alligato : Sola hac nota distinguitur ; quod fructuum seu baccarum pediculi, unciales aut biunciales, à cauliculis pendent, in reliquis

autem, folio aut pediculo, baccæ, frutisque insident.

☞ *Liliasphodelus*, latifolius flore luteo, sola magnitudine foliorum & florum ab angustifolio differt.

☞ *Lilium* .s. Martagon Canadense: Elegantia florum, elegantè à natura punctatorum: facile distinguitur; à cœteris suæ familias.

☞ *Linaria minima hirsuta*, flore obsoleto: Hæc tenuis *Linariæ* species, folia habet quodammodò *Antirrhini* æmula, florem habet subnigrum (insoleti coloris) sed omninò *Linariæ*, quippe rictum habet anteriùs, & calcari donatur posterius capsulamque binis loculamentis, distinctam habet. Septo membranaceo utrumque determinante: malè ab authoribus pro *Antirrhino* minimo, appingitur: in satis arvis, passim occurrit.

☞ *Linaria minor viscosa*, flore luteo: Hæc *Linariæ* species, folia edit hirsuta, viscosa, caules semipedales, in quorum cimis, flores fert *Linariæ*, luteos: quibus evanescentibus, succedunt capsulæ, aliarum more. Continentes semina nigra



gra compressa, seu foliacea, non autem ut *Linaria vulgaris*, rotunda : (hinc nota duo reperiri genera *Linariæ*, quorum unum fert semen compressum, nigrum, foliaceumve, alterum rotundum, ut prolixius alibi, in Tabulis nostris, cognitionis, deducemus) in Arenosis maritimis Armoricæ provenit hæc *Linaria*.

☞ *Linaria Armorica*, flore saturè violaceo : Hæc folia producit glabra, angusta : caules pedales, quibus innascuntur flores, saturatè violacei, parvi, parvas relinquentes capsulas, *Linariæ* in modum.

☞ *Linaria angustifolia* glabra, flore luteo majore : Hujus folia sunt quasi *Psyllii* foliorum æmula, longiora. Caulem producit, sesquipedalem, cujus cimis innascuntur, flores lutei multò majores, pro tenuitate plantæ, quàm in ulla alia *Linaria*. Circa Burdegalam, in satis, provenit.

☞ *Linum sylvestre* annuum, luteum, folio latiore & angustiore : Spontè in humidis sylvis, utraque hæc species crescit, solo hoc discrimine quod, unius folia  
sunt

sunt latiora, alterius angustiora. Vix Dodrentalem altitudinem excedit, utraque species.

☞ *Linum perenne cœruleum, sativo æmulum*: Hoc in omnibus sativo accedit nisi quod est perenne.

☞ *Lychnis flore muscoso capillaceo*: Habet caules sesquipedales, *Lychnidis* (sesamoïdes *Clusio*) dictæ, æmula. Sola hac nota ab omnibus *Lychnidum* speciebus differt quod non (aliarum more) florem, quin is petalis, ad medium bifidis, gerat. Sed florem edit ex plurimis capillis muscosis, herbacei coloris.

☞ *Lychnis Alpina glabra, Caryophylli holostei flore*: A foliis glabris *Caryophyllorum*, foliorum æmulis, biuncialibus aut triuncialibus, notu perquam facilis, flores fert minores albos, quin is petalis, ad medium bifidis constantes; capsulam seminalem, & semina aliarum more producit.

☞ *Lychnis minor viscosa Saxatilis; Caryophylleis foliis*: Hæc inter Saxosa, provenit, *Pyrenæorum montium* & in *Alpium jugis*, folia habet glabra, mucronata,

cronata, Caryophylli instar : Caules vix semipedales profert : ad singula internodia (ut in pluribus aliis *Lychnidum* speciebus) visco obductos ; quo muscæ captantur, unde viscosa dicitur.

☞ *Lychnis maritima repens*, strictissimis foliis : Hujus cauliculi per terram sunt strati, quibus strictissima, innascuntur folia, flores fert albos minores, quibus pereuntibus, succedunt capsulæ, aliarum *Lychnidum* more, & semina ibidem contenta. Provenit in sabuletis maritimis armoricæ, & circa Rupellam. Hæc planta.

☞ *Lychnis incana* longiori folio, petalis non bifidis : Hæc *Lychnidis* species, quod folia edit longiora, incana, & florum petala, habet non bifida, notu facilima, nec novi ullam, hujus generis speciem aliam, quæ petala gerit non bifida : præter auriculam muris, pulchro flore, folio tenuissimo. Joh. Bauh. in *Ericetis* sabulosis, sex milliaria, à Burbonum capite, distantibus, reperitur, satè frequentèr.

☞ *Lychnis* (*papaver spumeum*) *latifolia* vulgaris,

vulgaris; hirsuta: Hæc sola foliorum hirsutie, à papavere spumeo, vulgari glabro, differt; inter sata, valdè frequentèr occurrit.

☞ *Lychnis* (papaver spumeum) angustifolia glabra, flore purpureo, ab angustifolia vulgari glabra, floris colore, solummodò differt.

☞ *Lycopsis Monspeliaca*, floribus dilutè purpureis & albis: Ad tripedalem assurgit altitudinem, flores Corniculatos dilutè rubros & albos, aliorum *Echiorum* aut *Lycopsium* more habet, quaterna, didicentes relinquunt semina; viperini capitis, figuram referentia. Nota essentialis & generica quâ distinguitur *Echium* seu *Lycopsis*. A *Buglossa* seu *Anchusa*, est hæc. Quòd hujus flores quinque petalis constent: illius autem flores sunt Corniculati. Quod cuilibet observanti & propiùs intuenti, quam facillimè apparet.

☞ *Lysimacha Corniculata*, lutea Canadensis minor seu angustifolia: Hæc sola foliorum angustia, aliarum suarum partium; florum scilicet & capsularum seminalium,



mineralium, parvitate differt, à *Lyfimachia* *Corniculata* lutea majori *Cornuti*.

☞ *Lyfimachia* purpurea spicata lanuginosa, feu folio subrotundo incano : *A* *Lyfimachia* spicata communi purpurea *Clus.* differt, quod hujus folia sunt glabra, oblonga, mucronata ; illius vero incana feu lanuginosa, subrotunda, cœtera ei par.

---

## M.

☞ **M**ALVA *Betonicæ* folio: Cauliculos profert pedales & sesquipedales per terram stratos quibus adhærent alternatim, folia oblonga, *Betonicæ* foliorum instár. Flores fert amplos Rubellos; semina, nec ad maturitatem pervenêre.

☞ *Malva Hispanica* : Hæc *Malvæ* species folia producit mollia, undulata in margine. Superiùs, micis sulphureis ad solem, lucentibus donata sunt. Caules edit bipedales, aut tripedales, flores & semina

semina aliarum Malvarum modo. Perennis est planta: quin & perpetua fronde viret. Ut Althæa Olbiæ, in meridionalibus saltem regionibus.

☞ Marrubium aquaticum seu aquatile foliis tenuiùs dissectis: Hæc Marrubii species, longè lateque radices suas, hæc, illac serpendo, spargit: Caules fert tripedales ut vulgare. Folia autem duplò aut triplò tenuiùs, vulgaris foliis, sunt dissecta. In omnibus aliis, vulgari congruit.

☞ Melissa Romana hirsutior: Hæc folia profert multò vulgaris foliis latiora, multoque hirsutiora, quin & tota planta, multò est major vulgari, ad ternos, quaternos (aliquandò) assurgit pedes. Hujus semen, ut & aliarum plantarum (in horto Regio Blesensi aucto, contentarum) multa, ad me missa fuerunt semina. A doctissimo & peritissimo Botanico, Domino Jacobo Barillier, in sacra sancta Theologia Doctore, ordinis prædicatorum socio, dignissimo, ad mineram Romæ, pro eo tempore commorante: cui immortales debemus gratias.

⌘ *Melissa Bætica* : Vide *Brunella Bætica* suprâ : Cum non habet odorem *Melissæ*, nec flores *Galeatos*, rariùs per verticillos dispositos ut *Melissa*. Sed verticillos densissimè dispositos : & quasi (*prunellæ* in modum ) in spicam degenerantes, prout clariùs deducemus in *Tabulis nostris*, cognationis. Pro *prunella* habeatur.

⌘ *Millefolium tanacetii foliis* : Hujus folia sub exortum, antequam, caulescat planta, adeò sunt *Tanacetii*, foliorum æmula, ut non nisi ab oculato Botanico, distingui possint ; nisi gustus & olfactus, vocentur in opem. Sed postquàm produxerit caulem & *Corymbum*, *Millefolii* in modum, semenque paritèr *Millefolii*. Sese declarat verum & genuinum *Millefolium*. Estque flore albo & purpureo. Vide *Tanacetum montanum purpureum* : in horto *Regio Bles.* non aucto. Quàm inneptè *Botanicis*, *Tanacetum* dicitur, videat lector & examinet mecum.

⌘ *Myrrhis perennis lutea daucoides* : Hujus folia quàm proximè *dauco*, seu *pastinacæ*

pastinacæ tenuifoliæ, accedunt, quin & flores habet luteos, semina rostrata striata, Myrrhidis. Montanæ, seminibus longiora at minùs tumida habet. Perfecto semine, sese renovat ex eadem radice.

☞ Myrrhis nodosa annua, semine aspero: Hujus caules ad internodia crascescunt, nodosque gerunt pyriformes, flores gerit albos, in summis caulium bipedalium. Quibus exeuntibus, succedunt semina rostrata bina, striata, aspera, in convexa parte; imo multò sunt, reliquis crassiora. Unde à nodositate caulium flore albo, & semine striato aspero, quàm facillimè, à reliquis Myrrhidum speciebus distinguitur. Hoc addito, quod sit annua planta. Nota quod omnis Myrrhidis, semina bina sint striata; Cerefoli autem lævia nigra, ergò Myrrhis Fuchs. seu sylvestris seminibus lævibus B. Pin. est Chærophyllum sylvestre. At Anthriscus Plinii historiæ Lugd. est Myrrhis sylvestris, non Chærophyllum sylvestre. Quia semina habet striata, hoc adde quod nodos gerit pyriformes.



☞ *Myrrhis perennis montana alba* : Hæc *Myrrhidis* species affurgit, ad binos ternosve pedes, caules producit striatos, flores (aliarum suæ classis more) albos : quibus succedunt semina rostrata, striata. Semiuncialia exterius lutea : cava parte qua junguntur, subcœrulea ; est foliis hirsutis & hirsutioribus, cujus folia medio modo, secta sunt, satis lata. Est & tertia hujus species, cujus folia sunt tenuius dissecta.

☞ *Myrtus aurantiæ folio* : Hujus folia sunt aurantiæ foliorum, colore & consistentia, aded æmula, nisi quod sint multò minora, & angustiora. Ut malum aurantium minorem (antequàm flores & fructum edit) nullus dicere vereretur. An *Myrtus latifolia* Park, Clus, hist. dubitatur.

T

N.

## N.

⚔ **N**ASTURTIIUM pratense flosculis minimis; Pedalem & sesquipedalem habet altitudinem hæc planta: folia quàm tenuitè dissecta, flosculos minimos albidos quatuor petalis (aliarum filiquosarum, tetrapetalorum more) constantes producit; quorum singulis succedunt filiquæ biunciales, bivalves, septo medio membranaceo, disternante: duplicem seriem, seminum, cœterorum (suæ classis) more. Quin & matura semina, manuum tactu; per terram sparguntur. Unde noli me tangere dicitur. Fortè Nasturtium sylvest. minus Bauh. in Prodr.

⚔ **Nigella sylvestris**, flore luteo pallido; Seu **Lychnis** (**Pseudomelanthium**) dicta solo, florum colore, à vulgari **Pseudomelanthio**, differt.

O.

## O.

**O** C Y M U M minimum foliis rubescen-  
 tibus: Ex satiatione, tanta est vari-  
 etas horum, ut folia aliquandò rubef-  
 cant, aliquandò sunt luteopallida, ut  
 plurimùm viridia. Aliquandò integra,  
 nonnunquam serrata, ita ut ex satiatione,  
 concludo esse lusum naturæ, ut in multis  
 aliis annuis.

**O** n o b r y c h i s, flore saturatè rubro ;  
 Ab Onobrychide vulgari, solo florum  
 colore differt.

**O** n o b r y c h i s, viola Pentagonia dicta,  
 vide Campanula .s. viola Pentagonia.

## P.

**P** A S T I N A C A tenuifolia lucida: Vul-  
 garis Pastinacæ, folia sunt hirta, hu-  
 jus folia sunt glabra & lucida, sola luci-  
 ditate & glabritie foliorum, à vulgari  
 facilè distinguitur.

☞ *Pastinaca tenuifolia*, radice & umbella lutea : Facile ab hortenſi & ſylveſtri, diſtinguitur ; quippe harum umbellæ, colore ſunt albo illius umbellæ ſunt colore luteo, præditæ.

☞ *Pentaphylloides Fragariæ folio* : Vide *Fragaria Pentaphylli* fructu.

☞ *Pentaphylloides*, *Argentinae facie*, nobis : *Pentaphyllum ſupinum* *potentillæ facie* Cluſ.

☞ *Pentaphylloides*, *Ulmariae facie*, nobis : *Pentaphyllum fragiferum* 5. Cluſ. cum duæ poſteriores plantæ, coſtas ſeu nervos medios, longos habent, quibus quina, interdum plura foliola, adherent è contrario, inter ſe foliorum exortu, naſcentia : uno extremum claudente. *Potentillæ* ſ. *Argentinae*, ritu. Ergo, cum ſtorem & ſemen, aliorum *Pentaphyllum* more, perficiunt. Folia autem *Pentaphylli* non habent, *Pentaphylloides* nuncupari velim.

☞ *Petaſites minor*, folio *tuffilaginis* : *Petaſitis* folia ſunt ſcabra aſpera. Hujus autem, ſunt prona parte viridia, ſupina, incana, *tuffilaginis* inſtar, & niſi quod florem



florem producit Petasitis, esset vera tus-  
silaginis species.

⌘ Peucedanum minus foliis Lobatis an-  
gustis: Hæc umbella, folia producit  
quina, sena, nunc plura, nunc pauciora,  
è regione Rachi seu nervo medio, ad-  
nascentia, uno extremum claudente, è  
quorum medio sese erigit Caulis Bipe-  
dalis, sustinens flores luteos, umbellæ in  
modum; semina fert membranacea, ro-  
tunda, Peucedani vulgaris instar.

⌘ Phalangium Virginianum, amplo flo-  
re: A Phalangio Virginiano tradescan-  
thi, sola amplitudine, florum & seminum  
differt. Estque flore rubro, cœruleo &  
azureo.

⌘ Phalaris, semine minore nigro: Hæc  
semen, producit, minus Phalaridis vul-  
garis, semine, quod & nigrum est, qua  
nota, facile, distinguitur à Phalaride  
Dod.

⌘ Phaseolus minor Collossinus, siliquis  
longissimis: Hic Phaseolus ut & sequens,  
vix pedalem aut sesquipedalem exce-  
dunt altitudinem; Hic florem Colossi-  
num: fructumque minorem Colossinum,  
T 3                      siliquas,

filiquas, senas, septenas uncias longas fert, strictissimas. Non scandit nec sequens.

☞ Phaseolus, filiquis rotundis Viciæ, fructu ovali viridi: Hæc Phaseoli species, vix pedalem excedit altitudinem, flores fert herbacei coloris; aut subvirides, papiliaceos, filiquas Viciæ in modum, rotundas, quaternas uncias aliquandò excedentes: semina oblonga, viridia, ovalia; in se continentis.

☞ Pilosella major glabra: Hæc à majori repenti hirsuta Bauh. in Pin. differt sola glabritie.

☞ Pimpinella maxima; spica longa rubra: Hæc à sanguisorba differt, quod spicam gerit, ipsa longiorem, ternis, quaternis unciis constantem, hujus est & alia species, ei omninò accedens, nisi quod spica sit brevī, Glomerata, rubra paritèr, utraque, folia gerit longiora, & magis serrata, quàm Pimpinella sanguisorba.

☞ Pimpinella Agrimonoïdes: Hujus folia (prima facie) Agrimonie foliis quàm proximè accedunt: aspera, villosa sunt, Rachi

Rachi seu nervo medio (aliarum Pimpinellarum more) adhærent, uno extremum claudente gratissimum, contréctata spirant odorem, caules pedales habet: in horum cimis proveniunt, spicæ Glomeratæ, seminibus striatis (gratissimi odoris) onustæ.

⌘ Pīsa nana rotunda: Omnium, suæ familias sunt minima, & humillima. Pīsa hæc, nec prolixiore egent descriptione.

⌘ Pīsum sylvestre Viciæ fructu: Primo intuitu, à folliculo seu siliqua Viciæ dignoscitur.

⌘ Pistachia Virginiana, sylvestris trifolia: Vel primo intuitu à foliorum (ternatim) dispositione, seminumque in vesicis parvitate, notu, à vulgari, perquam facilis.

⌘ Plantago marina quinquenervia incana: Hujus folia Plantaginis quinquenerviæ vulgaris, in omnibus, accedit: nisi quod sint minora & villis adeò obducentur, ut incana, aut cinere obducta videantur.

⌘ Polium rubrum majus, flore dilutior: Hujus folia, Polii lutei vulgaris,



foliis, quàm proximè accedunt, & quoad magnitudinem, serraturam & incanitem. Florem fert majorem, dilutiùs rubrum, quàm quintum Clus.

☞ *Polygonum minus maritimum incanum*: Hujus folia sunt *Polygoni marini* vulgaris, multò minora, cinerei coloris, aut incana lanugine, obducta videntur.

☞ *Portulaca minima* flore albo: Hæc plantula est uncialis, in humidis arvis, ineunte æstate, per terram strata: folia producit semiuncialia angusta, quodammodò crassa. Flosculos ad nodos producit albos. Quibus deciduis, succedunt, minutula semina, *Portulacæ*; seminibus omnimodè conformia, nigra itidem.

☞ *Portulaca hortensis* flore flavo: Solo foliorum colore, à *Portulaca hortensi*, seu culta differt.

☞ *Potamogeton Virgineanum*: Bipedalis aut tripedalis est planta: folia gerit latiora, obscurè virentia; spicas triunciales, albis floribus rarò ibidem dispositis, onustas fert, non autem compactim spicæ in modum. Semina habet triquetra, ut *Persicaria* & *Polygonum*.



- ☞ **Ptarmica Virginiana folio Helenii :**  
 Hæc est Corymbosa, Bipedalis planta,  
 cujus caulibus, adnascuntur, folia lata  
 & oblonga, Helenii foliis haud absimilia,  
 flores fert (corymbatim) albidos, semi-  
 naque, Ptarmicæ vulgaris, seminibus,  
 omninò similia unde ei nomen imposui-  
 mus.

## Q.

- ☞ **QUERCUS vulgaris brevi pediculo :**  
 Hæc facile discernitur. In sylvis  
 annosis, Galliæ passim; à vulgari, longo  
 pediculo, vel ipso aspectu. Folia habet  
 sinuata; prona & supina parte, viridia.
- ☞ **Quercus foliis subtus incanis, brevi**  
 pediculo. Datur & alia longo pediculo.  
 Utraque folia habet angusta, sinuata,  
 subtus incana.
- ☞ **Quercus Calyce Echinato, glande**  
 majore: Hæc à glandis magnitudine, &  
 Calyce Echinis donato, inter cœteras  
 suæ familias (in sylvis annosis, Galliæ)  
 cognitu perfacilis.

☞ **Quinquefolium alpinum repens, serotinum:** Hæc Quinquefolii species, sub exitum autumnii floret, caules per terram stratos gerit, sustinentes flores luteos.

☞ **Quinquefolium Canadense erectum:** Hujus caules sunt Bipedales, erecti, flosculos gerunt magnos, luteos, capsulas feminales, aliorum more.

---

R.

☞ **RANUNCULUS arvensis annuus flore minimo luteo:** Hic Ranunculus folia gerit hirsuta, tripartita, caules edit per terram sparsos, quorum summis caulibus innascuntur, flosculi lutei, minimi, quinis (aliorum more) petalis donati. Quibus deciduis, succedunt racematim, semina minora, spinosa aliorum more.

☞ **Ranunculus nemorosus flore albo pleno:** Hic sola plenitudine florum differt, à nemoroso, flore albo simplici.

☞ *Ranunculus nemorosus* flore pleno violaceo : Hic paritèr plenitudine florum, & colore violaceo, differt, à nemoroso simplici. Quoad folia & radices idem.

☞ *Ranunculus Ceratophyllos*, seminibus falcatis, in spicam addactis : Foliis est ter, tripartitis : Cornu cervi quodammodò referentibus è quorum medio exeunt cauliculi plurimi, triunciales, singuli, singulos sustinentes flosculos (aliorum *Ranunculorum* more) quinis luteis petalis constantes; ambientibus rudimentum viride, quod tandem in spicam degenerat uncialem; seminibus falcatis onustam. Annua est plantula, præcox. Mense Martio floret, in segetibus, Galloprovinciæ, & Narbonensis Galliæ, satis frequentèr : perperam à Lobelio in adversariis pagina II. appingitur pro *Melampyro perpusillo*; cum *Melampyrum* (in genere) sit planta Galeata, toto Cœlo, ab hoc *Ranunculo*, discrepans. Cumque omninò propius ad *Ranunculorum* classem accedit. Magis appositè *Ranunculus* dicitur. Vide Hal-  
lucinationes

lucinationes Caspari Bauh. in Pin. pag.  
234. colum. 2. plant. 6.

⌘ Raphanus sylvestris major flore luteo:  
Folia sunt longa, serrata: aquis innatant. Flore est luteo, sed dum recedunt aquæ, mutant incisuram foliorum; florem fert luteum; (ut ante dictum) siliquas seu potius siliculas fert, aliorum (suæ classis) more.

⌘ Raphanus minimus luteus Nasturtii folio: Hæc planta florem fert Tetrapetalum, luteum; Thecamque seu siliculam, bicapsularem: radicem etiam edit longè latèque repentem, ut Raphanus vulgaris, quin & uda, humidaque amat loca. Quæ omnia Raphani sese declarant speciem: folia autem gerit Nasturtii tenuitèr divisa, seu dissecta, flores satis amplos luteos, pro exiguitate plantæ. Vix palmares aut sesquipalmares edit caules, quorum summis, (post deciduos flores) succedunt siliculæ bicapsulares.

⌘ Rapuntium Soloniense, violaceo Galeato flore: Hæc Rapunculi species, radicem habet, asclepiadis; caules emittit bipedales, quorum summis fastigiis, eorumque



rumque alis, innascuntur flores Galeati, cœrulei: Rapuntii Americani, (quod flos Cardinalis Columnæ dicitur) omnino æmuli. Quibus flaccescentibus, succedunt capsulæ triangulares, (aliorum Rapunculorum more) continentes semina pellucida rufa. Tota planta percalida est, & Masticata linguam, urendo, pungit. Crescit in humidis ericetis & sylvis annosis, passim in agro Soloniensi, alibique in Gallia. Malè à Casparo Bauh. in Pin. pag. 110. collocatur pro draba, flore cœruleo Galeato. Quum nil habet affinitatis, cum siliquosis, cujus draba est species. Rapuntium Galeatum sese declarat, ex succo lacteo emanante ex qualibet parte rupta; adde capsulam seminalem, & semina. Rapunculorum classi accedentia.

⚔ Reseda latifolia, flore flavo: Hæc Resedæ species, folia gerit lata, obscure virentia; caules edit Bipedales, in quorum summis nascuntur flores flavi (aliorum Resedarum more) spicatum dispositi: quibus evanidis succedunt, Thecæ, seminales tricapsulares, ut etiam, reliquis, suæ familias; contingit. ⚔

☞ *Reseda foliis Calcitrapæ, flore albo* :  
 Hæc *Reseda*, folia gerit omnimodè di-  
 visa, quemadmodùm *Reseda vulgaris*;   
 caules edit sesquipedales, in quorum fa-  
 stigiis, nascuntur, flores albi, staminulis  
 multis purpureis donati. Quibus succe-  
 dunt *Thecæ* tricapsulares; seu tribus  
 loculamentis distinctæ; semina multa  
 nigra in se continentes.

☞ *Ricinus minimus* : Omnibus suis par-  
 tibus: cedit, majori & medio, quoad  
 semina, folia & caulium altitudinem.

☞ *Rubeola maritima lutea* : Hæc *Ru-  
 beolæ* species, in ora maritima, *Armori-  
 cæ*. Radice longè latèque repente, re-  
 perire est, passim. Flore donatur luteo  
 minimo (quatuor petalis conflato) flori  
 unicuique, succedunt bina semina testicu-  
 lata, *Rubeolæ* more.

☞ *Rubeola minima alba* : Plantula est  
 in viis aridis, conspectui, satis obvia :  
 flore minimo albo, tetrapetalo aliarum  
 more, foliis spinosis donatur. Florum  
 singulis, succedunt bina semina testicu-  
 lata; cæterarum more,

## S.

⚔ **S**ANICULA montana crenata, umbilico pallido: Species est Saniculæ montanæ Guttatæ, cujus folia sunt oblonga tenuia, ferrata, è quorum medio; foliis crenatis (Rosæ instar) septo: exit cauliculus Dodrantalis, ruber, sustinens plurimos flores albos, (aliarum more) punctatos, umbilico pallido affectos. Quorum singulis cadentibus succedunt filiquæ singulæ bifurcatæ, aliarum Sanicularum, montanarum, & Saxifragæ Chelidonidis more, nam hæc est vera & genuina Saxifraga montana, à flore & capsula seminali, seminibus inibi contentis, datur plantæ jam delineatæ, species minor, quoad folia & caules.

⚔ **S**axifraga aurea Lichenis facie: Hæc Saxifragæ aureæ, species, fati frequenter reperitur in rivulis aquæ dulcis, à fontibus jugibus manantibus. Folia gerit oblonga, ferrata hirta per terram strata. Flosculos in alis, luteos; quin & primo intuitu,

intuitu, à Saxifraga aurea montana rotundifolia, discernitur, à foliorum, densa dispositione, & forma longa, cum alterius, montanæ, sint rotunda & rariora.

⚔ Scabiosa Gramineis foliis glabris: Hæc aded est similis, Scabiosæ: argenteo, folio, quod hæc, folio glabro sit. Altera, folio argenteo, seu, incano prædita. Utraque est Calyce membranaceo, & semine lanuginoso, donata.

⚔ Scabiosa foliis dissectis, flore amplo, Calyce membranaceo, semine lanuginoso: Hæc folia, admodum tenuitèr dissecta, Columbariæ adinstar habet; sed flores gerit amplos, dilutè cœruleos, quorum singulis succedunt, semina lanuginosa, Calyce amplo membranaceo, donata.

⚔ Scabiosa minima, annua, erecta. semine anguloso: Vulgaris instar, hæc Scabiosæ species est. Pedales & sesquipedales profert caules, erectos. Folia, vulgaris quodammodò æmula, sed multò minor. Flores itidem multò minores, carnosos: quin & semina habet, vulgaris ritu, angulosa.



Scorzonera nostras, pulverifera: Hæc  
 in pratis humidis & udis, Italiæ Galliæ  
 & Germaniæ, inter perfectas nostrates  
 provenit, in pratis inquam & sylvis hu-  
 midis; secus fluviorum margines, sitis;  
 à nostrate perfectum florem & semina  
 gerente, in hoc solo, differt, quod in  
 hujus caulium summis, nascitur, globu-  
 lus, Bellidis majoris more, Calyculo in-  
 expanso: in cujus sinu, loco floris con-  
 tinetur pulvis ferrugineus, ad Cynabe-  
 ris colorem, valde accedens. Subtilitate  
 nulli, peritissimi artificis manus indu-  
 stria, factus, secundus. Imò brevi, partim  
 pluviis ingruentibus, partim humidis  
 deciduis (nocte) vaporibus, accedente  
 solis diurno calore, in materiam fæci  
 vini similem, exsiccata, degenerat:  
 Quam Tartarum vini, acetarii, nomi-  
 nant: qua tandem decedente, apparet  
 apex cauliculi, ad modum dentis Leonis  
 (caput Monachi dicti) floribus & pappo  
 suo exutus. Scorzoneram ritè dici ar-  
 guunt partium dispositio & omnimoda  
 cum Germanis seu nostrate conforma-  
 tio, excepto Apice. Pulverifera dicta,

quod loco floris & consequentèr seminum, pulverem ( ferruginei coloris ) in Calyculo caulium, Apici innascenti, gerat. Viget in omnibus pratis humidis Gallix indifferentèr cum nostrate, seu Germanica dicta. Apex autem pulverifer, ab Aprili medio, usque ad idus Maii exactas, perseverat, nec ultra hoc tempus, ipsum conspiciere licet, cum sit tantum vitium naturæ, à Cœlo aut solo proveniens. iisdem viribus, & radix & folia sunt prædita, quibus & nostras perfecta, ut ex radicis, foliorum colore, sapore, succoque lacteo, totiusque plantæ consistentia, colligere licet; idem observare licet in Tragopogo & aliis, ut sæpe nobis fuit obvium, in peregrinationibus nostris Botanicis, serenissimi, principis Gastonis Franciæ, impensis & liberalitate factis.

⚔ Scrophularia foliis & caule hirsutis : Hæc Scrophulariæ species folia habet hirsuta, lanuginosa, Urticæ quasi æmula, quæ & caules producit multò humiliores, vulgaris caulibus; paritèr hirsutos, flores & capsulas bivalves Pyramidales, vulgaris more habet. ⚔

Scutellaria Americana, Malvæ folio :

Planta est emittens folia, quodammodo Malvæ foliorum æmula (quoad figuram) sed majora è quibus profilit caulis, sesquipedalis, rectus, plurimos in fastigio fundens flores verticillatos Galeatos, quibus evanidis succedunt capsulæ, tali instar, qui supponitur, mulierum Calceis, si posteriùs inspiciatur capsula, si autem superiùs consideratur capsula seminalis, Scutellam omninò refert, cavitæ suæ, in superiore parte. Nos hanc exoticam addimus novo generi à nobis designato. Scutellariam appellando ex variis nominibus, ab authoribus Botanicis, variis in locis dispositis : ut cuilibet consideranti, clarissimè apparebit ex doctrina de Hallucinatione Caspari Bauh. in Pin. tam in denominandis quàm digerendis plantis. Nos omnes plantas, capsulas seminales, Scutellatas, ad eundem modum efficientes Scutellatas appellavimus, & Scutellariæ, novum genus creavimus.

Securidaca peregrina : Fortè Paresieux Galicæ id est planta sensibilis pygra



Legumen est, cujus unicuique, foliorum Rachi, seu nervo medio; è regione, plurima adnascuntur folia, dena duodena, uno extremum claudente. Nec siliquam nec semen observavi. In horto Regio Blesensi floruit, sed per rigorem tempestatis, anni periit sine siliqua aut femine. Pigrè seu lentè se movet, tacta.

⚔ Securigida minor lutea, siliquis articulatis: Vide Ornithopodium *suicidator* minus nobis. Scorpioïdes altera Johan. Bauh. in horto Regio Blesensi aucto.

⚔ Sedum longifolium Citrino flore: Hæc sedi species, à sedo longo folio vulgari, solo, floris Citrini colore; differt. Quippe vulgare teritefolio; aureo seu luteo donatur flore, semen & capsula seminalis, hujus & illius, eadem; frequentèr reperitur in rupibus Saxosis, ad dextram Viæ communis, eundo Blesis, in oppidum, pictonum caput; vix milliare, ab oppido distantibus.

⚔ Sedum teretifolium majus flore albo: A præcedenti solo floris colore differt. Circa Rupellam, frequens satè in tectis, & summis murorum, reperitur.



⌘ Senecio Jacobææ folio: Hujus folia omninò sunt Jacobææ, in modum secta, ipsis in omnibus similia, at dum florem edit, Senecionem se prodit, quia Senecio florem fert, multis staminulis luteis conflatum. Sine foliis latis, stellatim aut rotatim, ipsa stamina cingentibus, quod videre est in hujus flore.

⌘ Sideritis glutinosa, bitumen redolens: Hæc Sideritidis species, Dodrantalis est altitudinis, cujus folia, ex adverso sita, sunt hirta, glutinosa Caulibus (binatim) adhærentia, contacta manibus, & naribus admotis: bitumen redolent, flores albos & semina reliquarum Sideritidum modo fert.

⌘ Sinapi filiqua hirsuta, semine rubro: Hæc Sinapi species à vulgari, filiqua hirsuta, semine albo, solo seminum colore differt.

⌘ Sium minimum ferulaceis foliis: Sium hoc ad margines fluviorum, per siccitatem æstatis, exsiccatorum reperitur. Vix palmarem excedit altitudinem: folia gerit ferulacea seu Fœniculacea, crassa biuncialia, aut triuncialia: pediculos

V 3                      parum

parùm aut nihil Palmum superantes, edit. In quorum fastigiis nascuntur flosculi umbellati albi, quorum singulis deciduis succedunt bina semina, minuta, striata, aliarum hujus generis umbellarum more.

☞ Solanum foliis & caule spinosis: Hujus folia sunt lata, angulosa, sinuatave, spinis armata, quemadmodùm etiam caules; spinis armantur, flores fert Solani modo, aut potiùs borraginis, semina nunquam observare licuit quippe perennis est planta, radice per terram longè latèque repentè; dotata. Ideò natura, minùs productioni seminum intenta, quod in pluribus repentibus observavimus.

☞ Solanum foetidum pomo grandibus aculeis donato: At nobis, pomo aculeis crassioribus & longioribus donato: Hæc Solani species, & folia & flores vulgaris foliis & floribus, multò gerit minora, poma autem aculeis, multò crassioribus & longioribus prædita, fert.

☞ Solanum pomiferum fructu rotundo, parvo, molli, rubro, plano: Vulgò pomum

mum amoris hoc, dicitur authoribus.  
Fructu est cerasi instar (quoad magnitudinem) nunc, luteo, nunc, rubro est colore.

⌘ Solanum pomum amoris, fructu, striato molli, aureo: Hujus pomum, seu fructus, solis striis, à molli aureo plano majore differt.

## T.

⌘ **T**ELEPHIUM Portulacæ folio: Hæc Telephii species, sola crassitie, seu spissitudine foliorum, Portulacæ æmulorum, à cæteris suæ classis, faciliè distinguitur.

⌘ Teucrium regium purpureum: Hæc Chamædryos species, multò altior est vulgari, humilior Teucrio frutescenti vulgari: flosculos gerit amplos rubros, Galeatos. Quibus pereuntibus subveniunt semina itidè magna: folia sunt Lucida, obscurèque virentia.



⌘ Thaliætrum pratense maximum, Monspeliensium asperioribus foliis seu : Folio rugoso ; nobis. Hæc Thaliætri species ad ternos quaternos, pedes ascendit. Folia, rugis scatentia, gerit, in superiori, seu prona superficie, dilutiùs virent, quam, pratense vulgare. Muscarium seu Muscosos flores edit luteos, semina rugosa (aliorum more) & striata, (excepto Thaliætro Canadensi, Cornuti : quod semina gerit triangula) omnia Thaliætra habent semina striata.

⌘ Thlaspi Iberidis folio, tenuissimè diviso : Hoc, omninò Thlaspi Iberidis folio accedit ; in omnibus, nisi quod folia habeat, multò tenuius dissecta. Flores & semina, cœterasque partes minores.

⌘ Thlaspi Alyssum minimum : Hæc Thlaspios species, est à flore, semine omnibusque suis partibus à prioribus, (majore & minore videlicet) notu facilis, propter exiguitatem partium.

⌘ Tithymalus Caracias lanuginosus : Hic Tithymalus passim in sylvis Galliæ Soloniensis, provenit, & à foliis lanugine



ne obductis, à cœteris, suæ fortis facillè cognoscitur.

⌘ Tithymalus Caracias radice repenté : Folia gerit oblonga, radicem longè latèque serpentem producit qua nota distinctu est facilis.

⌘ Tithymalus Caracias radice pyriformi : Sola radicum tuberositate pyriformi, dignoscitur inter omnes Tithymalos (Caracias) dictos.

⌘ Tithymalus Caracias, Salicis minoris folio : Hic à similitudine, foliorum Salicis longifoliæ vimineæ, notatu facilimus.

⌘ Tithymalus Linariæ folio, lunato flore : A foliis Linariæ similibus & flore, Lunæ crescentis, referente figuram ; absque longa verborum serie, facillè dignoscitur.

⌘ Thymum Creticum frutescens : Planta, est seu potiùs Suffrutex, sesquipedalis, nudos edens cauliculos, foliolis longis, Satureiæ omninò similibus, onustos, quin & odorem fragantissimum, inter Thymi & Satureiæ, medium, suggerit.

⌘ Tragopogon pratense luteum minus :  
Hæc

Hæc Tragopogi species, sola partium suarum, præcipuè florum & seminum, foliorumque parvitate, à majore differt describitur à Parkinsono, in Theat. Botanico.

☞ Trifolium bitumen redolens majus : Hoc à minore omnibus suis partibus magnitudine solummodò distinguitur, præcipuè florum & seminum.

☞ Trifolium pratense majus album, caulibus fistulosis, foliis subtus punctatis nigris : Hoc Trifolium, in pratis udis & humidis crescit. Cauliculos profert procumbentes cavos seu fistulosos, pedales & sesquipedales, in quorum, summis alis exeunt flores subalbidi, seu Ochroleuco colore præditi. Planta hæc ad extremum pediculorum, producit terna folia subtus maculata, maculis nigris seu fuscis obducta.

☞ Trifolium album, subterraneum, Tricoccon, regium : Hoc Trifolium paritèr in udis & humentibus arvis seu pratis provenit. Ineunte æstate flores fert albos, quorum singulis deciduis succedunt, involucra, reticuli in modum, facta.

Sta. Continentia terna semina, ut plurimum, statim evanescenti flore, in terram descendunt rudimenta seminum, seseque ibidem condunt, inibique perficiuntur, ideò subterraneum nuncupavimus. A trinis seminibus (ut plurimum, nisi Cœlum & solum refragentur) Tricoccon diximus; denique regium addidimus, quoniam, ab ipsa celsitudine ejus regia, aurelianensi duce (ut plurimæ aliæ plantæ hic scriptæ) primò detectum fuit.

☞ Trifolium nodosum capitulis Thymi: Perexigua est hæc species Trifolii sub exitum hyemis: Palmares & sesquipalmares, edens cauliculos per terram stratos, ad quorum singulos nodos, nascuntur flosculi minimi, quibus deciduis, succedunt vascula plurima, simul ad nodos juncta: Thymi capitulis similia.

☞ Trifolium Salmanticensi affine: Hæc Trifolii species, Salmanticensi Clus. ad eò accedit ut idem videatur, nisi quod, (quoad omnes partes) sit minus.

☞ Trifolium vesicarium ampullatum, Rubello flore: In humidis Sabulosis in ora maritima Armoricæ, & prope Rupellam,

pellam, copiosè satis pullulat hæc Trifolii species, vix Dodrantalem excedit altitudinè, imò frequentèr ad palmarem vix pervenit. Flosculos globatim gerit elegantes, dilutè rubri coloris. Quibus evanescentibus, succedunt ampullæ, in modum vesicarum membranacearum; continentès, semina subflava, Trifolii fragiferi instár.

☿ Trifolium cochleatum majus, fructu globoso plano: Fructum fert Cochleatum planum, globuli instar: hoc Trifolium. Et eo nomine à cæteris Cochleatis, perquàm facilitè notu.

☿ Trifolium Cochleatum, spinosum, majus, spinis fursùm & deorsùm tendentibus: Hujus fructus est Cochleatus, Cerasi magnitudine, spinis, fursùm & deorsùm tendentibus atque hac nota, facilitè cognoscitur; est & hujus alia species fructu Cerasi, itidem magnitudine, spinis rectis cujus folia sunt, cordata maculata. Medicæ Arabicæ, Camerarii instár.

☿ Trifolium Cochleatum, spinosum minus, nigrum Ciliare: Hæc Trifolii species,



cies, inter Cochleatas, radice est perenni, longè latèque repente, medicæ saltatæ vulgaris more ; in summis caulium Bipedalium, multa vascula, seu fructus Cochleatos, spinosos congestim fert nigros, Ciliares ( guillandino, satîs appositè, medica Ciliaris dicta ) quia ciliorum pilis nigris, perquàm sunt similia. Unde à radice perenni, repente : Quod solummodò, medicæ marinæ incanæ &, Ciliari huic medicæ guillandini, convenit, inter omnes medicas Cochleatas, facillè cognoscuntur : cæteræ quippe annuæ sunt.

☿ Trifolium Cochleatum spinosum minus *δυσέρπον*, seu *αλυχοέρπον* hæc parva Trifolii species, mille passus à capite Blesensium, prope Cellam, Eremitarum, copiosissimè provenit. Est vix triuncialis, in Aridis illis locis seu collibus Saxosis : fructum fert rotundum, Cochleatum (ad Pisi majoris magnitudinem) spinosum, binatim è nodis Caulium (per terram stratorum) exeuntem.

☿ Trifolium Lagapoïdes, flore pallido luteo : seu Ochroleucon : Hoc in sylvis meridio-

meridionalibus, Blesensibus, sat̃is copiosè provenit. Folia edit terna, incana lanugine obsita : in fastigio caulium erectorum, Dodrantalium, proveniunt, spicæ oblongæ, Lagopi instár : coloris subalbidi seu potiùs (ut cum Clusio lagnar) ex *οχλαεύκω* compositæ. Semina & seminales capsulas aliorum, suæ familias more, producit.

☞ Trifolium Acetosum, Corniculatum Indicum, rectum : Hujus caules eriguntur rectâ & ad pedalem, altitudinem, folia flores & siliquas seu Cornicula fert, repentis lutei minoris, quoad omnes suas partes, multò majora. Nota insuper hoc exoticum esse, cum repens luteum minus passim in Britannica Gallica, seu Armorica provenit.

## V.

⌘ **V**ALERIANELLA nostras, major Scabiosæ semine : Hæc à Valerianella Scabiosæ semine, à doctissimo Fabio columna descripta & picta, sola magnitudine seminum, præcipuè differt : quod, duplò sunt majora, ipsius feminibus, à colum. descripti.

⌘ Valerianella, semine hirsuto, extremo umbilicato : Hæc semina gerit ( quoad formam seu figuram) Uvarum acinis, similia. Sed hirta & ad extremum umbilicata, seu magis cava.

⌘ Valerionella semine hirsuto minore rotundo : Hujus semen est hirsutius, prioris feminibus, valdè caucalis minoris semini (quoad figuram) accedens. Spontè provenit in picardiæ novalibus.

⌘ Valerionellæ vulgaris, species major Serotina, præcox : Vulgari ( dicta lactuca agnina Gerardo) præcocior est ; verna est planta, ineunte vere flores fert, subcoeruleos, semina compressa, tumidiuscula

uscula tamen habet, statimque disparet. At hæc, cum frumento sub finem æstatis, maturescit. Sesquipedalis est planta, erecta, inter sata crescit, flores fert albos. Semina, prioris vulgaris seminibus, duplò majora, & multò crassiora & rotundiora producit. In satis arvis, intra septa Regiæ Chambort & alibi circa Blesas, inter sata reperitur: satis frequentèr.

☞ Verbascum ramosum, floribus albis parvis: Folia gerit quasi Cinere obducta, cauliculos edit Bipedales, & Tripedales ramosos: sustinentes plurimos, flores albos, parvos. Quorum, singulis deciduis, succedunt: Valvulæ bicausulares, mucronatæ, duplici loculamento distinctæ, minuta semina subruta, hinc indè continentes aliorum more.

☞ Verbascum perenne nigrum floribus albis: Hæc Verbasci species folia gerit subviridia, flores gerit, itidem albos, minutos, quibus paritèr, succedunt capsulæ bivalves, minutè, semina minuta (ut cætera suæ familias) in se continentes perennis est planta.



¶ *Verbena Urticæ folio* : Planta est Bipetalis, aliquandò altior, è regione ; ad caulium. Nodos, quadratorum, bina nascuntur folia, mucronata, *Urticæ majoris foliis*, haud absimilia ; sed saturatius virent, quoad flores, & semina, *Verbenæ vulgari*, in omnibus accedit.

¶ *Veronica spicata*, flore purpureo : Hæc à vulgari, flore cœruleo, solo florum colore differt.

¶ *Vicia maxima annua*, foliis serratis : Hæc solis foliorum incisuris, serræ, similibus, à vulgari *Vicia maxima*, annua (perperam, authoribus *Faba Græcorum dicta*) differt, cum hæc capreolis donetur, *Viciam* sese declarat, porrò nec siliquam, nec fructum, *Fabæ*, conformes habet. Judicent lectores attenté. Plura addere non expedit impræsentiarum.

¶ *Vicia præcox verna*, minima *Soloniensis*, semine *Hexedro* : Hæc omnium hujus seriei, est planta minima, sub exitum hyemis, in pratis, contra *Regiam Chambort*, floret. Florem fert dilutè rubentem, siliquam vix pollicarem edit quin & semina angulosa, minuta, *Hexedram*

dram referentia, unde ei nomen à nobis inditum datur & Lathyrus, Gramineis foliis, ejusdem formæ, quasi gerens semina, Hexedram referentia: de quo supra diximus.

☞ Vicia filiquis glabris, flore violaceo: Est Viciæ .s. Craccæ minimæ species, filiquis glabris Joh Bauh.

☞ Viola Granadillæ folio: Hæc Viola exotica, semine & floribus, nostrati vulgari, Martiæ, omninò conformis est similem violaceo colore præditum, fert florem: Sed folia habet lata, sinuosa, in plurimos Lobos profundos divisa Granadillæ seu floris passionis, Granadillæ majoris modo, unde ei nomen; datum.

☞ Virga aurea foliis lævibus, non serratis: Hæc folia gerit læviora longioraque, vulgaris Virgæ aureæ foliis: sed nullam, in margine patiuntur serraturam.

☞ Virga aurea Americana, foliis serratis angustis, subtûs nervosis: Hujus folia sunt subtûs adeò nervosa, & eminentèr angusta, maximèque serrata, quin & radicem habet odoratissimam; hisce notis notu facilis.

⌘ Virga aurea Americana hirsuta, radice odorata, foliis ferratis: Hujus folia superiùs, quasi pube obducuntur, & hac nota cognitu inter cœteras, (junge quod sint multò latiora, multoque profundius ferrata, superioris foliis) facilis est.

⌘ Virga aurea humilis Alpina: Hæc in omnibus vulgari accedit; sola parvitate discrepans, est enim Virga aurea vulgari triplò minor. Cœtera ei par.

⌘ Virga aurea, altera Solidago Saracenica: Foliis minùs spissis, constat, quàm Solidago vulgaris. Ad altitudinem, quatuor plùs minusve pedum, astringit. Frequentèr nobis fuit obvia, in declivibus, Regionis illius Galliæ (Morvan dictæ) inter Burgundiam & Burboniam sita.

⌘ Urtica racemosa Canadensis: Hujus folia sunt multò obscuriùs virentia, quàm Urticæ nostratis majoris: insuper hujus folia non pungunt, quippe non copiosè pube pungente, armantur: in cœteris, ei, semine & floribus par.

X 2

Obfer-

O

B

R

A

M

Abies  
Picea



(325)

Observationes Generaliores  
EX  
Horto REGIO  
B L E S E N S I

*Autho, Collectæ:*

BOTANICÆ  
Rei, studiosis, necessariæ, &  
cognitu perutiles.

---

*Arbores, perpetua fronde, virentes.*

---

*Pomiferæ.*

**M**alus Auran- Malus Limonia.  
tia, Malus Citria.

*Coniferæ & Resiniferæ.*

Abies,  
Picea.

Pinus.  
Pinastr.

X 3

Cedrus

(326)

Cedrus Libani, .f. Coni- Cupressus foemina.  
fera. Cupressus humilis, .f. Ce-  
Cupressus mas. drus Lycea.

*Glandifera.*

Ilex Glandifera. Suber.

*Baccifera.*

Laurus vulgaris. Juniperus.  
Laurus Indica Baptist. Myrtus.  
Ferrarii. Alaternus.  
Laurus tinus ejusque spe- Phillyrea.  
cies. Pyracantha.  
Agrifolium .f. Ilex Bac- Taxus.  
cifera. Hedera arborea.

*Alia varie.*

Cerasus Lauri folio. Buxus.  
Thuya .f. Arbor vitæ. Althæa Syriaca.  
Arbutus.

*Resinifera foliis deciduis.*

Larix. Lentiscus.  
Terebynthus. Styrax.

*Frutices*

*Frutices & subfrutices perpetua fronde  
virentes*

<b>B</b> Arba Jovis.	Chamæcistus.
<b>B</b> Cytisus Maranthæ.	Anonis montana purpu- rea.
Genista Hispanica.	Caryophyllus Creticus.
Genista vulgaris.	Cneorum Matth.
Jasminum lateum	Ruscus.
Rosmarinum.	Hypoglossum .f. Laurus
Rosa sempervirens.	Alexandrina ejusque species.
Sabina.	Hissopus.
Rhus Myrtifolia .	Lavendula.
Althæa arborea Olbia.	Thymum.
Malva Hispanica.	Satureia sempervirens.
Sedum vermiculatum	Pimpinella spinosa .f. Po- terion.
Salvia Verbasco folio & ejus species.	Ruta.
Atriplex Halimus, & Por- tulaca marina.	Clematis Daphnoïdes major & minor.
Chamælea tricoccus.	Abrotanum.
Laureola.	Absynthium.
Erica ejusque species.	Smilax aspera.
Astragalus Baticus.	Stæchas Arabica.
Chamædrys Arborefcens & vulgaris.	Thymelæa.
Colutea ejusque species.	Tragacantha.
Cistus mas.	
Cistus fœmina eorumque species.	

*Herbæ perpetua fronde virentes.*

- |   |  |
|---|--|
| <b>S</b> alvia hortensis ejusque species. | Cochlearia.                              |
| Polium ejusque species.                   | Anagallis aquatica.                      |
| Majorana.                                 | Azarum Canadense.                        |
| Marum Syriacum.                           | Azarum vulgare.                          |
| Marum, Mastic. Gallo-                     | Bellis.                                  |
| rum.                                      | Auricula urfi.                           |
| Hedera terrestris.                        | Primula veris.                           |
| Lamium luteum variegatum.                 | Caryophyllus ejusque species.            |
| Bugula.                                   | Caryophyllus Holosteus tomentosus.       |
| Prunella.                                 | Caryophyllus minor marinus Globosus.     |
| Serpillum.                                | Armerius.                                |
| Ageratum.                                 | Lychnis Cotonaria .s. Coronaria.         |
| Aloë Americana.                           | Sedum vulgare.                           |
| Aloë vulgaris.                            | Sedum Arborescens.                       |
| Yuca.                                     | Sedum Rosaceum serratum ejusque species. |
| Keiri Arabum ejusque species.             | Sedum Vermiculatum ejusque species.      |
| Leucoium marinum incanum ejusque species. | Telephium ejusque species.               |
| Leucoium viridi folio odoratissimum.      | Tithymalus Caracas ejusque species.      |
| Draba repens.                             | Tithymalus Myrsinites .&c. Sani-         |
| Nasturtium aquaticum.                     |  |
| Thlaspi spinosum luteū.                   |  |
| Thlaspi supinum luteum.                   |  |



Sanicula.	Jacea Iusitanica semper-
Psyllium sempervi-	virens.
rens.	Scabiosa Cretica Arbo-
Chamæmelum nobile.	rescens.
Coris cœrulea.	Trifolium hæmorrhoi-
Cymbalaria Italica.	dale.
Eryngium marinum.	Antirrhinum.
Ficus Indica } major.	Champhorata Monspeli-
.f. Opuntia. } minor.	ensium.
Gentianella verna.	Carthamus cœruleus.
Hypericum perfoliatum	Capillares omnes.
& perforatum.	Filices quædam.
Fragaria.	Polypodium.

*Plantæ succum Lactæum fundentes.*

<b>F</b> icus ejusque spe-	Convolvulus ejusq; spe-
cies.	cies.
Nerium .f. Laurus Ro-	Rapunculus ejusque spe-
sea.	cies.
<i>Ha duæ Arbores suc-</i>	Campanula, Trachelium
<i>cum reddunt; hujus</i>	.f. Cervicaria ejusque
<i>viridis illius lacteus,</i>	species.
<i>emanat.</i>	Viola pentagonia, Ono-
Apocynum ejusque spe-	brychis dicta, ejusque
cies.	species.
Asclepias ejusque species.	Cichoreum Intybus seu
	Endivia

Endivia ejusq; species.

Lactuca ejusque species.

Sonchus ejusque species.

Chondrilla ejusque species.

Hieracium ejusq; species.

Pilosella ejusque species.

Dens Leonis ejusq; species.

Tragopogon ejusq; species.

Scorzonera ejusque species.

Carduus Scolymus seu  
Eryngium luteum.

Seseli palustre lactescens.

Thyselium Dod.

*Plurima umbella mon-  
tana, ex radice incisa,*

*succum fundunt lacte-  
um.*

Papaver ejusque species.

Rhæas ejusque species.

Argemone ejusque species,

Titthymalus ejusque species.

Elula & ejus species.

Cataputia, peplus, peplis,  
Chamaesyce.

*Haec duo Planta sequen-  
tes succum fundunt  
rubentem.*

Beta rubra.

Lapathum sanguineum.

Chelidonium majus suc-  
cum reddit aureum.

*Plantæ*

*Plantæ tuberosæ .f. tuberosa radice  
præditæ.*

<b>A</b> NEMONE, omnesque ejus species.		Dens Caninus.
Pulsatilla.		Dentaria.
Ranunculus	Asiaticus.	Fumaria { Canadensis tuberosa : Cornut.
	Illyricus.	
	Montanus.	radice { cava, non cava.
	Grumosus, tuberosus.	
	Chelidonium minus.	Bistorta ejusque species.
Geranium	Asphodeli radice.	Doronicum { radice { Bra-
	Rutæ folio, &c.	
	Triste Cornuti.	chiata.
Coty- ledon	Tuberosum.	Scorpioide.
	Batrachoides.	Chrysanthemum radice { rotunda } vide
Rhodia	Hæmatodes, &c.	ce { oblonga } Battaras.
	radice rotunda.	Aconitum ejusque species & anthora.
Telephium	radice oblonga.	Pimpinella sanguisorba.
	Scrophularia.	Panax Coloni .f. Sideritis strumosa.
Saxifraga alba	Chelidones.	Cariophyllata.
Bulbocastanum.		Tormentilla.
Orchis	Testiculata.	Lathyrus v. Apios { nostras.
	Palmata, diversæ earundem, omnes species.	
		Americana Corn. Sylv. repens Park. Cyclas.

Cyclamen ejusque species.

Arum.

Arisarum.

Dracuntium.

Symphytum tuberosum.

Solanum tuberosum vide Battatas.

Calceolus mariae.

Orobanche seu Rapum

Genistæ & Dentaria.

Tithymalus { Apios.  
Pyriformi-  
radice.

Polygonatum .f. figillum  
Salomonis.

Accorus verus.

Iris tuberosa ejusq; species.

Aristolochia { rotunda.  
longa.

Battatas { Indiæ Occidentalis  
.f. Inhame Orientalis  
lusitanorum,  
species Convolvuli  
lactescens,  
Canadensis, Chrysanthemi species  
Virginiana, Solani  
species.

Bryonia { alba.  
nigra.

Gramen { Nodosum.  
Typhodes seu  
Perlarum ignitar.

Cyperus { edulis Thrafi.  
litoreus inodorus.  
alixque ejus species.

Nymphæa lutea major.

*Planta,*



*Plantæ, Carnosa radice, præditæ:**Coniformes seu Pyramidales.***A** Sphodelus { albus.  
                              luteus.

Alectorolophos alpina.

Rapuntium, Trachelium, Campanula eorumque species.

Napus.

Rapum radice { longa.  
                              rotunda.Raphanus sativus { ruber  
                              niger.

Raphanus rusticanus &amp; sylvestris.

Beta rubra radice Rapæ.

Lapathum ejusque species.

Oxalis ejusque species.

Dens Leonis.

Tragopogon.

Scorzonera.

Centaurium majus ejusque species.

Carlina.

Eryngium.

Fœniculum,

Sisarum.

Ænanthe ejusque species.

Apium ejusque species.

Pastinaca sativa, latifolia.

Pastinaca sativa tenuifolia, Carota.

*Omnes Umbella montana, luteos gerentes flores, radicem habent crassam, carnosam, Coniformem .s. Pyramidalem cum medulla duriore in medietullo: Lactescunt ut plurimum.*Nardus radice { solivari.  
                              oblonga.

Circium ejusque species.

Valeriana.

Filipendula.

Mentha tuberosa.

Pœonia ejusque species.

Mandragora.

Mirabilis peruviana.

*Arbores*

*Arbores Calidæ.*

Ficus.

Nerium.

*Bacciferæ Calidæ.*

Terebinthus.

Mezereon Germanicum.

Lentiscus.

Chamelæa tricoctos.

Laurus domestica.

Thymelæa.

Laureola, sempervirens.

Rhamnus solutivus.

*Coniferæ & Resiniferæ Calidæ.*

Abies.

Thuja .f. Arbor vitæ.

Picea.

Cupressus.

Pinus.

Cedrus Lycia; cupressi  
minor species.

Pinafter.

Cedrus Libani .f. Coni-  
fera.

Juniperus.

Larix.

Sabina.

Styrax seu Storax.

*Subfrutices Calidi.*

Rosa ejusque species.

Asclepias ejusque species.

Apocynum ejusque spe-  
cies.

Clematis ejusque species.

Lupulus.

*Plantæ*

*Plantæ Calidæ.*

**C**onvolvulus ejusq; Melilotus ejusq; species.  
 species.  
 Nasturtium Indicum. Fœnugracum.  
 Glycyrrhiza vulgaris. Iris tuberosa.

*Bulbosæ Calidæ.*

Crocus autumnalis, sal- Hyacinthus.  
 tem ejus stamina. Rapunculus seu Campa-  
 Cepa. nula ejusque species.  
 Allium. Trachelium seu Cervi-  
 Moly. caria ejusque species.  
 Porrum. Gratiola.  
 Scilla. Hypericum.  
 Liliom album. Ruta.  
 Narcissus.

*Siliquosæ tetrapetalæ Calidæ.*

Brassica. Rapum.  
 Sinapi. Rapistrum.  
 Eruca. Raphanus sativus. s. Ra-  
 Nasturtium siliquosum. dicula,  
 Draba siliquosa. Leucoium.  
 Erysimum seu Irio. Hesperis.  
 Napus. Dentaria.

*Siliculosæ*

*Siliculosa tetrapetala Calida.*

Thlaspi.	Rapistrum Monospermon.
Nasturtium siliculosum.	
Bursa pastoris.	Coronopus Ruellii.
Cochlearia.	Veronica ejulq; species.
Iberis.	Polygala.
Lepidium.	Perficaria urens.
Draba siliculosa.	Agrimonia.
Raphanus sylvestris.	<i>Lactescens Cichoracea</i>
Raphanus hortensis seu	<i>&amp; papposa, per se omnes</i>
Rusticanus.	<i>(quippe amara)</i>
Myagrum.	<i>sunt Calida.</i>

*Corymbifera Calida.*

Conyza.	Ptarmica.
Abrotanum.	Ageratum.
Absynthium.	Pimpinella & Agrimonoides Col.
Artemisia.	<i>Umbellifera omnes sunt</i>
Tanacetum.	<i>magis aut minus Calida.</i>
Matricaria.	
Chamæmelum.	
Millefolium.	

*Verticillata Galeata, Calida.*

Mentha.	Marrubium.
Calamintha.	Dictamnus verus.
Clinopodium.	Pseudodictamnus.
Pulegium.	Betonica.
	Stachys.



Stachys.	Chamædrys.
Sideritis.	Chamæpitys.
Lamium.	Rosmarinum.
Melissa.	Hyssopus.
Tragoriganum.	Lavendula.
Origanum.	Stachas.
Salvia.	Majorana.
Horminum.	Thymum.
Acinos.	Serpillum.
Melissa peregrina.	Satureia.
Polium.	Ocimum.

*Calidæ variarum classium.*

Centaurium minus.	Arisarum.
Pulsatilla.	Dracunculus major.
Anemone ejusque species.	Capficum ejusq; species.
Ranunculi omnes, exceptis Perpaucis.	Tithymali omnes, Esulæ & Cataputia.
Arum.	Sedum vermiculatum acre.

*Purgantes*

*Purgantes omnes sunt Calidæ: vide  
infra Purgantes.*

*Plantæ Frigidæ:*

*Pomifera Scandentes.*

<b>M</b> <sup>ELO:</sup>	<i>dens sunt Frigida;</i>
Cucurbita.	<i>dum succo alimentitio</i>
Pepo.	<i>abundant: at quatenus</i>
Citrullus .f. Anguria.	<i>amara Calefaciunt, &amp;</i>
Cucumis.	<i>apperiunt.</i>
<i>Dum succo alimentitio</i>	Acanthus.
<i>abundant, refrigerant,</i>	Plantago.
<i>at semina (quippe oleo</i>	Holosteum.
<i>abundant) exsiccata,</i>	Coronopus, species Plan-
<i>calefaciunt: Contra</i>	taginis.
<i>commune Dogma.</i>	Pfyllium.
Beta.	Viola.
Blitum.	Malva.
Mercurialis.	Althæa.
Spinachia.	Mercurialis.
Lapathum.	Mandragora.
Acetosa.	Hyoscyamus,
Bistorta.	Portulaca.
<i>Lactescentes Cichoracea</i>	<i>Sedum ejusque species</i>
<i>&amp; papposa per acci-</i>	<i>omnes, præter acre.</i>
	Telephium

Telephium.

Cotyledon.

Saxifraga { Chelidonides

Aurea.

anacula.

Papaver ejusque species,

per accidens dum succo  
alimentitio abundant;  
ut & Cichoracea &  
papposa lactescentes re-  
frigerant: de quibus ali-  
bi prolixius discutietur.

Arbores, frutices, subfrutices, &amp;

Plantæ purgantes.

Orbus, ornus dicta, ex

qua manna elicitur.

amarindus.

Cassia solutiva.

Hamnus Catharticus.

Malus Persica ejus flos.

enna.

enista.

Rose { pallida } utrius-  
          { alba Mos. } que  
          { chata } flos.

Laureola.

Mezereon Germanicum.

Chamaeæa Tricoccus.

Tarton Rare.

Alypum montis Cete.

Plantæ purgantes succo.

loë vera.

Convolvulus ejusq; spe-

cies (per excellentiam

scammonia Syriaca s.

Antiochana est hujus

species; ex qua fit di-

agredinum.

Cucumis Asininus ex quo

extrahitur elaterium.

Tithymalus, Esula &amp; Ca-

taputia: quorum suc-

co lacteo, adulteratur

diagredinum.

Y 2

Purgantes,

*Purgantes Radice.*

Filix foemina. *thum, Rhabarbarum*  
 Polypodium. *est praestantissimum.*  
 Lappathum ejusq; species: Helleborus niger & al-  
*per excellentiam Lapa-* bus.

*Purgantes, aut vomitum cientes foliorum*  
*infusione, aut decoctione.*

Sedum vermiculatum, Centaurium minus.  
 Narcissus. Linum Catharticum.  
 Gratiola. Cnicus s. Carthamus,  
 Brassica rubra, crispa. *semine purgat.*

*Planta Venenata.*

**N**erium.  
 Apocynum.  
 Asclepias.  
 Lolium.  
 Colchicum.  
 Cicut.  
 Pyrethrum.  
 Solanum lethale.  
 Aconitum.  
 Fungi lethales.

*Planta*



*Plantæ Vulnerariæ.*

<b>P</b> impinella.	Polygonatum.
Apium.	Alchimilla.
Cicuta.	Sanicula.
Marrubium.	Caryophyllata.
Betonica.	Plantago.
Stachys.	Psyllium.
Syderitis.	Aristolochia.
Salvia.	Cynoglossum.
Horminum.	Symphytum.
Hedera terrestris.	Pulmonaria.
Chamædrys.	Nicotiana.
Chamæpitys.	Crassula seu Telephium.
Bugula, Brunella.	Sedum.
Bellis.	Scabiosa.
Millefolium.	Consolida regalis.
Verbena.	Virga Aurea, Doria, &
Polygonum.	Solidago Saracenica.

*Plantæ Culinariæ.*

*Legumina, fructus horum inserviunt Culinæ.*

<b>P</b> haseolus.	Faba.
Pisum.	Lupinus.
Lathyrus.	Glycyrrhiza. Hujus ra-
Ochrus.	dix expeditur in Culi-
Lens.	na & Pharmacia.

## Plantæ Culinariæ.

*Cærealea, horum grana inserviunt Culinae.*

Triticum.

Secale.

Hordeum.

Oriza.

Avena.

Panicum.

Milium.

Panicum Indicum, Maiz dictum.

## Plantæ Culinariæ.

*Bulbi & folia, harum inserviunt Culinae, & Pharmacia:*

Cepa.

Allium.

Moly.

Porrum.

Scilla.

## Plantæ Culinariæ.

*Radices harum inserviunt Culinae.*Rapuuculus seu Campa-  
nula.

Napus.

Rapum.

Rapha- nus	{	Sativus. s. Ra-
		dicula.
		Niger Icon. Lob.

Raphanus rusticanus.

Beta rubra Romana, seu  
Rad. Rapæ.

Trogo-pogon.

Scorzonera.

Chrysanthemum tubero-  
sum, vide Battatas de  
Cannada.Solanum Esculentum, vi-  
de Battatas de Virgi-  
nea.Convólulus, Indiæ Oc-  
cidentalis Inbame, vi-  
de Battatas supra.

Sifarum.

Sisarum.

Carota.

Pastinaca latifolia.

Apium seu Petroselinum.

Pastinaca tenuifolia seu num.

*Plantæ quarum folia inserviunt Culinæ,  
cocta.*

Brassica &amp; ejusque species.

Calendula, hujus etiam flores.

Thlaspi Holeraceum.

Urtica minor &amp; major.

Nasturtium hortense.

Apium ejusque species.

Eruca sativa.

Cerefolium.

Beta vulgaris sativa.

Myrrhis odorata.

Bonus Hendricus.

Tanacetum.

Spinachia.

Mentha.

Lapathum.

Majorana.

Acetosa.

Rosmarinum.

Lactuca ejusque species.

Thymum.

Cichoreum, Intybus seu

Satureia.

Endivia.

Boerago.

Tragopogon.

Buglossum.

Scorzonera.

Portulaca.

*Plantæ quarum folia usurpantur in  
Acetariis.*

Lactuca.

Brassica minor (Brocoli  
Italica) dicta.

Acetosa.

Cichoreum.

Valerianella seu Lactuca  
agnina.

Pimpinella spicata minor.

Viola pentagonia.

Y 4

Coronopus.

Coronopus hortensis.

Sedum vermiculatum inspidum, ejusq; species.

Nasturtium } hortense.  
                  } aquaticum.

Ptermica .f. Dracunculus hortens. Astragon didus.

Cereseolum.

Myrrhis nova æquicolum & odorata.

Apium.

Cinera aculeata Hispanica.

Apium Italicum seu Seleri.

Lactuca Romana.

Cichoreum crispum.

Harum quatuor folia & costæ seu Nervi medii, dealbata, evadunt te-

nera.

Chritum } Umbelliferum.  
            } Chrysanthemum.

Folia utriusque sale, & aceto condita, Mense inserviunt, hyeme pro acetario: quemadmodum,

Flores inexpandi Capparis, Genista, & Nasturtii Indici, eodem modo sale, & aceto Macerati hyemalibus Embammatis inserviunt ut & fungi Esculentii.

Cucumis, hujus fructus, rudimenta: sale, aceto & semine Anethi, condiantur & Mense inserviuntur.

### Plantæ Culinariæ.

Quarum semina Culina inserviunt.

Sinapi.

Eruca.

Feniculum.

Cuminum.

Carui.

Anisum.

Coriandrum.

Anethum.

Plantæ.



## Plantæ Culinariæ.

*Harum Turiones inserviunt Culina.*

Asparagus.

Lupulus.

Sambucus.

Capficum, hujus filiquarum aut capsularum pellicula, loco Piperis in Gallaprovincia, Gallia Narbonensi, aliisq; locis, inserviunt Culi-

na. Quin & in Africa aceto, sale & Saccharo condiuntur, & ab incolis avidè expetuntur pro Cordiali optimo.

Cinera sativæ, capita hujus, Culina inserviunt.

## Plantæ Culinariæ.

*Harum Fructus pulposi inserviunt Culinae,  
Menseve.*

**M**<sup>ELO.</sup>  
Pepo,  
Cucumis.

Citrullus seu Anguria.  
Cucurbita.

Arbores

*Arbores Pomiferæ, quarum Fructus in-*  
*serviunt Culina, Mensæve.*

**M**ALUS ejusq; va-  
 riæ species.

Pyrus ejusque diversæ  
 species.

Malus { Aurantia.  
 Limonia.  
 Citria.

Malus { Cydonia,  
 Punica,

Sorbus.

Ficus.

Mespilus.

Morus.

*Arbores, Osseam nucem, carne obductam,*  
*habentes; quarum Fructus exterior*  
*& interior inserviunt Mensæ.*

Malus { Persica ejusque di-  
 versæ species.  
 Armeniaca.

Prunus & ejus variæ spe-  
 cies.

Cerasus ejusque variæ  
 species.

Olea.

Palma.

*Arbores Nucifera, harum fructus interior,*  
*inservit Mensæ seu Culina.*

Amygdalus.  
 Nux juglans.

Corylus.  
 Castanea.

*Arbores*

*Arbores seu potius Frutices, quorum Fructus  
inerviunt Culinae, Mensæve.*

Berberis.

Labrusca.

Vitis vinifera.

Rubus Idæus.

Rubus.

Ribes.

Uva crispa.

Myrtillus Germanorum.


Fragaria, *hujus planta.*

*fraga, inerviunt Men-  
sæ.*

---

*FINIS.*

---





Hallucinationes  
**CASPARI BAUHINI**  
I N  
**PINACE,**

Tam in digerendis,  
*Quam denominandis Plantis:*

I T E M  
Animadversiones, in tres Tomos, universalis  
Historiz, Plantarum;

**JOHANNIS BAUHINI.**

Quibus accessit  
Dialogus inter Socium Collegii REGII  
LONDINENSIS, Gresham dicti, & Botanographum  
REGIUM.

---

*Præcludiorum Botanicorum pars altera.*

---

AUTHORE  
**ROBERTO MORISON** Medico & Pro-  
fessore Botanico, serenissimo CAROLO secundo, magnæ  
Britanniæ, &c. REGI.

---

*Doctis ( in Arte ) scribo:  
Indoctos docebo.*

THE NEW YORK

# PIRACE

OF THE

AMERICAN

NAVY

IN THE

YEAR

1812

BY



SERENISSIMO  
ET  
CELSISSIMO PRINCIPI,  
DOMINO

JACOBO

Eboracensi & Albanensi, &c.

DUCI.

Serenissime PRINCEPS :

**E**A Medicinæ parte ( quam  
Botanicen, seu vegetabilium  
Scientiam appellamus ) nul-  
lam jucundiorē aut delectabiliorem ,  
unquam judicavit serenissimus vester A-  
\* Y vunculus,

vunculus, Gaston. Franciæ, Dux Au-  
relianensis in Arte, aut (si mavis) Sci-  
entia Botanica, versatissimus Princeps.  
Ille enim ab adolescentia ad ultimum  
Spiritus halitum; Scientiam hanc Bo-  
tanicam, rite coluit amavitque. Quin  
& affirmare audacter audeo; (noli  
credere me Celsitudinis vestræ Regiæ au-  
ribus dare) post Salomonem, in re Bo-  
tanica, oculatiorem ipso principem; orbem  
nunquam tulisse. Hortum suum Regium  
Blesensem; omnium hortorum, qui un-  
quam in Europa extitere, plantis omnis  
generis refertissimum: moriens reliquit.  
Atque vivus & valens, lapsus seu hal-  
lucinationes Cæsperi Bauhini, Cory-  
phæi omnium Botanicorum, ante se  
scribentium; observare in votis habuit.  
Nobisque in mandatis, per aliquot annos,  
Blesis



Bleſis commorantibus dedit. Quod faci-  
endum in nos ſuſcepimus; non minore  
ardore, quam ſi ipſe in vivis fuiſſet. Et  
jam tandem, partim ſub ipſius Auſpiciis  
ante obitum, partim ſub ſereniſſimi Domi-  
ni, Domini noſtri, Regis Auſpiciis: ut  
Beatæ memoriæ Principis & Domini mei  
quondam, (nunquam ſatis mihi deplo-  
randi) votum perſolveremus, eaſdem Caſ-  
pari Bauhini, in Pinace hallucinationes,  
tam in digerendis quam denominandis  
plantis in lucem dedimus. Item alterius  
ſeu ſecundi, omnium Botanicorum Co-  
ryphæi, Johannis Baukini, Caſpari  
Fratri: animadverſiones pariter, in tres  
Tomos, hiftoriæ ſuæ univerſalis; Typis  
commiſimus. Tenuem hunc noſtrum la-  
borem, Celſitudini veſtræ Regiæ, inſcribere  
& dicare: (quippe quod votum ſereniſ-  
ſimi

simi Principis Avunculi vestri fuerit) non  
tenuem puto esse gloriam. Dum duorum  
Fratrum Caspari & Johannis Bauhi-  
ni, hallucinationes seu lapsus observo. Eo  
magis aliquid, Celsitudini vestræ Regiæ  
(pro Patrocinio vestro) Encomii adve-  
nire putarem: quod ambo, omnium Bo-  
tanitorum, quotquot unquam extitere;  
(absque controversia) vere Coryphæi  
fuere. Uterque docte, concinne & valde  
laboriose scripsit. Casparus Bauhinus,  
Pinacem suam, opus fuisse quadraginta  
annorum asserit. Johannes Bauhinus  
in compilandis tribus Tomis, historiæ suæ  
universalis; quinquaginta annos, sese  
insumpsisse affirmat. Accipe igitur (se-  
renissime PRINCEPS) benigne, hos  
nostros labores per aliquot annos exantla-  
tos. Et favore tuo nos intueri dignare:  
Et

*Et ad majora, & ab omnibus hujus Artis  
maximopere desiderata, audenda, nos in-  
citabis, inque æternum tibi devincies.*

Serenissime Princeps

Vestrum devotissimum

&

Obsequentissimum Clientem.

ROB. MORISON.

P

C

rum  
lucim  
in sig  
i me  
serio  
in Ba  
no pen  
plant  
dreg  
trata  
fus a  
ovad  
Cep  
rypha  
linum





# PRÆFATIO

A D

Lectorem Botanicum.

**Q**Uorundam Botanicorum votis  
satisfacere cupiens, præludia Bo-  
tanica typis committere, animum  
induxi tandem meum. Cum jam  
præludiorum meorum Botanico-  
rum, pars prior, penitus prelo excesserit. Hal-  
lucinationes Caspari Bauhini in Pinace, tam  
in digerendis, quàm denominandis plantis;  
à me observatas, habes. Item animadversio-  
nes in tres tomos, historiae universalis Johan-  
nis Bauhini offero. Easque publici juris facio;  
ut penes quos est ejusdem Johannis Bauhini,  
plantarum historia universalis, tribus tomis  
digesta: ad manum paritèr haberent, ipsius  
errata. Noli quæso (amice lector) me glorio-  
sum aut insolentem existimare scriptorem:  
quod non solum hujus sæculi, sed omnium  
(quotquot adhuc extitère) Botanicorum; Co-  
ryphæos duos, Casparum & Johannem Bau-  
hinum Fratres, corrigo. Ex frequenti enim  
ipsorum

## PRÆFATIO.

*ipforum voluminum inspectione, & ex longâ  
& diutinâ eorundem examinatione. Ipsos,  
summi iudicii, indefessi laboris, & incompara-  
bilis doctrinæ (in Scientiâ Botanicâ) ho-  
mines fuisse observo: ipsosque seu fato, seu  
naturalî propensione; maximum in promo-  
vendis studiis Botanicorum, habuisse deside-  
rium; paritèr declaro. Errâsse tamen mul-  
totiès utrumque, nemo (in re Botanicâ, me-  
diorcitèr versatus) inficias ibit; hos meos  
tractatulos legendo. Labi nihilominùs, hu-  
manum esse confiteor; homo sum ipse, huma-  
ni à me nihil alienum puto; in hisce meis  
tractatulis, hallucinatum me esse non dubito.  
Quapropter hallucinationes meas, ab amico  
lectore, notari desidero. Quin & paritèr  
observabit lector, me hæc concinâsse, tam ut  
voto meo prædicto satisfaceret, quàm ut pub-  
licis inservirem commodis. Et quam ego de  
Fatribus Bauhinis Coryphæis; eandem  
de me existimationem habeat lector, velim.  
Vale,*

( Amice Lector )

Tuus humillimus

servus & ad omnia paratus,

*Rob. Morison M. & P.B.R.*



Hallucinationes

CASPARI BAUHINI

IN

PINACE,

Tam in digerendis,

*Quam denominandis Plantis.*

Pag. 27



Sesamum & Erysimum cœ-  
reale, malè inter cœrealia  
propriè dicta, ob usum  
collocantur post Lapa-  
thum, Acetosam, Bistortam, quippe se-  
mine triangulari præditum Erysimum cœ-  
reale, collocari debet. Ad siliquosas Hete-  
roclitas seu impropriè dictas, transmittatur  
Sesamum.

Pag.

*Pag. 34. Column. I.* Acorus adulterinus, malè à Bauhino, cum Acoro julifero seu véro, collocatur, cum adulterinus, Iridis florem gerit; ad Iridum latifoliarum classẽ, cum Ger. & Eyst. relegandus, ut rationi consentaneum videtur.

*Pag. 40. Col. II.* Iris tuberosa amandetur ad Iridum tuberosarum classẽ, nec aptè collocatur inter Iridem bulbosam & Sycyrinchium.

*Pag. 47. Col. II. Plant. III.* Hyacinthus Indicus tuberosa radice, malè inter bulbosas propriè dictas collocatur.

*Pag. 80.* Lilium Asphodeli radice, aptiùs (mea opinione) cum Asphodelo & Phalangio, pag. 28, vel 29. collocaretur.

*Pag. 89.* Bauhin. collocat Rapum, & pagina 95. collocat Rapistrum Napum, & interjicit pag. 92, 93, 94. Campanulatas, Rapunculos scilicet, & Campanulas, Tracheliumve; filiquosas à filiquosis disjungit, quod non est faciendum. Insuper Rapistri filiquæ sunt crassæ fungosæ, articulatae, ideò aptiùs post Raphanum sativum; vel radiculam, collocaretur Rapistrum.

*Pag. 91. Col. I. Pl. VIII.* Batatas Camotes  
Hispanorum



Hispanorum Clus. hist. est verus & genuinus Convolvulus, quare malè cum Aloë inter filiquosas collocatur, quamvis radices illius sunt edules. De his quæ vidi & colui, iudicium fero, de aliis exoticis in illo capite, mihi nunquam visis: nihil dico.

Pag. 92. Col. I. Plant. XIII. Campanula lutea Linifolia Ger. repetitur p. 214. col. I. pl. IX. sub Campanula lutea Linifolia Adv. Lob. Linum sylvestre luteum foliis subrotundis C. B. Pin. cujus vera est species & flore & semine; Campanula autem non est, quia nec lactescit nec semen minimum Lucidum (aliarum Campanularum more) fert.

Pag. 94. Col. II. Pl. X. Campanula foliis Echii C. B. Pin. & Trachelium *θυρασσις* Clus. ipsi Cam. & pag. 254. col. II. pl. VII. Echium Alpinum luteum C. B. Pin. Trachelium *θυρασσις* Clus. Trachelium seu Campanula est, quippe lactescit non autem Echium; bis tamen repetitur.

Pag. 95. Col. II. Pl. V. Rapistrum Italicum filiquis longissimis C. B. Pin. sylvestre Irionis folio Col. Idem repetitur pag. 101. col. II. pl. V. Erysimum angustifolium majus C. B. Pin. Rapistrum sylvestre Irionis folio Col.

Z

Pag.

*Pag. 95. Col. I. Pl. I.* Rapiſtrum flore luteo C. B. Pin. eſt vera Sinapi ſpecies, (Rapiſtrum eſt ut plurimum filiqua articulata) ergò ad filiquoſas Tetrapetalas, Sinapi. Erucam, Naſturtium, Drabam cum reliquis ſequentibus, amandetur. Rapiſtrum Monospermum cum non ſit filiquoſa Tetrapetala planta; ſed, ſiliculofa, ad calcem ſiliculofarum, debet referri.

*Pag. 96. Col. II Pl. V. & pag. 97.* Raphanus ruſticanus & aquatici duo, non debent collocari inter Raphanos. Cum ſiliquas Raphani ſativi, ſeu radiculae non ferant, ſed capſulas binas ſiliculaſve Lepidii aut Iberidis inſtár.

*Pag. 97. Col. I. Pl. III.* Dentillaria (mea opinione) non ad Lepidium referri debet, cum nec florem nec capſulam ſeminalem, conformem Lepidii capſulis, aut ſiliculis habeat.

*Ibidem* Lepidium & Iberis malè collocantur inter ſiliquoſas cum capſulares ſeu ſiliculofae ſint, debent ad calcem Thlaſpíos transferri.

*Pag. 98.* Dracunculus, ejuſque ſpecies; malè collocantur inter capſulares & ſiliquoſas

quosas à C. B. in Pin. quare ad Corymbosas  
 .i. Corymbiferas, veluti ageratum, Millefo-  
 lium & hujusmodi affines; relegendur Dra-  
 cunculus hortensis, & Ptarmicæ.

Pag. 99. Col. I. Pl. X. *Eruca maritima* I-  
 talica, siliqua hastæ cuspidi simili C. B.  
 Prodr. *Cakile Serapionis* Lob. duæ plantæ  
 diversæ, quoad semina confunduntur à Bau-  
 hino, una semen fert planum; altera, cuspidi  
 hastæ simile: ut clarè videre licet figuram  
 in Prodr. à Bauhino exhibitam, eamque si  
 quis cum Lobelii figura in Iconibus com-  
 paret.

Pag. 100. *Reseda* & *lateola* cum non  
 sint *Tetrapetalæ* siliquosæ, malè disponun-  
 tur inter *Erucam* & *Erysimum*, *Tetrapeta-  
 las* siliquosas.

Pag. 101. Col. II. Pl. V. *Erysimum angusti-  
 folium* majus C. B. Pin. *Rapistrum sylvestre*  
*Irionis* folio Col. Bis repetitur, nempe suprâ  
 pag 95. col. II. pl. V. & hic p. 101. col. II. pl. V.

Pag. 101. *Perficaria* seu *Hydropiper*  
 malè inter *Tetrapetalas* siliquosas colloca-  
 tur cum sit semine triangulari prædita, ad  
*Lapathum*, *Bistortam*, *Polygonum*, aliasque  
 (ejus generis) referri debet.

*Pag. 102.* Piper Indicum cum non sit planta Tetrapetala filiquosa, malè hic collocatur à Bauhino, potiùs ad Solanum referatur; cujus, est species à flore & semine, feminisque Thecis, seu involucris. Si obijciatur qualitas Urens; quæ non reperitur in ulla Solani specie, facilè respondetur Ranunculos quosdam, esse inspidos seu dulces; quamvis maxima eorum pars, sit caustica præditâ facultate.

*Pag. 103.* Nasturtium hortense latifolium & crispum malè illic disponuntur, cum non sint filiquosæ, ut cœteræ illius sectionis, sed filiculosæ, ergò ad filiculosarum classẽ amendantur.

*Pag. 104. Col. II.* Nasturtium Petreum folio bursæ pastoris; item Nasturtium pumilum vernum; Nasturtium Alpinum capsula Nasturtii hortensis; & Nasturtium Oxyridis folio, cum sint filiculosæ plantæ, ad Thlaspios, Drabæ, Cochleariæ Bursæ pastoris calcem, aut classẽ, referantur; non autem confundendæ cum filiquosis.

*Pag. 106. Col. II. Pl. V.* Thlaspi umbellatum Nasturtii folio Monspeliacum C. B. Pin. Narbonense umbellatum Tab. Ger. eadem planta



planta repetitur pag. 107. col. II. plant. III.  
*Thlaspi Alyssum dictum maritimum C. B.*  
*Pin. Umbellatum Narbonense Ger.*

*Pag. 108, & 109.* *Bursæ pastoris*, similis  
 filiquosa major & minor, non debent inter  
*Bursæ pastoris* species recenserì cum non  
 sint filiculosæ: amendantur ad filiquosas.  
 Ibidem *Myagrûm* filiqua longa, ad filiquo-  
 sas referatur cum Gerardo: dicatur *Eruca*  
*sylvestris angustifolia.*

*Pag. 109.* *Drabæ filiculosæ* ad filiculo-  
 sas & *Tetrapetalas* plantas: filiquosæ ad  
 filiquosas referantur, ut Tollatur confusio  
 generum.

*Pag. 110. Col. II Pl. VIII.* *Draba* flore  
 cœruleo Galeato, malè denominatur *Dra-*  
*ba à Bauhino*, cum nec sit planta *Tetrape-*  
*tala*, filiquosa, nec filiculosa. *Rapunculi*  
 species est; Galeato flore violaceo: quem-  
 admodùm flos *Cardinalis colum.* est Galea-  
 to Coccineo flore. Vide *Rapuntium Urens*  
*Solonienſe* in horto Regio Blesensì aucto,  
 & inter plantas non scriptas à me exhibitas.

*Pag. 110.* *Alliaria* malè inter *Drabam*  
 & *Cochleariam* collocatur: ad filiquosas  
 nempe *Hesperides* seu violam *Matronalem*  
 referatur.

*Pag. 113.* Isatis malè illic collocatur, inter Tetrapetalas siliquosas, & multò ineptius, Anil ob usum colorandi, cum sit perfectè planta leguminosa.

*Pag. 114, & 115.* Spinachia malè pro genuino Lapatho recensetur cum non habeat semina triquetra, Lapathi instar, subjungì debet Lapatho, quemadmodum bonus Hendricus.

*Pag. 116. Col. 1. Pl. V.* Graviter Hallucinaturn fuisse C. Bauhinum in Pinace conjicio, dum inter Lapatha collocat Apocynum Syriacum, seu Bedelzar Arabum, cum ne vel notulam Lapathorum generi communem, habeat: sed Apocynum à lacte (dum rumpitur) manante, siliquisque Sericea lanugine, refertis, seminibusque. Apocynum sese prodit, vel Medriocritè in arte Botanica versato; ad Apocyni classẽ, referri debere apparet. Hujus, lanugine Sericea, Togæ cubiculares pretiosiores apud Turcas componebantur calidæ & læves, quæ ab aliquot annis non pretiosa illa intertextura quæ Gallicè dicebatur Wat. ex seminalibus hujus Bedelzar involucris, præparata; sed Gossipio seu Xylo ex Americæ insulis

insulis adjacentibus: nunc communiter fiunt. Prædictæ Togæ cubiculares & vili pretio vaneunt.

*Pag. 117. Col. II. Pl. V.* Rhaponticum folio Helenii incano, malè hic disponitur cum Rhabarbaro (quod per excellentiam Lapathum est,) ergo reddi debet ad calcem plantarum capitatarum (quarum flores abeunt in pappos) ut sunt jacea Stœbe Cyanus, &c. Ibidem idem dicendum de Centaurio majore, ejusque speciebus quæ omnes debent amandari ad classẽ antedictam. Observa insuper Rhabarbarum esse per excellentiam optimum Lapathorum: à semine triangulari Lapathi simili.

*Pag. 123. Col. II. Pl. III, & IV.* Lactuca montana purpureo-ærulea, major & minor, malè inter Lactucas collocantur, cum & semen & conformationem partium, cum Soncho habent.

*Pag. 124.* Lamprolana non est tam Soncho affinis quam Cichoreo: quippe ut Cichoreum semina solida, angulosa, non autem in pappos abeuntia (ut Sonchus) producit, Ergo magis appositè dixisset C. Bauhinus Cichoreo affinis Lamprolana domestica.

Pag. 122, & 131. Jacobæa & Senecio cum sunt stellatæ & pappescentes debent ad stellatas & pappescentes, Asterem, Conyzam, Doronicum, Helenium, &c. Non autem jungi cum lactescentibus, papposis.

Pag. 126. Col. II. Pl. I. Hieracium majus folio Sonchi, vel Hieracium Sonchites potius Sonchus dici debet quam Hieracium, nam Sonchus est ut plurimum altior, caulis fistulosior folia læviora, flos ejus Hieracii flore citius evanescit: per terram (aliorum Sonchorum more) ejus radix repit.

Pag. 126. Col. I. Pl. I, II, III. Cichoreum sylvestre luteum & quæ sequuntur sunt Hieracia, quia pappescunt.

Pag. 127. Hieracia quatuor priora primæ Col. sunt verè Sonchi à semine & tota facie & modo crescendi.

Pag. 228. Col. I. Pl. I & II. Hieracium semine adunco C. Bauh. Hieracium falcatum col. I. pl. II. & Hieracium minimum nonum Clus. pag. 127. col. II. pl. VIII. & quæcunque alia reperiuntur Hieracia, quorum flores non abeunt in pappos, ut horum trium ad Cichoreum reducantur quia Cichoreum, à lactescentibus papposis hac sola nota dif-

fert.



fert. Quod ejus flos non abit in pappos idem esto judicium de Chondrilla verrucaria seu Zazinth pag. 130. col. I. pl. IX. cum non pappefcit : non est Chondrilla. Sic cum Clusio Cichoreum verrucarium idem dicendum de Lampsana, quæ est magis affinis Cichoreo, quam Soncho : propter semen Solidum angulosum, Cichorei semini, simile.

*Pag. 130. Chondrilla Verrucaria ad Cichoreum mandetur ; propter prædictam rationem & jungatur prædictis Hieraciis. Eaque appellando sic ; Cichoreum falcatum, Cichoreum semine adunco ; Cichoreum minimum, caule ad florem tubuloso, mutato nomine Hieracii, in Cichoreum ut diximus antè.*

*Pag. 130. Col. II. Pl VI. Chondrilla cœrulea Cyani capitulo: cum hujus semen non abit in pappos non est Chondrilla, ergò ad Cichoreum cum prædictis reducendum judicarem ; cum Lacteseit, nec flos ejus abit in pappos, nec potest esse Cyanus, nec Chondrilla ut clariùs deducemus in Tabulis affinitatis nostris.*

*Pag.*

*Pag. 130. Col. II. Pl. III.* Chondrilla rara purpurea cum non Lactescit per antedictam rationem, nec pappescit, non debet admitti pro Chondrilla. Ad Centaurium capitatum reducerem, & Centaurium capitatum ciliare annuum foliis laciniatis seratis appellari velim.

*Pag. 131. Col. I. Pl. III.* Senecio pinguis incanus; Jacobææ est species, cum Jacobææ more, florem gerit stellatum multis petalis latis, discum luteum ex multis staminulis conflatum, cingentibus. Nota insuper hac *p. 131.* malè collocari (ut alibi diximus) Jacobæam & Senecionem cum lactescentibus papposis, cum ad pappescentes non lactescentes pertineant: cumque eis collocari debent.

*Pag. 132. Col. II. Pl. I, & II.* Tanacetum montanum inodorum flore majore & minore. Sunt Bellidis Leucanthemæ species: nec cum Tanaceto aliquid habent affinitatis nisi in dispositione foliorum: ergò alibi aptiùs disponi poterant, sub nomine Bellidis Tanaceti folio: Desumendo nomen à potiore & nobiliore parte, flore scilicet, seu modo florendi.

*Pag.*

*Pag. 128. Col. I.* Ambrosia Campestris repens, Coronopus Ruellii: Malè cum Ambrosia odorata collocatur, cum sit planta Tetrapetala filiculosa, subjungi debet filiculosis Drabæ, Cochleariæ, Thlaspi, Veronicæ, &c.

*Pag. 138 Colum. II. Pl. III.* Botrys Chamædryoides malè ad Botryos classem à Bauhino reducitur, cum sit ex flore & semine seminumque capsulis, Chamædrys: ad hujus classem (cum Mattheolo) redigo. Nota quod Botrys Ambrosioides appositè quadrat; cum Atriplice, quoad dispositionem florum & seminum, & si Atriplex odora diceretur per me non stabit. Quemadmodum fecimus nos in dispositione Atriplicis in Tabulis cognationis nostris.

*Pag. 141. Col. II. Pl. IV.* Millefolium aquaticum foliis Abrotoni, Ranunculi flore & capitulo C. B. Pin. Ranunculus Tricophyllon aquaticus medio-luteus Col. bis repetitur hic & pag. 180. col. II. pl. VI. Ranunculus aquaticus capillaceus C. B. Pin. Ranunculus Tricophyllon aquaticus medio-luteus Col. Etiam si Bauhinus bis citavit Columnam, debuit in posteriori loco tantum

tantum citari. Sunt duæ, Ranunculi species, omnino distinctæ. Ut quilibet observare possit; cum intuendo figuram Columnæ & Icon. Lob. atque copiosè uterque hic Ranunculus in aquis paludosis conspicitur, vegetans.

Pag. 142. Consolidæ Regalis & pag. 144, & 145. aquilegia & Nigella debent ad venenatas, & siliquiferas amandari ut clariùs demonstrabimus postea.

Pag. 144. Chelidonium majus cum sit planta Tetrapetala, siliquosa, ad Tetrapetalas siliquosas, esset referendum.

Pag. 146. Col. II. Pl. III. Cuminum sylvestre capitulis globosis C. B. Pin. non est Umbella propriè loquendo cum non habet bina semina simul juncta, sed cum folia Umbellæ in modum disposita habet, ad calcem Umbellarum: cum Pimpinella amandetur.

Pag. 147. Col. II. Pl. VII. Chaa malè à Casp. Bauh. in Pin. pro Fœniculi specie exhibetur: cum ejus folia ex Japonia Sinensumque, finibus, ad nos delata, aqua macerata & extensa, latiora sunt; Bellidis foliis, declarantque hanc, non esse Umbellam, ferulaceis Fœniculaceisve foliis præditam.

Pag.



*Pag. 147.* Anethum ad umbelliferas, (quarum semina sunt rotunda & foliacea) esset referendum: nulla habita ratione foliorum Fœniculo, accedentium.

*A pag. 147, ad pag. 165.* Adeò confusus est ordo Umbellarum: Bauhini nec confusio tolli poterit quoad Tabulas, cognationis affinitatisve nostras, publico, exhibuerimus.

*Pag. 148.* Pyrethrum flore Bellidis non obstante caustica facultate, ad Corymbosas seu Corymbiferas est referendum: non inter Umbellas collocandum.

*Pag 149. Col II. Pl. III.* Peucedanum, est Umbella, Gramineis foliis, semine folioso subrotundo prædita, parùm ergò rationi congruit; Peucedanum minus Cas. B. Pin. esse Peucedanum: cum nec Graminea habet folia, nec semina foliacea, seu compressa, sed striata, & folia tenuitè divisa. Selinum montanum pumilum (cum Clusio) aptiùs designabitur.

*Pag. 150.* Nota Bauhinum quatuor genera distincta Umbellarum, sub uno & eodem genere (Dauco scilicet) comprehendisse. Quæ suis sunt reddendæ ordinibus: ut ex doctrina nostra, alibi tradenda (quin &

& hic) cuilibet perspicuum evadet.

Daucus foliis Fœniculi tenuissimis, ad Daucum seu Carotam vel Pastinacam tenuifoliam, reduci potest, quippe semina villosa, (Dauci vulgaris in modum) producit. Tres autem sequentes Umbellæ; (sub Dauci nomine) cum sint foliis ferulaceis, & semine striato minore donatæ; pro Dauco montano, seu Saxifraga tenuifolia haberi possunt. Quippe quod, Saxifragiæ tertiæ Matth. seu Dauci montani (Bauhino sic dicti) habent, & folia & semina striata minora. Sex autem sequentes (incipiendo à Dauco montano, Apii folio majore) cum sint semine compresso foliaceo, subrotundo, ut Peucedanum vel Oreoselinum, ad Umbellæ, foliis plurifariam divis, semineque foliaceo rotundo, ditatas: sunt religandæ. Ultimus seu 13. Daucus pratensis, Millefolii palustris folio C. B. Pin. Daucus pratensis Dalechampi hist. Lugd. ex radicum & seminum striatorum structura, declarat sese esse Oenanthen. Unde nobis, potiore jure, Oenanthe Millefolii foliis (in pratis humidis vegetans, more aliarum suæ classis) denominabitur. Hæc diximus ut legentibus & profundius intentibus

entibus, innueremus, malè distributam, hanc Dauci subalternam sectionem, à Casp. Bauhino : dum 4. distincta genera Umbellarum (ut suprà clarè docuimus) sub uno & eodem militare vult signo.

*Pag. 151. Col. I. Pl. II.* Pastinaca tenuifolia sylvestris Umbella majore C. B. P. sylvestris Daucoïdes apula Col. Hæc planta ex semine oblongo aspero etiamsi folia gerit Pastinacæ tenuifoliæ : sese declarat potius, ad Myrrhidis classem pertinere.

*Pag. 151. Col. I. Pl. VI.* Pastinaca sylvestris angustifolia, fructu Echinato C. B. Pin. Pastinaca Echinophora apula Col. à semine debet hæc planta Umbellifera ad Crithmum maritimum, spinosum, sibi simile ; ad finem Umbellarum remitti : cum Pastinacæ marinæ seu Chrithmi marini spinosi habeat seminis involucrum, spinosum ; semenque paritèr striatum, eodem debet referri.

*Pag. 151. Col. II. Pl. IV.* Gingidium, foliis Pastinacæ latifoliæ C. B. Pin. Gingidium 1. Dod. malè huic generi adaptatur, cum non sit semine striato minore (ut Gingidium) præditum, nec etiam caucalis dici debet.

Ut

Ut plurimi Neotericorum scriptorum dixê-  
re: cum semen non habet Echinatum ;  
caucalidum more. Ergò concludendum  
cum dispositione seminis foliacei, subro-  
tundi, in margine granulati (Tordylîi apuli  
minimi Col. more) tum positione foliorum  
Lobatorum, sub Tordylîi signo militare de-  
bere : & magis appositè Tordilium Syria-  
cum, semine majore granulato ; designa-  
bitur.

*Pag. 152. Col. II. Pl. III.* Chærophyllo  
nonnihil similis C. B. Pin. Perchepier An-  
glorum Lob. Cerefolium est Umbella, foliis  
plurifariàm divisis, semineque rostrato præ-  
dita. Ergò Perchepier Anglorum, Chæro-  
phyllo, nihil similis, potius quam nonnihil  
similis Bauhino. Non est Umbella, ergò  
longè arcenda, sed cum in omnibus & per  
omnia Alchimillæ, illi conveniunt notæ  
essentiales: eò mandanda, cum doctissimo  
Fab. Columnâ.

*Pag. 152. Col. I.* Caulis major Clus.  
hist. malè à Bauhino, pro Caulalidis specie  
habetur, cum ejus semen non sit (Caulali-  
dum ritu) Echinatum : quod, est generica  
& essentialis Caulalidis nota. Aliò referen-  
da



da nec aptius quam ad Tordylium ( cum docto Jacobo Plateau, qui ejus semen ad clusium misit) referri posse autumnno.

Pag. 152. Col. II. Pl. XII. *Caucalis folio Peucedani* C. B. Pin. *Caucalis Anglica* Lob. cum hæc Umbella sit semine minore striato donata. *Dauci montani* aut *Saxifragiæ* 3. *Matth.* in modum : ad ejusdem speciem amandari debet: neutiquàm ad *Caucalidem*, cujus non fert Symbolum.

Pag. 153. Col. II. Pl. VI. *Apium montanum folio ampliori* C. B. Pin. & *montanum nigrum* C. B. in Pin. *Oreoselinum Parisiensium* Lugd. & *Apium sylvestre lacteo succo turgens*, & *Apium peregrinum Cicutæ folio* C. B. Pin. omnes hæ quatuor *Apii* species, neutiquàm sunt genuina *Apia*, quippè *Apium* est planta umbellifera, semine striato minore, ornata; at priores sunt semine foliaceo subrotundo affectæ. Ergò aliò transmittendæ; ut in Tabulis nostris cognationis, præstabimus. Nota insuper ibidem *Bauhinum*, duas distinctas constituere species: *Oreoselinum montanum folio ampliori*, & *Parisensium nigrum*; quæ, una & eadem est planta; diversa, tantum natalibus.

Pag. 156. Post Imperatoriam admitti debet Imperatoria nigra, Tab. pagin. 186. col. I. pl. V. contenta, Astringia nigra Lob. Icon. & Obs. Elleborus niger Saniculæ folio, major & minor C. B. Pin. malè hæc planta in Ellebori clasſe collocatur, cum Umbellæ, omnes habeat conditiones requiſitas, flores in Umbella, Pentapetalos, quorum ſingulis evaneſcentibus, ſuccedunt, bina ſemina oblonga aſpera, quod clariùs intuentibus apparebit, quoniam è ſummo faſtigio Caulium exeunt; foliola ſubviridia, latiuſcula, ſtellaſim cingentia baſin, radiorum ſemiuncialium, ſuſtinentium floſculos minimos, pentapetalos: Perſicæ florum coloris. Aſtrantiæ nomen ſortita eſt hæc planta, quoniam folia in 5. Lobos obſcuriùs virentes (Saniculæ inſtar) diviſa gerit. Saniculæ illi adaptarunt nomen ſed Imperatoria nigra, Aſtrantia dicta, Saniculæ folio, potiore jure denominabitur.

Pag. 157. Col. I. Pl. II. Libanotis major & altera ſeu vulgatioꝝ, cum utriuſque ſemina ex pluribus aliſ foliaceis, rotæ molen-  
dinæ fluviatilis inſtar; conſtent: eaſdem declarant, ex Laſerpitii familia oriundas; ſeu  
genus

genus suum desumere, quippe eadem, cum illis ( quoad formam & figuram ) sunt semina.

*Pag. 158. Col. II. Pl. VI.* Panax Asclepium semine folioso C. B. Pin. Panax Asclepium Apulum Col. cum semen habeat rotatim, seu circularitèr ala foliacea cinctum, Thapsiæ more, ad Thapsiam redigatur: non autem ad Libanotidem, cujus semen, nulla ala membranacea pellucida cingitur.

*Pag. 160. Col. I. Pl. VI.* Pimpinella sanguisorba major, minor, hirsuta & minor lævis, & omnes quot fuerint sanguisorbæ Pimpinellæve, quum non sunt Umbellæ (proprie loquendo) non debuere locari inter Umbellas (propter foliorum cum Pimpinella Saxifraga, similitudinem) sed ad calcem Umbellarum, cum aliis ejusdem Farinæ, amandari: propter similem foliorum, Lobatorum dispositionem.

*Pag. 161. Col. II. Pl. VII.* Cicutaria palustris tenuifolia non habet bina semina, simul juncta aliarum Umbellarum more, ergò non est Umbella proprie dicta.

*Pag. 161. Col. I.* Sefeli Creticum majus; Creticum minus; Creticum fructu majore;

A a 2 Creti-



Creticum minimum: Cum Sefelios, nota essentialis & Generica, sit producere semen striatum; atqui hæc quatuor plantæ umbelliferæ, semina producunt foliacea, seu membranacea, rotunda; ergò debent collocari cum congeneribus suis: Pastinaca latifolia, Sphondyllo, &c. sub Tordylly nomine Generico.

Pag. 162. Col. I. Pl. XI. Sefeli palustre lactescens, propter præcedentem rationem, à Sefelios familia averruncandam, & ad Umbellas, semine foliaceo subrotundo foliis plurifariam divisis (cum Oreoselino & Thysselino) revocandum esse judico.

Pag. 162. Oenanthe Apii folio Casp. B. Pin. angustifolia Lob. nota quod C. Bauhinus pro Synonimo, attulit Cyminum bulbosum Plinii Col. quod est bulbocastanum aut saltem ejus species, nihil habens affinitatis cum Oenanthe, ut ait doctissimus Columna.

Pag. 163. Col. I. Pl. V. Oenanthe Hederæ folio C. B. Pin. Oenanthe Myconihist. Lugd. non est Umbella, cum flores & semina Ranunculi producat. Optimè Ranunculus Thalictri folio, Asphodeli radice, cum Parkinsono nominabitur.

Pag.



*Pag. 163. Col. II. Pl. VII.* Filipendula vulgaris, cum non sit Umbella, sed tantum à foliorum cum Umbellis similitudine; ad finem Umbellarum (tanquam affinis) debet collocari, Ibidem Pedicularis seu Aleætorolophos, cum sit Galeata, ad finem Galeatarum, verticillatarum, collocanda. Ibidem Barba Capræ, cum sit tantum Umbellis affinis, à dispositione foliorum; cum Thalicthro, Filipendula, Pimpinella, &c. In fine Umbellarum addenda: Ergò inconsideratè, laboriosissimus Bauhinus, Filipendulam pedicularem & Barbam Capræ, interjecit inter Oenanthen & Valerianam, propriè dictas Umbellas: cum nil habent hæ plantæ, commune, cum propriè dictis Umbellis, nisi folia, quæ, non sunt primò & principalitèr, partes essentielles, nisi per accidens tantum; inservientes fructificationi. Nota insuper Plant. IX. & X. ejusdem Columnæ ad caput sequens, debere referri.

*Pag. 164. Col. II. Pl. VII.* Valeriana Græca; propter antedictam rationem, ab ipso doctissimo & laboriosissimo Casp. Bauhino, illic observatam: est aliò remittenda. Observa hanc Valerianam, nil habere

cum Valeriana propriè dicta, commune, præter folia; ergò ad finem itidèm Umbellarum, cum cœteris (propter conformitatem foliorum) referri debet.

*Pag. 165. Col. I. & II.* Valerionellæ omnes, non sunt Umbellæ propriè loquendo, quia non habent bina semina (aliarum Umbellarum propriè sic dictarum more) simul juncta.

*Pag. 168. Col. II. Pl. I.* Solanifolia Circoea dicta, major & minor: quâ similitudine Solanis annumerantur, non possum assequi. Semen fert verrucosum; ergò ad Agrimoniâ, Saniculam vulgarem ibidèm: (in locis Udis, sylvosis & umbrosis) habitantem, referatur. Ibidèm. Qua ratione mirabilia Peruviana, ad Solanum reduci possunt; non satis assequor. Est planta certè Heteroclita: quemadmodum plurimæ aliæ exoticæ. Solano etenim satis malè cohæret. Nos exactiùs exhibebimus (in Tabulis nostris cognitionis, universalis nostræ methodi) hujus dispositionem.

*Pag. 172.* Hypecoum malè inter Papaver & Argemonen collocatur: exilis cum sit planta, foliis, Fumariæ adinstar, dissectis; filiqua

filiquas edit longas articulatas, est Heteroclitia planta hæc.

*Pag. 176. Col. II. Pl. V.* Anemone nemorosa, flore majore Casp. Bauh. Pin. à quinta Plant. secundæ Columnæ, pag. 176. ad Pl. X. secundæ Columnæ pag. 177. Ranunculi omnes sunt. Cum, omnium flores abeunt in semina aculeata racematim compacta, sive orbicularitèr sive spicatim. Anemones propriæ dictæ, flos abit in pappos, ventoque aufertur. Ergò omnes contentæ à V. Pl. Col. II. pag. 176. ad X. Pl. Col. II. pag. 177. sub Anemone, perperam disponuntur, debent conjungi cum Ranunculo nemoroso luteo, pag. 178. Col. I.

*Pag. 180. Col. II. Plant. VI.* Ranunculus aquaticus medioluteus Col. bis repetitur hic & suprâ pag. 141. vide Millefolium aquaticum foliis Abrotani, Ranunculi flore & capitulo.

*Pag. 180. Col. I. Plant. VI.* Ranunculus aquaticus Cotyledonis folio, Casp. B. Pin. Cotyledon aquatica Dod. cum semen non gerat Ranunculi, non est reputandus pro Ranunculo, ideò aliò remittendus; nec aptius quam ad aquaticas Heteroclitas plantas referri potest.



*Pag. 179. Colum. II. Pl. VI.* Ranunculus Aconiti folio, flore albo multiplici C. B. Pin. debet transferri ad Columnam primam pag. 182. & jungi Plantæ VII. nempé. Ranunculo montano Aconiti folio, albo flore majore C. B. Pin.

*Pag. 182. Colum. II. Pl. IX.* Ranunculus montanus Aconiti folio, flore globoso C. B. Pin. est potiùs Aconiti species, cum siliculas seu Thecas seminales, membranaceas, Aconiti ritu habet, semenque inibi contentum. Nec semina racematim in capitulum pungens compacta: ut Ranunculus gerit. Quare ad Aconiti classẽ retulimus appellando Aconitum, Ranunculoïdes secundum, quemadmodum Aconitum hyemale, à flore Ranunculi, Aconitum Ranunculoïdes primum seu hyemale; Thecas seminales. Utrumque Aconiti more habet.

*Pag. 183. Colum. II. Pl. XVI.* Aconitum racemosum, Christophoriana, dictum. Malè inter Aconita recensetur, cum nec florem Cucullatum, nec Thecas membranaceas (aliorum Aconitorum more) gerit: sed cum sit planta baccifera; ad Solani potiùs genus referenda.



*Pag. 184. Col. I. Pl. I.* Aconitum Parda-  
leanches seu Thora major & minor, sunt  
Ranunculi species; ergò ad Ranunculi ge-  
nus, montani pag. 182. pertinent, atque ibi  
locari debent.

*Pag. 184.* Doronicum cum sit planta  
stellata, pappescens amandetur ad confor-  
tes, Asterem, Conyzam, Helenium, Tripo-  
lium, paginis 265, & 266.

*Pag. 286. Col. I. Pl. V.* Helleborus niger  
Saniculæ folio major & minor, debent a-  
mandari ad Imperatoriam, inter Umbellas,  
cujus sunt species: vide pag. 156. ubi pro-  
lixiùs illic egimus.

*Pag. 186. Col. I. Pl. IX.* Helleborus ni-  
ger tenuifolius Buphthalmi flore, sub eo-  
dem genere militat cum Adonide; cujus  
est species, utraque, Ranunculorum classi  
accedere debet.

*Pag. 197.* Tussilago Petasites & Ca-  
calia, ad papescentes amendantur, scilicet  
Eupatorium, virgam auream, Stœchadem  
Citrinam, Serratulam, 263. pag.

*Pag. 201. Col. II. Pl. I.* Leucoium Alyf-  
soides Clypeatum majus C. B. Pin. Alyssum  
Dioscoridis Dod, debet cum Lunaria Græ-  
ca

ca collocari: item Leucoium incanum filiquis rotundis C. B. Pin. Eruca peregrina Clus. debent omnes hæ Leucoid species platolobi, subjungi Leucoidis filiquosis.

Pag. 200, 201, 202. Malè collocantur Leucoium filiquosum & viola matronalis hîc. Cùm ad filiquosas reliquas tetrapetalas debent transferri, Videlicèt Sinapi, Erucam, Irionem, sive Erysimum, &c. p. 99.

Pag. 210. Col. I. Pl. VII. Caryophyllus pratensis flore laciniato simplici, seu flos Cuculi C. B. Pin. malè inter Caryophyllos collocatur, à Bauhino, cum omninò sit Lychnis, à flore, semine & capsula Pyriformi.

Pag. 210. Col. II. Caryophyllus holostius ejusque sequaces, usque ad Caryophyllum montanum. Alsines & Lychnidis Seriei, debent adjungi: Quum flores gerant quinque petalis, ad medium bifidis, constantes: capsulasque Pyriformes. Non autem Caryophylli in modum Cylindriacas.

Pag. 211. Col. I. Pl. I. Linaria scoparia est planta sui generis: nec præter folia, aliquam affinitatis notam habet cum Linaria. Ibidem, idem dicendum de Oxyride frutescente Baccifera, C. B. Pin. seu Casia Poëtica Monspelienfium Lob.

Pag.

*Pag. 213. Col. II. Pl. XV.* Linaria montana flosculis albicantibus C. B. Pin. Anonymos tenuifolia Clus. per eandem rationem antedictam, non est Linaria.

*Pag. 213. Col. I. Pl. VI, & VII.* Linaria folioso capitulo luteo, major & minor: nil nisi folia Linariæ gerunt. Florem virgæ aureæ instar, ex plurimis staminulis, luteis conflatum, habent; qui postea abit in pappos: ergò jure merito, virga aurea folliis Linariæ appellabitur. Linariæ nota essentialis, est flos Calcarî donatus, rictum compressus, habet flos. Semen, binis capsulis, Apum alvearia referentibus inclusum habet Linaria; ut in descriptionibus observavimus; & ut prolixiùs trademus, quando notas essentielles & genericas unicuique generi adaptabimus, in Tabulis nostris cognationis. Linaria autem scoparia: Olyris baccifera frutescens: Linaria montana seu Anonymos Clus. Linaria aurea Trag. cum nihil horum possident, alibi sunt collocandæ.

*Pag. 214. Col. II. Pl. VI.* Linum minimum stellatum non est Linum: à nota essentiali Lino convenienti, cum nec florem, nec semen Lini habet. Ibidem Col. I. Pl. IX.

Linum

*Linum sylvestre luteum* foliis subrotundis C. B. Pin. *Campanula lutea linifolia* Lob. bis repetitur, hic & suprâ pag. 93. Colum. I. Pl. XIII. nimirum *Rapunculus nemorosus*, angustifolius parvo flore C. B. Pin. *Campanula lutea linifolia* Lob. Ger. vide suprâ pag. 93.

Pag. 215. *Col. II. Pl. V.* *Polygala repens nivea* C. B. Pin. *repens* Lob. non debet flori *Ambervali* jungi sed *Polygono* (*Herniaria*) dicto. Ibidem *Onobrychis Arvensis* seu *Campanula Arvensis erecta* C. B. Pin. cum sit *Campanula* (à flore) plantaque lactescens, florem, capsulam seminalem, triquetram, & semina pellucida (ut *Campanula*) gerit: *Campanulis* debuisset jungi.

Pag. 216. *Stoechas Arrabica*, *Lavendula* & pag. 217. *Rosmarinum*, malè claudunt sectionem, cum sequentem, verticillatarum galeatarum, sectionem debeant incipere; quippè verticillatæ galeatæ, verticillatis galeatis (in eâdem sectione) addendæ.

Pag. 218. *Col. II. Pl. XIII.* *Hyssopifolia* C. B. Pin. cum nec sit planta galeata nec galeatæ aut verticillatæ fert capsulam, parum



rùm aut nihil cum Hyssopo habet affinitatis aliò ergò releganda: Fortè ad Euphrasiam.

*Pag. 221. Col. 1, & 11. Pl. 1, & 11.* Ageratum foliis serratis & non serratis C. B. P. malè inter galeatas & verticillatas plantas collocantur, cum sint Corymbiferae .f. Corymbosae. Adde quod odor & sapor, non considerantur in disponendis plantis. Ibidem Ageratum serratum Alpinum C. B. Pin. Ageratum purpureum Lugd. malè etiam hic disponitur: cum non sit Galeata planta, nec capsulas, Galeatae in modum: verticillatim gerit. Aliò etiam releganda: eòdem cum Hyssopifolia ad finem Euphrasiae amandetur. Capsulas fert longas innumeris seminibus minutulis, scatentes ut Euphrasia, sed nec hæc, nec Hyssopifolia florem habent Galeatum, sed quinque petalis distinctis conflatum.

*Pag. 222. Col. 1. Pl. V.* Dictamnus albus vulgo, seu Fraxinella C. B. Pin. Fraxinella Dod. cum nil habeat affinitatis, nec in foliis nec in floribus, multò minùs in capsulis seminalibus, cum verticillatis Galeatis, aliò est remittenda, nec aptius (mea opinione) quam ad sectionem venenatarum, siliquis membra-

membranaceis præditarum ; Aconitum (videlicet) Delphinium, Staphydem-agriam, &c. (id genus) aliás.

Pag. 225. Col. I. Pl. II. Clinopodium arvense Ocymi facie C. B. Pin. planta est verticillata ; verticillis per Caules rariùs dispositis, donata, per intervalla : at majus .s. vulgare verticillos densius dispositos, per intervalla habet : Ergò ad Ocymi finem referri potest : Est enim Ocymi sylvestris species. Origanum Canadense fistulosum Corn. in ejus locum sufficio : tanquam plantam (inter odoriferas) magis illi convenientem, eandem appellando, Clynopodium Canadense fistulosum, & non Origanum, cum quo nil habet affine.

Pag. 225. Col. II. Pl. V. Clinopodium Alpinum hirsutum C. B. Pin. Clinopodium Alpinum Ponæ bis repetitur hìc, & p. 247. Col. II. Pl. VI. Teucrium Alpinum coma purpureo-cœrulea C. B. Pin. Clinopodium Alpinum Ponæ.

Pag. 226. Col. I. Pl. II. Mentha hortensis Corymbifera C. B. Pin. costus hortorum Lob. malè à Bauhino ob odorem, Menthæ Seriei adjungitur, cum jure merito ad Corymbosas,

rymbosas, five Corymbiferas, videlicèt Tanacetum, Ageratum Millefolium, &c. (id genus) alias plantas Corymbosas, debet amandari.

*Pag. 229. Col. I. Pl. VI.* Calamintha arvensis verticillata C. B. Pin. malè inter Calaminthæ species recensetur, quippè Calaminthæ verticilli, rariùs disponuntur, hujus verticilli, densiùs, per intervalla dispositi sunt. Ideò qui Mentham (Sisymbrium) hortensem & sylvestrem, cum Mentha pulegii odore, & Mentha aquatica exigua & pulegio sylvestri Lugd. conjunxerit : affigendo toti generi nomen Menthæ densiùs verticillatæ, meliùs egerit.

*Pag. 231. Col. I. Pl. V, & VI.* Lamium maculatum C. B. Pin. & Lamium linea alba notatum C. B. Pin. pro una, duæ in medium adferuntur plantæ, cumque cuilibet propiùs consideranti, una & eadem apparebit planta. Ineunte enim hyeme, albis maculis, folia consperguntur. Exeunte autem hyeme, linea alba, per folii Nervum medium discurrente, notantur : æstate una & altera, spoliata, folia habet viridia. Ibi-  
dèm Lamium foliis Caulium ambientibus  
majus



majus & minus, pro una & eadem habeantur planta, cum specifica, qua distinguantur, nulla assignatur nota.

Pag. 231. Col. II. Pl. XI. Lamium peregrinum .i. Scutellaria C. B. Pin. Astragaloides Cornuti. A forma capsulæ seminalis, apprimè referente imaginem aut formam tali vulgaris, qui mulierum calceis subjicitur: quæ exsiccata & apperta, Scutellam exprimit, unde ei nomen novum genus constituens Scutellaria; dictum, ad finem Galeatarum & verticillatarum, rejiciendum: qui construxerit, gratum opus fuerit; quinque sunt plantæ quæ sub novo hoc genere militare possunt, sub nomine Scutellariæ, gratiola latifolia Ger. *Lyfimachia Galerikulata* Lob. *Scordium Berardi* seu *Scorodotis* Plinii Clus. *Scutellaria Americana* Malvæ folio. Et *Lamium peregrinum* seu *Scutellaria* C. B. Prodr. & si quæ aliæ verticillatæ Galeatæ hujus Farinæ detegantur, huc paritèr revocandæ sunt.

Pag. 232. Col. II Pl. I. *Urtica aculeata* foliis ferratis, & altera foliis non ferratis, malè *Urticæ* nominantur, cum sint verticillatæ, Galeatæ propriè loquendo, ergo  
ad



ad Sideritidis classem jure pertinent. Ibidem *Urtica urens* maxima, minor, & pilulas ferens; cum non sint galeatæ, sed verticillatæ, aliquomodò racemi, verticillatim disponuntur, ergò ad finem galeatarum, verticillatarum remittantur.

*Pag. 232.* *Alyssum verticillatum* foliis profundè incis, malè disjungitur à *Marrubio*; cum sit omnibus suis partibus, verum & genuinum *Marrubium*.

*Pag. 233.* *Euphrasia* ejusque species, cum sint galeatæ, sed non verticillatæ propriè loquendo, ad finem verticillatarum & galeatarum rejici debent: Ut clariùs demonstrabimus in *Tabulis nostris cognationis*.

*Pag. 234.* Nota *Bauhinum* inadvertentè, confundere *Euphrasiam* majorem sylvestrem purpuream & latifoliam, cum sunt duæ distinctæ plantæ; ut apparet ex duabus diversis *Iconibus Columnæ*: Ut cuilibet intuenti *Fab. Columnam*; evidentèr apparet.

*Ibid.* *Melampyrum* ejusq; species, cum sint galeatæ plantæ, sed non verticillatæ propriè dictæ; ad calcem galeatarum fuerunt re-

jiciendæ; & non confusè (cum Bauhino) in medio sectionis collocandæ.

*Pag. 234. Col. II. Pl. VI.* Melampyrum luteum minimum C.B.P. Perpusillum luteum Lob. Adv. quam inconsideratè Bauhinus, Sequendo Lobellium, hanc plantam (quam depictam in adversariis exhibuit Lobellius) denominat Melampyrum, legentium sequentia esto judicium. Melampyrum est planta galeata tritici referens grana. Hæc autem tenella planta, Ranunculi est species, à gustu, sapore, flore, quinis petalis, plurima staminula cingentibus, conflato. Cui deciduo, succedit spica coniformis, falcata gerens semina: Folia fert ferulacea. Nec apparentè Lobellius, qui primus erravit, omnesque alios authores errare fecit: florentem hanc vidit plantam, multo minùs bene observavit spicam, (etiamsi pictam in adversariis exhibet) quæ neutiquàm refert Melampyri spicam; hætenùs de hac planta egimus, inter non scriptas à nobis exhibitas.

*Pag. 235.* Serratula malè disponitur hic in medio galeatarum, verticillatarum: cum ejus flos abit in pappos, plurimis staminulis fistulosis,

fistulosis, virgæ aureæ modo, constat. Ergo ad virgam auream, ejusque classem transponi ibique collocari debet. Ibidem Scrophularia, cum nec sit galeata nec verticillata planta, sed bicapsularis; plurima minuta in se continens semina, ad classem bicapsularium, releganda floret: Nempè digitalem, verbascum, Blattariam, &c. (id genus) aliás.

Pag. 240. Col. II. Pl. I, II, III. Verbasum latis Salviæ foliis C. B. Pin. & angustis Salviæ foliis C. B. Pin. & acuto Salviæ folio C. B. Pin. perperam hæ plantæ à Bauhino & authoribus aliis, ad Verbasum reducuntur, ab incana lanugine foliorum, Verbasci foliis quodammodo accedentium; cum Verbasci omnis, flos est integer, in margine quinquefariam divisus, cui deciduo succedit bicapsularis Theca, seminalis. Multa hinc inde continens semina minutula, ut videre licet in digitali, Blattaria, Scrophularia, Gratiola, Hyperico & id genus, aliis ejusdem classis. Sed more nostro denominatio desumi debet à nobiliore parte, flore seu florendi modo: Cum galeatum & verticillatim dispositum fert florem, Adinstar Salviæ,

Bb 2

capstr



capsulasque seminales gerit *Salvia*, quatuor semina oblonga, angulosa. Verticillatarum omnium ferè ritu, *Salvia fatua*: cuilibet hæc nostra dicta consideranti apparet. Et ideò *Salvia sylvestris Verbasci latis foliis*; & *Salvia sylvestris Verbasci angustis foliis*; & *Salvia sylvestris Verbasci acuto folio*; Imposterum à nobis designantur.

Nota quod *Verbasum* & *Blattaria*, pag. 239, & 240. malè inter verticillatas disponuntur, cum ad capsulares bivalves debeant amandari; quod præstabimus in generali nostrâ historia plantarum, per Tabulas cognitionis disponendarum.

Pag. 241. *Æthiopis*, (sine ratione) disjungitur ab *Horminis*: Cum omnes, *Hormini* habeat partes; *Horminum* *Æthiopi-um* incanum appelletur.

Pag. 245, & 246. Nota *Lyfimachia* caput, seu distributionem esse confusissimam apud *Bauhinum* in *Pinace*. Primò, occurrat *Lyfimachia lutea major*; quæ florem quinis aut Senis petalis constantem fert; cui flaccido succedit, capsula rotunda; *Pisi* medii magnitudine in qua continentur, minuta plurima rotunda semina. *Ephemeron*, flore



flore & semine & capsula seminali, valdè huic *Lyfimachia* accedit. Secundò, occurrit *Lyfimachia Virginiana*, florem magnum, *Unifolium* seu *Monopetalum convolvulorum* more; cui deciduo, succedunt *Cornicula coniformia*, maturo semine, in plurimas sese findunt partes, & copiosè semina emittunt: ex loculamentis, adinstar *Papaverum Corniculorum*. Tertio loco, occurrunt *Lyfimachia* propriè dictæ *siliquosæ*, quarum flores exeunt in summitate *siliquæ*; quaternis, quinis petalis constantes; quibus *Marcescentibus*, succedunt *siliquæ biunciales triunciales*, sese in quinque distincta loculamenta, apperientes, & semina plurima papposa (ut *Salix*) fundunt. Quarto loco, sese offert nobis consideranda, *Lyfimachia spicata purpurea*, florem fert galeatum rubrum; cui succedit capsula seminalis (*Euphrasie* instar) continens plurima semina minuta; atque eò nomine haud abs re, esse judicarem; eandem *Euphrasiam* perennem aquaticam, flore purpureo, denominari. Quinto loco, nobis consideranda exhibetur, *Lyfimachia spicata cœrulea*, quæ aliarum *Veronicarum*

more, florem fert tetrapetalum: cui succedit silicula, bicapsularis, Bursæ pastoris seu Veronicæ similis; & est Veronica spicata cœrulea recta. Sextò, *Lyfimachia cœrulea galericulata* vel *Gratiola cœrulea* Casp. B. Pin. *Lyfimachia galericulata* Lob. hæc est galeata verticillata, scutellata, per consequens ad novum genus verticillatarum referri debet. Et scutellaria palustris cœrulea nobis dicenda: ita hæc diviso *Lyfimachia* ad sex diversas classes distinctas, pertinet; variè à nobis per Tabulas cognitionis, distribuenda.

*Pag. 247. Col. II. Pl. V. Clinopodium Alpinum* Ponæ bis repetitur, hic & pag. 225. Col. II. Pl. V. vide suprà paginam 225.

*Pag. 247, 248, 249. Teucrium, Scordium, Chamædrys, Chamæpitys* malè hic cum *Lyfimachia veronica*, inter veronicam & *Alsinen*, collocantur; cum inter galeatas, verticillatas, propriè dictas: essent collocandæ.

*Pag. 248. Col. I. Pl. V. Chamædrys Alpina* Cisti flore C. B. Pin. *Camædrys montana* frutescens durior Ad. Lob. cum hæc planta nec florem galeatum, nec capsulam seminalem

lem verticillatim dispositam habeat; Chamædrys non potest dici: cum autem florem gerit, sex petalis albis conflatum, cingentibus discum medium, cui evanescenti succedunt globuli, hirsuti, Caryophyllatæ more, ergò appositè satis appellabitur Caryophyllata; Chamædryos, folio duriori.

Pag. 248. Col. II. Pl. VIII. Chamædrys unicaulis spicata Bauh. in Pin. Trixago Apula unicaulis Col. hæc florem gerit galeatum luteum, sed capsulam habet & semina inibi contenta, Euphrasiæ: non est Chamædrys, quia non habet capsulas in margine quinquefariam divisas, continentes singulas, quaterna semina. Appelletur ergò Euphrasia Apula unicaulis magis apte. Ibidem Pl. XII. Chamædrys spuria major latifolia C. B. Pin. Veronica maxima Lugd. usque ad Plantam XVIII. omnes hæc ad Veronicæ classẽ debent amandari; cum omnes, Veronicæ gerunt tesseram, flores (scilicet) tetrapetalos, filiculas bicapsulares, Veronicæ more. Nec Chamædryos species, accenseri possint: quippè nec galeatæ nec verticillatæ sint.



*Pag. 250. Col. I. Pl. I, II, III, & IV.* Alfine Hederulæ folio C. B. Pin. Veronicæ folio flosculis Cauliculis adhærentibus C. B. Pin. Chamædrifolia flosculis oblongis pediculis insidentibus; & Alfine Triphyllos cœrulea. Hæ omnes quatuor, notam essentialem Veronicæ habent; nempe flores tetrapetalos, & siliculas bicapsulares, septo medio membranaceo, duplicem seriem seminum determinante: ergò sunt veræ & genuinæ Veronicæ annuæ. Sic nobis denominanda, Veronica Hederulæ folio; Veronica flosculis adhærentibus, cauliculis; Veronica Chamædrifolia flosculis pediculis longis insidentibus; & Veronica Triphyllos cœrulea; ex dictis patet, omnes esse veras & genuinas Veronicas annuas; non autem ad Alfines, genus pertinent: Ut clarius alibi docebimus.

*Pag. 150. Col. II. Pl. VI.* Alfine scandens baccifera C. B. Pin. Cacubalus Plinii, est Alfine Heteroclita: Folia & flores habet Alfines, fructum seu baccas, Solani.

*Pag. 151. Col. I. Pl. XVI.* Alfine affinis Androsace dicta major C. B. Pin. Androsace



face altera Matth. nec florem nec capsulam  
 feminalem, fert Alsines; nota essentialis  
 Alsines est, habere florem quinis petalis  
 conflatum; quorum singula sunt bifida,  
 Lychnidis more; cui evanescenti, succedit  
 capsula, Pyriformis continens plurima se-  
 mina rotunda: Quod non conspiciere licet  
 in hac planta, magis accedit ad auriculam  
 Ursi. Multas alias plantas pusillas ad junxit  
 Bauh. hinc quæ propter exilitatem (quam-  
 vis sunt Heteroclitæ) aliò impræsentiarum  
 non remitemus. Ibidem Col. II. Pl. VI.  
 Alsine litoralis Portulacæ foliis C. B. Pin.  
 Alsines Pelagicum genus Clus. nota quod  
 sit Rubiæ genus, ex semine.

*Pag. 152. Col. I. Pl. I.* Anagallis aqua-  
 tica major, folio subrotundo Casp. B. Pin.  
 aquatica minor folio subrotundo; aquatica  
 major folio oblongo; aquatica minor fo-  
 lio oblongo; aquatica folio rotundo non  
 crenato; & aquatica angustifolia: Omnes  
 hæ sex plantæ, cum florem gerant tetrape-  
 talum, siliculasque bicapsulares, Veronicæ  
 (procul dubio) sunt veræ & genuinæ spe-  
 cies. Ideo Veronicæ appellentur aquaticæ;  
 sicque denominentur. Veronica aquatica  
 major

major folio subrotundo; Veronica aquatica minor folio subrotundo; aquatica major folio oblongo; aquatica minor folio oblongo; aquatica folio rotundo non crenato; & Veronica aquatica angustifolia: & sic tolletur gravis lapsus; Bauhini & cœterorum authorum. Quam habent affinitatem cum Anagallide videant oculati Botanici, & diligentè examinent mecum.

Pag. 252, & pag. 253. Elatine ejusque species: quum calcari & rictu hiantes; & capsula seminali, duplici loculamento distincta, præditæ sint. Quæ est nota generica & essentialis Linariæ; Linariæ sese veras & genuinas arguunt esse species; quod benè innotuit doctissimo Fabio Columnæ, dum Elatinen, Linariam Hederulæ folio appellat. Ibidem pag. 253. Col. II. Pl. II. Elatine folio acuminato, in basi auriculato C. B. Pin. Linaria Hederulæ folio Col. bis repetitur, hîc & pag. 306, Linaria Hederulæ folio Col. Cymbalaria C. B. Pin. Nota insuper Cymbariam esse veram & genuinam Linariæ speciem. Quia Linariæ nota essentialis & generica, omninò ei quadrat.

*Pag. 254. Col. II. Pl. VII.* Echium Alpinum luteum C. B. Pin. Trachelium *θυγατρίδες* Clus. & Campanula foliis Echii C. B. Pin. Trachelium *θυγατρίδες* Clus. ipsi Cam. *Pag. 94. Col. II. Pl. X.* bis repetitur. Campanula est: (quippe lactescit, semenque rufum, pellucidum habet) non vero Echium.

*Pag. 257. Col. II. Pl. X.* Cynoglossum minus C. B. Pin. Cynoglossa minor montana serotina altera Plinii Col. & pag. eâdem Columna, eâdem Pl. VII. Cynoglossum medium C. B. Pin. Cynoglossa minor montana serotina altera Plinii Col. eâdem planta, bis repetitur.

*Pag. 258. Col. I.* Lithospermum arundinaceum forte Dioscoridis & Plinii Lachryma Jobi Dod. frumentum est. Proinde ad cœrealia amandetur; quippe cum Lithospermo ordinario nil habet affine.

*Ibidem Pag. 258. Col. II. Pl. VII.* Lithospermum arvense radice rubra C. B. Pin. Anchusa degener facie Milii Solis Lob. ad Anchusam referatur, cum nec florem nec semen fert Lithospermi.

*Pag. 259. Col. I. Pl. I.* Lithospermum Linariæ folio, Germanicum C. B. Pin. Linaria

naria altera botryoïdes montana Col. planta est Heteroclita: nil cum Lithospermo vulgari habet commune: nisi seminis duritiem. Estque sui generis planta. Ibidem Col. II. Pl. V. Symphytum minus Borriginis facie C. B. Pin. Borrigo minima herbariorum Lugd. malè à Bauhino inter Symphyta collocatur, cum ex flore, tum ex semine, sit vera Borriginis species.

Pag. 260. Consolida media sive Bugula & consolida minor sive Brunella, malè distinguuntur à verè galeatis & verticillatis, quum iis, nota essentialis & generica, galeatarum & verticillatarum, perfectè convenit. Ergo ad Sectionem quartam Bauhini pag. 217. cum cœteris suæ conditionis amendantur.

Pag. 262. Bellis malè hic collocatur: quare ad Corymbosas referatur leucanthe-  
mas; Chamæmelum, Cotulam, &c.

Ibidem. Pilosella ejusque species malè hic collocantur, cum sint plantæ lactescen-  
tes, earumque flores abeunt in pappos, cum Pilosella sit omnibus notis parvum Hieracium: ad finem Hieracii pag. 129. releganda. Nec cum Bellide aut Gnaphalio, quid habet affinitatis.

Pag.



*Pag. 266.* Asteris omnis, flos debet abire in pappos; non minùs quam Conyzæ. Hæc est nota essentialis Asteribus, & cœteris stellatis pappescentibus, communis. Ast. quatuor à me observantur Asteres, recitati à Bauhino in Pinace, quorum, flores non abeunt in pappos: suntque hi; Aster foliis ad florem rigidis: Aster Atticus foliis circa florem mollibus C. B. P. seu Cernuus Col. Aster luteus folio glabro & crenato C. B. P. Atticus Dod. & Conyzoides Monspeliensium. Ergò eò ipso nomine quod, semina, solida gerant, à papposis, per consequens ab Asteribus arceantur: prædictæ quatuor plantæ: & ad Corymbiferas relegandæ.

*Pag. 272. Col. II. Pl. II, & III.* Jacea Oleæ folio, flore majore & minore, & Oleæ folio capitulis compactis; cum Jaceæ flos, abit in pappos; harum autem flores non abeunt in pappos, sed semina producunt solida, angulosa longa: Ergò non sunt verè Jaceæ, aliò relegentur. Nec aptiùs (meâ opinione) quàm ad Corymbiferas seu Corymbosas ianthemas; referri possè ipsas Autumno. Ibidem Col. II. Pl. V. Jaceæ, Oleæ folio affinis C. B. Pin, Dorynium Dioscoridis

dis forte Ponæ Italicè & Cneoro albo affinis C. B. Pin, Dorycnium forte Dioscoridis Ponæ Italicè pag. 463. Col. II. Pl. III. bis repetitur, eadem planta pro duabus diversis, duobus diversis locis, collocata.

Pag. 274, & 275. Tragopogon & Scorzonera : cum sunt plantæ lactescentes papposæ, ad congeneres, Lactucam, Sonchum, Chondrillam, Hieracium, Pilosellam & dentem Leonis, referantur ; quæ continentur à pag. 123. usque ad Paginam 131. Ibidem Caltha & Helenium Indicum, seu flos Solis, malè hic disponuntur cum ad Corymbosas pertineant. Helenium vulgare ad papposas stellatas, Asterem, Conyzam, Doronicum, Crithmum, Chrysanthemum, mandari debet.

Pag. 276. Col. I. Pl. IX. Caltha palustris capfulas efficit seminales, ut Ranunculus globosus Aconiti in modum: & semina ibidè contenta, paria ; non autem ut Caltha vulgaris.

Pag. 276. Col. I. Pl. I. Helenium ad non lactescentes, quæ tamen abeunt in pappos ; ut ad Asterem, Conyzam, & ejus Farinæ pappescentes, ( ut supra dictum ) debet relegari. Helenium Indicum, seu Chrysanthemum

themum peruvianum, ad Corymbiferas seu Corymbosas, transmitti debet, ergò malè confunduntur. Helenium Indicum seu flos Solis, cum Helenio vulgari, cujus flos abit in pappos; ut antè dictum.

Pag. 277. *Perfoliata* & *Bupleurum*, cum sint *Umbellæ* perfectæ; quia flores, quinque petalis constantes, producant, in summis radiis caulium, quorum singulis evanidis, succedunt bina semina, simul juncta; ergò debebant inter *Umbellas*, suæ classis plantas; collocari. Quid quæso connexionis habent *Perfoliata* & *Bupleurum*, cum *Centauro minore*.

Pag. 278. *Gratiola* cum sit planta in udis pratis, vegetans: Tubiformem florem galeatæ, aut potius parvæ digitalis instar gerens; cui tamen succedit *Theca* seminalis, bicaularis, digitalis, omninò instar; continens multa minuta semina: hac ratione, aptius cum suæ sortis plantis, collocanda; nempe digitale, *Verbasco*, *Blattaria*, *Scrophularia*, *Hyperico*, &c.

Pag. 280. *Col. II. Pl. II.* *Coris cœrulea* maritima C. B. Pin. *Coris Monspelica* Ad. Lob. florem fert galeatum, sed capsulam habet

habet peculiarem, differentem, ab omnibus galeatarum, verticillatarum, capsulis seminalibus. Ideo amandari ad calcem galeatarum, cum Scutellaria & Euphrasia, debet.

*Pag. 281. Polygonum latifolium C.B. Pin. & polygonum maritimum latifolium C. B. Pin. cum semina gerant triquetra; ad suæ fortis stirpes relegentur Persicariam, frumentum Saracenicum, &c.*

*Pag. 281, & 282. Polygonum & anthyllis, propter exilitatem, plantarum harum, difficile admodum est, ipsas ad idem genus reducere, quia magna est earum differentia, cum in flore, tum in semine.*

*Pag. 284. Col. I. Pl. X. Sedum minus fruticosum, C. B. Pin. Sedum minimum arborescens vermiculatum Lob. malè ab Authoribus ad sedum refertur, cum nil nisi folia, cum sedo minore longifolio commune habeat; florem & semen, Kali gerit, dicique debet Kali frutescens omnium maximum.*

*Pag. 284. Col. II. Pl. XI. Sedum Alpinum luteum C.B. Pin. Phyllon thelygonon dalechampii in dioscoridem Lugd. hæc planta quamvis folia gerat vermiculata hirta, sedi*



sedi montani minoris, more, florem tamen fert tetrapetalum cui succedit silicula oblonga Paronychiæ, Alfines folio instár. Est enim hujus species, foliis crassis hirtis: non autem sedi.

Pag. 285. Col. II. Pl. VI. *Cotyledon stellata* C. B. Pin. *Aizoon peregrinum* Cam. hæc planta nec florem, nec involucrum seminum aliter gerit, quàm *Sedum* seu *Sempervivum* minus. Ergò pertinet ad *Sedi* classẽ, est enim perfectè *Sedum* annum stellatum.

Pag. 285. Col. I. Pl. II. *Cotyledon media* foliis subrotundis C. B. Pin. *Cotyledon* altera quarta Clus. hist. *Cotyledon media* foliis oblongis ferratis C. B. Pin. & *Cotyledon media* subhirsuta floribus punctatis C. B. Pin. *Cotyledon altera* 5. Clus. hist. Hæ tres non sunt verè *Cotyledonis* .s. *Umbilici* veneris species; nec à flore, nec à capsulis seminalibus. Florem gerunt quinis petalis constantem: cui succedit involucrum seminis bifurcatum: quemadmodum, *Sanícula montana*, *Saxifraga Chelidonides*, gerunt. Suntque omnes plantæ, ejusdem generis,

*Pag. 287. Col. II. Pl. VI.* *Telephium* repens folio non deciduo C. B. Pin. septimum sive legitimum Imperati Clus. hist. malè hìc collocatur pro *Telephio*, cum neutiquàm iis accedit, nec flore nec semine, est potiùs *Polygoni* species.

*Pag. 287.* *Scorpioïdes Bupleuri* folio, ejusque species, item *Portulacæ* folio, cum florem edunt *Papiliaceum*, leguminum more; folliculos, per articulos (suo, quoque modo) incurvos, & in singulis articulationibus semina: quæ mansa, perfectè leguminum præbent saporem. Ideò ad leguminum classẽ, siliquis articulatis, præditam, remitto.

*Pag. 288.* *Cepæa Matth.* Sedi vera est species: Proinde Sedis jungenda, nec hìc per se collocanda. Ibidem *Crithmum maritimum* majus & minus C. B. Pin. & *maritimum spinosum*. Cum sunt perfectæ *Umbellæ*, malè ab ipsis *Umbellis* disjunguntur, & hìc collocantur: Item *Crithmum maritimum* flore *Asteris Attici*, malè hìc jungitur duobus *Crithmis Umbellis*. Quare amandetur ad *Asterum* classẽ, & pappæcentes stellatas plantas.

*Pag. 294. Col. I, & II.* Scammonia Monspeliaca foliis rotundioribus C. B. Pin. & Monspeliacæ affinis, foliis acutioribus, quum flores & siliquas lanigeras; Apocyni in modum, gerant: ad Apocyni classem debent amandari: Item Scammonia Syriaca, cum sit perfectè Convolvulus, ad Convolvuli seriem releganda.

*Pag. 295. Col. I. Pl. IV.* Convolvulus minor semine triangulo C. B. Pin. Helxine Cissampelos Lugd. malè inseritur inter Convolvulos. Convolvulus enim est planta lactescens, florem fert Monopetalum unifolium seu integrum, capsulas subrotundas, semina angulosa nigra, continentes. At hæc, nec lactescit, nec florem habet Monopetalum unifolium, quin & semen fert triangulare. Frumenti Saracenici, est vera species: Nil commune cum Convolvulo habet; nisi quod vicina quælibet amplectatur & scandat.

*Pag. 295.* Soldanella vel Brassica maritima major & minor. Cum lactescunt & florem, & capsulam seminalem & semina, Convolvulorum habent: Convolvulis adscribantur. Ibidem Soldanella Alpina rotundifolia



tundifolia major & minor, nil cum Soldanella præcedente, habent affine: nisi folia (quod multis semper imposuit) cum sint filiquosæ, aut Corniculatæ: alibi ad finem filiquosarum, (impropriè sic dictarum) collocandæ essent.

Pag. 303. & 304. Polygonatum, Lilium convallium, Monophyllum, Laurus Alexandrina: ad nervosas bacciferas debent relegari.

Pag. 306. Hedera terrestris vulgaris quum sit galeata, verticillata, ad classem galeatarum verticillatarum debet remitti. Quare Bauhinus hîc collocavit post Hedera Corymbosam; nullam ego reperio congruentiam nisi in serpendo, similitudinem: Ita infinitæ congeneres (etiã si natura diversæ) à nascendi modò disponderentur. Ibidem pag. 306. Cymbalaria, cum florem calcari donatum habet, qui compressus rictum edit, & capsulam duplici loculamento, constantem; septo membraneo medio, idem diremte præducit. Ut ceteræ omnes Linariæ; porro semina minuta suffusca, ejusdem formæ cum Linariæ semine sunt. Igitur debet collocari inter  
 Linarias:



Linarias: cum doctissimo Fabio Columna. Bis repetitur, hîc & pag. 253. ut supra, loco allegato, ostendimus.

Pag. 306. Balsamina rotundifolia repens, sive mas C. B. Pin. Balsamina Cucumerina punicea Adv. Lob. mas Ger. cum sit Cucumis, ad Cucumeris classem debet referi. Ibidem Balsamina foemina C. B. Pin. foemina Persicæfolia Lob. & Balsamina lutea seu noli me tangere C B. Pin. cum utraque hæc planta, florem gerat calcari, seu Corniculo donatum, rictum habet peramplum paritèr utraque: utriusque flori deciduo, succedit siliqua, quinis loculamentis donata, quæ (maturò semine) tacta sese contrahit, & semina vi spargit. Ad finem siliquosarum, inter siliquosas minùs propriè dictas collocari debent.

Pag. 309. Gramen parnassi, albo simplici, & pleno flore ad Pyrolam referantur. Ibidem Saxifraga rotundifolia alba C. B. Pin. alba Chelidonides Lob. hæc ad Saniculam montanam, ut ante dictum, cum qua omninò quadrat: & (flore & semine) remittatur.

*Pag. 309.* *Chelidonia minor* : cum omnibus suis partibus essentialibus (id est flore & semine) *Ranunculis* quadret, iis debet accenferi, & meritò *Ranunculus grumosa* radice, folio lato, rotundo, (cum doctissimo *Dalechampio*) appellari.

*Pag. 315. Col. 1. Pl. VI.* *Malva folio vario* C. B. Pin. *Malva trimestris* vel *pumila* Clus. nota, *Bauhinum* duas omnino distinctas *Malvas*, pro una & eadem producere : in *Pinace*. Cum *Malva folio vario*, ab ipso depicta & descripta in *Prodromo* sit. Nemo inficias ibit ipsam longè diversam, à *Malva trimestri* seu *pumila* Clus. examinantium iudicium, penes esto veritas; utramque colui, & observavi, quin & ipsissimæ (primò intuitu) figuræ duæ, *Clusii* & *Bauhini* in *Prodromo* : ipsum convincunt.

*Pag. 317.* *Corchorus* sive *Melochia*, cum sit planta filiquosa suo modo (ut *Balsamina*) quæ (maturo semine) filiquam findit quinquefariam : & plurima semina subviridia fundit, ergò collocanda, ad calcem filiquosarum, minùs propriè dictarum.

*Pag. 320.* *Cannabis* malè à verticillatis (etiamsi non sit galeata est tamen verticillata)

lata ) disjungitur. Ibidem Eupatorium Cannabinum C. B. Pin. Eupatorium Avicennæ Col. malè hîc disponitur, cum sit papposa planta, ad papposas (nempè virgam auream ferratulam & cœteras hujus ordinis) referenda.

Pag. 321. Col. I. Pl. I. Cannabina aquatica, folio tripartitè diviso, & folio non diviso C. B. Pin. Eupatorium Cannabinum fœmina Septentrionalium Lobel. Cannabinum Chrysanthemum Tab. hæ plantæ cum sint Corymbifera, ad Corymbiferas remittendæ. Ergò malè hîc (habita ratione nominis Eupatorii, ut, ubique Casparum Bauhinum & Authores, facere observavimus, nulla habita ratione notæ Genericæ & essentialis: quæ toti generi convenire debet) collocantur.

Pag. 321. Eupatorium veterum sive Agrimonia C. B. Pin. Eupatorium Dioscoridis & Avicennæ Colum. & odoratum C. B. Pin. quantum discrepant à duobus præcedentibus Eupatoriis, penes lectorem esto judicium. Ibidem Agrimonoides Colum. foliorum aliquam, cum præcedentibus, Agrimoniis, similitudinem habet: sed semen, C c 4                      florem,



florem, capsulamque seminalem diversimodè factam.

*Ibidem.* Potentilla, cum florem & fructum, capsulamque seminalem, semen, granulatum continentem : ad eundem modum, cum Fragaria sterili, Pentaphyllo, Pentaphylloïde habet : Eisdem jungi debet, nec per se hîc locari.

*Pag. 322.* Dentaria cum sit planta tetrapetala & siliquosa, malè hîc à Bauhino locatur, inter Caryophyllatam & Epimedium, à quibus toto Cœlo differt : ergò siliquosis congeneribus suis, Leucoio, Hesperidi associari debet. Vide pag. 201, 202.

*Pag. 323, & 324.* Pœonia & Staphis Agria, ad venenatas siliquisferas, Aconitum, Delphinium, &c. amendantur.

*Pag. 324.* Leontopetalon, cum siliquosa sit planta, transmittatur ad calcem siliquosarum venenatarum. Ibidem Staphis Agria, cum capsulas seminales, accedentes ad Aconitum habet, cum ipsis, disponatur versus finem ejus sectionis.

*Pag. 326. Col. I.* Quinquefolium fragiferum C. B. Pin. 5. fragiferum Clus. Quinquefolium fragifero affine C. B. Pin. Pentaphyllum



phyllum supinum Potentillæ facie Lobel.  
Icon. cum utraque hæc planta costas longas  
habet, quibus quinque interdum plura,  
folia adhærent, è contrario, inter se folio-  
rum exortu, nascentia: uno extremum clau-  
dente. Potentillæ seu Argentinæ ritu: Ego  
(cum florem & semen, aliorum Pentaphyl-  
lorum more, perficiunt, folia autem aliter  
disposita habent) Pentaphylloïdes nuncu-  
pari velim; novum constituendo genus.

*Pag. 326. Col. II. Pl. VII. Quinquefolium*  
*Lupini folio C. B. Pin. Pentaphyllum* *δεξιό-*  
*φυλλον* Thalii est planta filiquosa non legu-  
minosa, proinde hinc averruncanda. Lupi-  
nus peregrinus Pentaphyllos C. B. Pin. Lu-  
pinus Arrabicus sive Pentaphyllum pere-  
grinum Ponæ Italicè, pag. 348. Colum. II.  
Pl. V. eadem planta duobus his suprâ dictis  
locis repetita, non potest pro Quinquefolio  
propriè loquendo accenseri; Pentaphyllum  
esse fateor sed Heteroclitum; multò minùs  
est Lupinus, cum nec florem Papileaceum,  
nec siliquam leguminosam fert.

*Pag. 326. Col. I Pl. III. Tormentilla Al-*  
*pina folio Sericeo C. B. Pin. Candida Da-*  
*lechampi hist. Lugd. cum omnibus suis*  
*partibus*

partibus essentialibus, flore & semine, Alchimillam æmulatur. Rectè concluditur (cum doctissimo Fabio Columna) esse Alchimilla.

*Pag. 327. Col. I. Pl. II.* Trifolium palustre Casp. Bauh. Paludosum Lob. cum Trifoliis leguminosis nil habet affine; nisi quod folia gerat terna: ergò remittendum ad aquaticas plantas, tanquam Heteroclitum.

*Pag. 327.* Trifolium, Medica, Lotus, Melilotus quæ continentur à pag. 327. usque ad pag. 331. ad finem leguminum pag. 353. debent collocari: cum omnia Trifolia sint legumina Trifoliata, aut Trifolia leguminosa, ex florum structura & seminum sapore, cuilibet gustanti & propiùs consideranti innotescet. Nos prolixiùs alibi (de horum Sympathia seu Identitate, quoad notam Genericam & essentialem) tractabimus.

*Pag. 328. Col. I. Pl. VI.* Trifolium montanum Lupulinum III. in Prodr. non debet disjungi à Lupulino vulgari, quamvis montanum: Nam locus non debet considerari ubi spicæ seu capitis similitudo datur.

*Pag. 328. Col. I. Pl. I.* Trifolium pratense luteum, capitulo Breviori C. B. Pin.  
Meleloti

Meleloti exigua vel minor species. Thal. floret ut Melilotus spicatum, semina rugosa dura Meliloti instar, producit; rectè igitur pro Meliloto habenda; cum Trago.

Pag. 329. Col. I. Pl. X. Trifolium album angustifolium, floribus veluti in capitulum congestis C. B. Pin. Dorycnium Monspelien- sium Adv. Lob. cum hæc planta sit Lotus ex appositione foliorum, nempe terna ha- bet in extremo pediculo, bina ad appositio- nem Caulis. Ut cernere licet, quemadmo- dum, in aliis, qua nota distinguitur Lotus. Addenda esset Loto Lybicæ, Dalechampii hist. Lugd. pag. 332. Col. II. Pl. X. & Loto Pentaphyllo filiquoso villosa C. B. Pin. Lo- to Hæmorrhoidali majori seu Trifolio Hæ- morrhoidali majori Park. immediatè ante Pl. IX. in Col. I. paginæ 332.

Pag. 330. Col. I. Trifolium acetosum, etiamque Hepaticum, malè interjiciuntur hîc inter Trifolia leguminosa (quia nil si- mile nisi folia, habent terna communia, cum Trifolio leguminoso) videlicet inter Trifo- lium & Melilotum.

Pag. 331. Col. II. Pl. VI. Lotus hortens- sis odora C. B. Pin. Melilotus vera Tab. singularis



singularis Alpini, Ponæ: est vera & genuina Meliloti species, à spicæ florum, & seminum dispositione, juncto odore: Meliloto, inter Trifolia leguminosa, semper debito.

Pag. 332. Col. I. Pl. VI. Lotus Pentaphyllos vesicaria C. B. Pin. Trifolium Halicacabum sive vesicarium Cam. Omnis Lotus constat quinque foliis, tribus in extremo, pediculi; & duobus parvis, juxta appositionem, ad caulem. Hujus foliorum nervus, medius ornatur, binis ternisve foliolis ex adverso sitis, magno uno & longo extremum, claudente, Anthyllidis, vulgaris etiam ritu. Ergo aptius Loto affinis, Anthyllis Batica vesicaria dicenda; quam Lotus, propter rationem antè dictam.

Pag. 333. Col. I. Pl. XII, & XIII. Rubia latifolia spicata & angustifolia spicata: cum Rubiæ propriè dictæ, nota Generica sit, baccas aut semina rotunda, binatim testiculorum instar; ferre. Legentium judicium, penes sit fides; num spicata major & minor (nisi à dispositione foliorum stellatim radiantium caulem) Rubiæ nomen mereantur.

Pag. 336. Ruta, Thalictrum malè inter stellatas



stellatas (à foliis) Gallium, cruciatam & legumina disponuntur. Cùm Ruta, aptius collocabitur post bicapsulares cum, sit Tetralobos seu Quadricapsularis. Thalictrum amandetur, ad Umbellarum finem, inter alias affines: propter similitudinem foliorum cum quamplurimis, Umbellarum, cœterâ nil habent affine quoad partes essentielles, flores, & semina, binatim semper juncta, quod contingit in omnibus & singulis Umbellis, cujuscunque, sint semina figuræ, ut clariùs patefiet in Tabulis nostris cognationis, in divisione Umbellarum.

*Pag. 337.* Faba malè recencetur, pro legumine Capreolis donata: ergò ad legumina, filiquas erectas habentia; nobiscum referatur, Lupinum, Glycyrrhizam, Galegam.

*Pag. 338. Col. II.* Faba sylvestris fructu rotundo atro C.B. Pin. sylvestris Dod. nulla Fabarum, Capreolis donatur; hæc Capreolis scatet, proinde rectius vicia omnium maxima diceretur (mea opinione:) adde quod nec filiquam seu folliculum; nec fructum fert Fabæ in modum: sed Viciæ omnino æmulum.

*Pag.*

*Pag. 343. Col. I. Pl. X.* Pisum cordatum Adv. Lob. Vesicarium fructu nigro, alba macula notato C. B. Pin. malè inter legumina Papiliacea & filiquosa seu folliculacea collocatur; cum, leguminibus, nec flore nec filiqua quadrat; quippè vesicam, nucis juglandis magnitudine trifariam divisam, terna in se continentem semina producit, rotunda nigra, cor album lateralitèr, referentia; nec Masticata, leguminis habent saporem: collocetur post Convolvulos cum Nasturtio Indico. Heteroclita etiam est planta, hoc sufficit impræsentiarum.

*Pag. 348. Col. II. Pl. V.* Lupinus peregrinus Pentaphyllos, bis repetitur. Vide suprà pag. 326. Col. II. Pl. VII. Quinquefolium Lupini folio C. B. Pin.

*Pag. 348.* Lupinus malè illic disponitur, cum debeat adjungi Fabæ; quippè quod filiquas habet erectas; per intervalla, tumidiusculas ubi sunt semina, depressas in interstitiis. Ibidem malè dirigitur, seu locatur, Fœnugræcum, cum sit Trifolium, ergo amandetur ad Trifolium cujus est species.

*Pag. 349. Col. I. Pl. II.* Astragalus Monspelianus Clus. hist. Securidaca lutea minor, Corniculis

Corniculis recurvis C. B. Pin. hæc est planta annua, florem fert Ochroleucum seu pallidè luteum. Secundus est Astragalus Monspelianus Johan. Bauh. purpureus, hist. Lugd. pag. 351. Col. II. Pl. V. an Astragalus parvis foliis Hedysari, seu Securidacæ hist. Lugd. in Appendice. Hic, est valde restibilis, in multos annos durat : flore est elegantè purpureo cœruleo. Tertius est Astragalus erectus annuus nobis ; Vicia Sesamacea Apula Col. Ornithopodio, affinis hirsuta, fructu stellato C. B. Pin. pag. 350. Col. II. Pl. V. Hæc flore est etiam pallidè luteo, siliquas fert triplè majores siliquis, priorum. Nota stellam leguminosam & Viciam Sesamaceam Apulam Col. esse duo distincta & divisa legumina, etiamsi pro uno & eodem à Bauhino ponantur. Quartus Astragalus est perennis, flore luteo pallido nobis : Glycyrrhiza sylvestris floribus luteo pallescentibus C. B. Pin. pag. 552. Col. II. Pl. III. Astragalus Monspeliacus Joh. Bauh. citatur à Casp. Bauhino in Pinace, pag. 351. Col. II. Pl. V. Astragalus villosus floribus globosis C. B. Pin. purpureus hist. Lugd. non est idem, cum Astragalo Monspelliano Clus.



Clus. ex supra dictis. Hæc quatuor legumina, cum sub eodem vexillo militent, ad idem & novum constituendum genus elegimus; ex longe diversis (ut observare licet in Bauhino) locis cœgimus, à forma seminum, Officula Sesamacea, articulis digitorum pedum, substrata, referentium. Legumina Sesamacea seu Astragaloïdea, siliqua Gemella: Seu brevius, Astragalus siliqua Gemella dici possunt. Nec norim, in tota familia leguminum, folliculaceorum caterva: præter hæc quatuor, quæ siliquas triangulares curvas & inflexas, falcis instar, duplici Serie junctas, duplici membranacea Tunica, duplicem dirimente seriem seminum seu fructuum. Hisce addi potest; sed alterius figuræ, Hedysarum peregrinum, seu Securidaca peregrina Clus. hist. quatenus etiam folliculum profert, Spadæ Piscis, Rostri instar, aut Serræ utrinque Dentatæ, similem: duplicem etiam seminum Seriem, planorum fert. Sicque constituto novum genus.

1. Astragalus Monspessulanus perennis, flore purpurocœruleo: nobis. Purpureus hist. Lugd. vide pag. 351. Col. I. Pl. V.
2. Astra-



2. Astragalus Monspelianus annuus;  
flore luteo pallescenti: nobis. Mon-  
spelianus Clus. hist. vide pag. 349.  
Col. I. Pl. II.
3. Astragalus erectus annuus, flore luteo  
pallescente: nobis. Vicia sesamacea  
Apula Col. vide pag. 350. Col. II.  
Pl. V.
4. Astragalus reptans perennis, flore  
Ochroleuco seu luteo-pallido: nobis.  
Glycyrrhiza sylvestris sive Glaux vul-  
garis. Vide pag. 352. Col. II Pl. III.
5. Astragalus, siliquis Serræ similibus:  
nobis. Securidaca peregrina Clus. hist.  
vide pag. 349 Col. I. Pl. III.

Proprium est & leguminosæ illi plantæ  
(quæ Tragacantha dicitur) siliquas seu follicu-  
los, semiunciales, inter folia & aculeos, (post  
flores à longo tempore deciduos) producere.  
Duplici Serie seminum & ideo prioribus quo ad  
siliquarum, & seminum inibi contentorum,  
similitudinem: valdè accedit. Nec unquam  
memini hujus Farinæ, septimum legumen ob-  
servasse.

Pag. 349. Securidaca vera: folliculam  
longè diversum habet ab Astraguli Mon-

D d peliani

peliani Clus. folliculo; nota, ab utrâque : securidacam dumetorum, filiquis suis articulatis, multum differe. Nos quemadmodum superiore observatione novum constituimus genus Astragalorum, ab identitate seu similitudine non solum florum, (qui in omnibus quasi leguminibus sunt pares) sed & filiquarum Gemellarum. Et hîc idem intendimus legumina filiquis articulatis, longis rotundis, striatis, prædita, eodem revocare & communi nomine Baptizare, etiamsi sub diversis, apud Autores nominibus, diversis in locis reperiantur.

1. *Securidaca dumetorum* major flore vario C. B. Pin. vide pag. 349. Col. I. Pl. IV.
2. *Securidaca Enneaphyllos*, filiquis in summitate: nobis. Lotus malè Dalechamptio; nec benè ferrum equinum. C. B. Pin. ibidem Col. II. Pl. IV. cum sequenti.
3. *Securidaca Valentina*: nobis. *Polygala Valentina*; i. Clus. vid. 349. Col. II. Pl. II.
4. *Securidaca Scorpioïdes* major: nobis. *colutea Scorpioïdes* Ad. Lob. vide pag. 397. Col. I. Pl. II.

*Omnes*

Omnes hæ plantæ (quævis ab Authoribus variis in locis ut à Bauhino variè denominentur) leguminosæ sunt, habentque pro nota essentiali & Generica, hæc, quòd omnium & singularum, sub ipsarum capitulis contentarum, siliquæ, exsiccatae, per articulos rumpuntur, in singulis interstitiis, singula semina oblonga, Cylindriaca continentur.

Pag. 350. Tribulus terrestris, malè hìc inter legumina propriè dicta collocatur, cum nec florem, nec siliquam, nec semen, habet conformia, ipsis. Ideò propter dispositionem foliorum, Rachi seu nervo medio adhaerentium, uno extremum Claudente, (leguminum multorum more) ipsis adjungatur, Tribulus terrestris, sub finem.

Pag. 350. Col. II. Pl. V. Stella leguminosa Lob. non est eadem cum Vicia Sesamacea Apula Col. ut cernere licet plantas crescentes: imò & Icones Clus. & Columnæ differentiam facillè detegunt.

Pag. 360. Malè collocavit Bauhinus, Herbam minosam post Polypodium, inter idem & Muscum, cum sit legumen, ad legumina esset referenda.

Pag. 376. Cardui cum sunt plantæ capi-

tata perfectæ, quarum flores abeunt in pappos, Spinis ut plurimum armantur. Ergò malè locantur post Muscum, Fucum & Fungum (imperfectas plantas;) debebant collocari immediatè post capitatas pappascentes, non Spinosas ut Jaceam, Stœben, Cyanum, Centaureum majus, &c. Sola hæc est differentia, quòd maxima pars Carduorum sit Spinis armata, passim, exceptis quibusdam. Quin et sunt quædam genera Carduorum, quorum capita non abeunt in pappos, sed solida efficiunt semina; & idcirco sunt Cardui minùs propriè dicti. Ut clariùs postea innotescet.

*Pag. 382.* Bauhinus, inter Carduos Sphærocephalos (saltèm in eâdem sectione) Collocat Carduum Erioccephalum; sed Carduus Sphærocephalus non est Carduus propriè dictus (ut clarissimè docebimus, in doctrinâ de Carduis, in Tabulis nostris cognationis) ergò malè, his adjungitur Carduus Erioccephalus (cum sit perfectè Carduus) Carduo Sphærocephalo, ejusq; generi, quia ei deest secunda conditio ad constitutendum Carduum propriè dictum.

*Pag. 383.* Acanthus sativus & aculeatus

non



non sunt Cardui, nec à flore nec à semine nec ab aliarum partium, suarum dispositione, alterutè est Carduus. Ideò malè in medio Carduorum disponuntur : substitui possunt ad finem Carduorum, quia Acanthus aculeatus est spinosus. Sunt enim à tota facie, florum, seminum & capsularum seminalium formâ & figurâ plantæ peculiare & heteroclitæ.

Pag. 386. Col. II. Pl. IX. Eryngium arvense foliis Serræ similibus C. B. P. Eryngium quartum Dod. malè hic inter Eryngia disponitur, cum ne vel minimam notulam fert ejusdem. Perfecta est umbellifera planta, & rectè ab Oculatissimo Dalechampsio in historia sua Lugd. Ammi quorundam nuncupatur. Nota insuper Eryngium, omnesque ejus species non esse Carduos propriè dictos, quia eorum flores non abeunt in pappos, quæ est secunda conditio requisita ad Carduos propriè dictos constituendos. Ut prolixius postea significabimus.

Pag. 386. Camphorata malè inter Ericam & Sabinam collocatur, cum sit herba, perennis, una in agris Galliæ Narbonensis & Gal-

Io-provinciae frequens reperitur. Altera annua est, & passim in Vinetis cernitur.

*Pag. 387. Col. I. Pl. VI.* Carduus Stellatus luteus Cyani foliis C. B. Pin. Spina Solstitialis Dod. confundit hic Bauhinus, Spinam Solstitialem Dodonæi, cum Carduo Stellato minore Col. qui, & Spina Solstitialis mitior Apula, eidem nuncupatur, & planè est omninò diversa à priorè, quoàd alas magis undulatas, capita habet minora, & semina papposa paritèr minora, utrumque colui, ad aliquot annos.

*Pag. 338.* Tragacantha est planta leguminosa: siliqua seu folliculo brevi Gemella prædita, duplicem Seriem seminum, continente, proindè ad legumina Astragaloïdea, seu Astragalos siliquâ Gemellâ, referri debet. Vide Astragalos, suprà; non autem ad Carduos pertinet, nihil enim conforme habet cum ipsis: Summitates Ramorum seu Nervorum sustinentium, multa folia hinc indè è Regione disposita: Exsiccata, pungunt. Quaproptèr Bauhinus hic collocavit, non video: remittatur ad suas congeneres plantas, (legumina videlicèt Sefamoïdea .s. Astragalos siliquâ Gemellâ.) novum genus facientes,

facientes, ex nobis. Ibidem Col. II. Pl. II. Poterio affinis spinosa foliis Pimpinellæ C. B. Pin. Pimpinella spinosa Cam. χαλκίον Anguillaræ Poterium Dalechamp. in hist. Clus. Hæc est vera Pimpinella, ut cuilibet intuenti cernere licet, ex dispositione foliorum, modo florendi; semina globatim rotunda fert. Ejus Nervi exsiccati pungunt; non tamen Carduis debet associari, sed cum Pimpinellâ disponi.

*Ibidem.* Anonis haud appositè adjungitur Carduis, propter Nervos ad extremum pariter exsiccatos (vulgaris saltem Anonidis) pungentes. Sed cum Anonis sit Trifolium, ab omnibus partibus essentialibus, debet Trifoliis annumerari, ut clariùs demonstrabimus: cum Trifoliorum diversa subalterna genera, methodicè per Tabulas cognationis exhibuerimus.

Pag. 389. Cytisus Maranthæ Lugd. incanus siliquis falcatis C. B. Pin. Cytisus omnis vulgò sic dictus, siliquas profert longas, compressas, planas, aut hirsutas, seu hirsutie pubescentes, continentes in se semina compressa tumidiuscula: Genistæ vulgaris penè ritu. Atqui hic siliquam producit parvam,

D d 4

curvam



curvam seu falcatam, quæ ex Libro naturæ, propius accedit, ad Medicam falcatam: quod me impellit ad judicandum facilius & certiùs, Medicæ frutescentis esse speciem, quam Cytisi, utraque & Cytisus & Medica est Trifolium; ergò cui magis accedit in siliquis ei est magis affinis ex doctrina nostra. Et si, Medica, frutex incana perpetua fronde virens appellaretur: per me non stabit. Judicent; qui hæc legerint, an rationi consentaneum sit, quod dico.

Cytisus incanus Creticus C. B. Pin. Ebenus Cretica Prosp. Alpin. exot. Ebenus secundus floribus purpureis Joh. Bauh. à quo figuratur. Ex antè dictis de Cytiso Maranthæ. Hæc planta non est Cytisus: sed species elegantissima Lagopi maximis; & potest dici Lagopus Creticus frutescens, folio candicante. Semen collègi apud Dominum Morinum natu minimum, atque satum semine, ex Italia ad me missò è terra pullulavit, sed rigore hyemis sequentis, periit; vidi ad aliquot annos, apud Dominum Morinum natu minimum, habitantem in suburbio Diyi Germani.



*Pag. 520. Col. II. in appendice C. Bauh.*  
*ad Pin.* Doronicum Americanum lacinia-  
 to folio C. B. Pinacis appendice : Cum om-  
 nis Doronici ( propriè dicti ) flos abit in  
 pappos. Quæ est nota Generica & essenti-  
 alis Doronici. Hujus autem plantæ semina  
 sunt solida, quadrangula Chrysanthemi ad-  
 instar. Quarè potiore jure, Chrysanthemum  
 Americanum majus, laciniatis foliis appel-  
 labitur. Multò minùs accedit ad Aconiti  
 classem : quippè Aconitum florem fert Cu-  
 cullatum, cui succedunt capsulæ plurimæ  
 membranaceæ : minuta semina, aspera, con-  
 tinentes, ideò non potest dici, Aconitum He-  
 lianthemum Canadense : ut volunt alii.

---

Animad-





Animadversiones

IN

*Tres TOMOS Historiæ*

UNIVERSALIS

PLANTARUM,

JOHANNIS BAUHINI.

*Animadversiones in Tomum primum, Hi-  
storiæ universalis Plantarum, Jo-  
hannis Bauhini.*

Pag. 374.  
Partis Se-  
cundæ.



YTISI facie, Alyssum  
fruticans Lobel. quo-  
rundam. Malè inter  
Cytisos collocatur à  
Johanne Bauhino : cum sit siliculosa planta,  
non verò leguminosa. Ibidem : Trifolium  
fruticans

fruticans: malè collocatur inter legumino-  
sas plantas, cum sit Baccifera planta Trifo-  
lia: ad Jasminum referri debet.

*Pag. 520. Partis primæ.* Vitis Idæa an-  
gulosa describitur, appingitur autem, Echii  
aut Anchusæ Icon.

*Pag. 460. Part. pr.* Polygonum marium  
angustifolium Dalechampii; malè inter  
Arbores collocatur, cum sit suffrutex tan-  
tùm.

*Pag. 553. Part. pr.* Sambucus Rosea de-  
scribitur; apponitur autem Sambuci aqua-  
ticæ Icon. eâdem figurâ, ad *pag. 552.* trans-  
positâ, & Roseæ, figurâ ad *pag. 553.* transla-  
tâ, tolletur lapsus.

*Pag. 598. Part. pr.* Dorycnium Imperati  
& Alypum Monspelianum, malè collocan-  
tur hic, cum sint tantùm plantæ (ut & plu-  
rimæ aliæ suffrutices illic collocatæ) inter  
Arbores.

*Animad-*



*Animadversiones in Tomum Secundum  
Historiæ universalis Plantarum; Jo-  
hannis Bauhini.*

*Pag.* **C**ISTUS Ledum IX, Clus. & Ledum  
12. Thymi foliis Clus. nec à flore nec  
à capsulâ seminali aut semine, sunt habendi  
Cisti.

*Pag.* 23. Rosmarinus sylvestris quorum-  
dam; malè sic nominatur, cum à flore &  
capsulâ seminali, sit perfectus Cistus. Idem  
dicendum de duobus sequentibus *pag.* 24, &  
25. nil enim habent essentialitèr, cum Rose-  
marino, nec in flore nec in capsulâ seminali,  
commune. Ibidem: Libanotidis species  
Rondeletii, est Anchusa lignosior Lobelii,  
quarè ad Anchusam amandetur, nullâ habi-  
tâ ratione conformitatis in foliis.

*Pag.* 354. Lotus Corniculata glabra, &  
hirsuta minor, describuntur: duæ itidèm  
apponuntur figuræ, quarum prior est vitio-  
sa, (quippè Medicam cochleatam, hispidam  
refert) posterior est Loti glabræ, vera fi-  
gura.

*Pag.*

*Pag. 391.* Epimedium quorundam, Columnâ primâ, ejusdem paginæ, describitur : appingitur autem Anonis seu Resta bovis : & Columnâ secundâ ejusdem paginæ, Anonis describitur. Appingitur Epimedium : hæ duæ figuræ transferantur, hujus eò, illius huc, translata figurâ : tolletur lapsus.

*Pag. 398.* Penultimâ paginâ adversa Libri XVII. Caryophyllata vulgaris flore luteo parvo describitur : appingitur Hepatica Trifolia.

*Nota à pag. 398. Sedecim paginas ad finem istius Libri, eodem numero continuo notari.*

*Pag. 459.* Gramen repens cum paniculâ Graminis Mannæ describitur. Securidacæ appingitur figura.

*Pag. 446.* Gramen versicolor describitur : & *pag. 476.* Gramen striis pictum describitur. Eadem figura, duabus diversis descriptionibus, appingitur.

*Pag. 491.* Gramen majus aquaticum Lob. describitur, Appingitur autem Potamogeton.

*Pag. 508.* Gramen Triglochin : & Hyacinthi parvi facie, Gramen Triglochin. *U-*  
*nus*

nus ejusdemque plantæ, Graminis Triglochin videlicet florentis, & semen ferentis, figura: pro duabus, toto Cœlo differentibus plantis, ponitur; duabus diversis assignatis descriptionibus.

*Pag. 590.* Leucoii Hexaphylli, duæ apponuntur Icones: ultima vitiata est, loco floris appingitur bulbus.

*Pag. 611.* Describitur Paucratium Monspessulanum; appingitur Phalangium non ramosum.

*Pag. 803.* Campanula Lychnidea: Non est Lychnis, quia non habet florem quinque petalis conflatum; sed integrum seu Monopetalum, ut Convolvulus. Et si lactescit, est Convolvulus, mea opinione, nec florem producit Campanulæ in modum, quia, omnis Campanulæ. s. Trachelii Campanulati flos, in margine est quinquepartitus.

*Pag. 810.* Describitur Rapunculus flore globoso purpureo. Appingitur Campanula minor rotundifolia Alpina Bauh. in Pin.

*Pag. 814, & 815.* Jasminum Mexicanum sive flos Mexicanus multis. Malè collocatur post bicapsulares plantas: Cum sit planta sui generis: sive Heteroclita,

*Pag.*

*Pag. 816.* Campanula Serpilli folio Joh. Bauh. malè etiam hìc collocatur, post digitalem seu bicapsulares, quum cum Campanula p. 796, & 797. in initio Libri XX<sup>o</sup>. debet poni.

*Pag. 817.* Campanula Linifolia lutea : cum in hallucinationibus Casp. Bauh. in Pin. à nobis exhibitis, suprâ, clarè satis docuimus, esse Linum; non potest esse Campanula, cum non lactescit, nec capsulam habet seminalem, nec semen Campanulæ, sed Linî; ergò ut superiùs diximus, ad Linum esset referenda hæc planta.

*Ibidem.* Quo jure Soldanella montana, hìc collocatur à Joh. Bauh. non satìs comprehendo; cum ad calcem filiquosarum aptiùs reduceretur.

*Pag. 837.* Turritis pulchra nova : non habet florem tetrapetalum, nec est filiquosa planta : ergò malè inter filiquosas collocatur.

*Pag. 898, & 899.* Telephium scorpioides, & scorpioides ex sententiâ veterum; cum flores gerant Papiliaceos, ut cœtera legumina, seminaque articulatim oblonga, perfectum leguminum saporem Masticata, suggerentias



aggerentia : Amandari debent ad finem plantarum filiquosarum Papiliacearum ; leuminum scilicet. Non autem ad finem filiquosarum plantarum, tetrapetalarum. Ibi-  
lè, describitur Scorpioïdes montanum, appingitur Graminis alicujus figura. Ibi-  
dè : Hypecoon filiquosum describitur. Papaveris malè picti, sativi, appingitur fi-  
gura.

Pag. 902. Coralloïdes minor bulbifera describitur. Apponitur Rhodia Radix ex Trago.

Pag. 903. Lysimachia lutea describitur. Appingitur autem Nasturtii figura.

Pag. 927. Nasturtium vel Thaspi mari-  
timum describitur. Graminis Sparti autem  
apponitur figura.

Pag. 939. Draba multis, flore albo descri-  
bitur. Duæ autem figuræ, diversæ appo-  
nuntur, Drabæ videlicet luteæ, filiquis stri-  
atissimis Cam. & Nasturtii Babylonici Lob.  
quarum prior (quia filiquosa) est rejicienda.  
Altera (quia filiculosa) est vera & genuina.

Pag. 941. Dentillaria Rondeletii ; cum  
non sit planta filiculosa (quamvis caustica)  
alibi debet poni.

*Pag. 982.* Melochia, sive Corchorus; cum sit planta filiquosa, Heteroclita: Ad finem plantarum filiquosarum tetrapetalarum, debet poni. Non immediatè ante Lapathum propter usum, quia est Olus Judaicum.

*Pag. 984.* Lapathum vulgare, folio obtuso describitur; appingitur Lapathi minimi Tab. figura seu Icon.

---

*Animadversiones in Tomum Tertium Historiæ universalis Plantarum: Johannis Bauhini.*

---

*Pars Prima.*

*Pag. 6.* SCABIOSA peregrina rubra, quibusdam Indica describitur: At figuratur Circium.

*Pag. 12.* Scabiosa globularis, quam ovinam vocant: Hæc inter Scabiosas non debet locari; cum omnes conditiones, Rapunculo essentiales possideat (nempe lætescit, florem

florem habet Corniculatum, multorum aliorum Rapunculorum more : semenque producit subrufum, pellucidum) ad Rapunculorum classem, releganda esset hæc planta.

*Pag. 13.* Aphyllantes seu Globularia Bellidi similis, & Aphyllanti affinis, Scabiosa quinta Clus. Bellidi affinis. Hæ duæ, cum non habent notam Genericam, Scabiosæ; sed omninò accedunt Bellidum classi, aptius eò relegantur.

*Pag. 25.* Xeranthemum seu Ptarmica quorundam, & *pag. 26.* Xeranthemi fortè species & Catanance Dalechampii, flore Cyani, folio Coronopi, & *pag. 27.* Catanance affinis, Sesamoides parvum, flore magis completo Cam. Omnes hæc plantæ, cum non pappescunt, non fuissent hîc collocandæ; Xeranthemi species ad Corymbosas, solida producentes semina amendantur. Catanance utraque, ad Cichorii genus ( quippè lactescit, & Solida producit semina, non autem papposa) cujus, ex nostrâ doctrinâ superius traditâ in hallucinationibus Caspari Bauhini, est vera & genuina species.

*Pag. 30.* Scabiosa squammata argentea. Malè à Johanne Bauhino, pro Scabiosa re-



cenſetur, cum Scabioſæ caput non abit in pappos, ſed in Solida ſemina. Hujus autem abit in pappos, ergò eſt aut Jaceæ at Stœbeſ ſpecies.

*Pag. 71, & 72.* Spina alba, quibuſdam capite Echinato & Echinopus minor, vulgò Authoribus, Cardui Sphærocephali dicuntur. Itè*m* *pag. 73, 74, & 75.* Dipsaci ſpecies malè hìc collocantur, in medio Carduorum propriè ſic dictorum : quia non abeunt in pappos eorum capita, ut omnis Cardui perfecti caput: Suntque minùs propriè Cardui, ut & Eryngium, Scolymus : quod alibi clariùs deteximus. Idem eſto judicium de Spina lutea ſeu Scolymo, *pag. 84.* & de Eryngio *paginis 85, 86, 87, & 88.* Amendantur ad calcem Carduorum propriè dictorum. Nota inſupèr *pag. 86.* Eryngium cœruleum deſcribitur à Johan. Bauhino, & Plomos Lychnitis appingitur.

*Pag. 106.* Crithmum marinum tertium, Mattheolo flore luteo Bupthalmi; cum ſit planta Stellata pappescens, ad Stellatas pappescentes debet relegari, non autem hìc in medio plantarum Corymbiferarum .ſ. Corymbosarum collocari: quæ Solida anguloſa producunt ſemina.

*Pag.*



Pag. 108. *Helenium* seu *Enula Campana* (per antedictam rationem) ad pappescen-  
tes congeneres debet amandari, non autem  
hïc locari; ut alibi in hallucinationibus  
Casp. Bauh. observavimus.

Pag. 113. *Bellis* flore viridi describitur.  
*Thlaspios*, *Myagri* aut potiùs *Erucae* pere-  
grinæ Clus. appingitur figura seu Icon.

Pag. 144. *Ageratum* purpureum *Dale-*  
*champii*; cum non sit corymbosa planta,  
malè hïc collocatur. Ad finem *Euphrasie*  
cum *Hyslopifolia* Bauh. in Prodr. amande-  
tur.

Pag. 151. *Heliochrysos* *Tragi* sive *Lina-*  
*ria* tertia; cum hæc planta pappescit & flo-  
rum tubulos, virgæ aureæ in modum pro-  
ducit; virgæ aureæ sit species, *Linariæ*  
foliis. Sumendo denominationem à potiore  
& nobiliore parte, scilicèt florum seu flo-  
rendi modo. Nec *Linaria* debet appellari,  
ut prolixè satis in hallucinationibus suprâ  
exhibitis in capite Bauh. in Pin. de *Linariâ*  
docuimus.

Pag. 163. *Pilosella* *Phlomodis* exotica;  
cum lactescit & pappescit, debet ad suæ  
sortis familiam relegari: nempè *Chondril-*

lam, Hieracium, Pilosellam, Dentem Leonis, &c. lactescentes, pappescentes.

Pag. 195. & indè ad pag. 200. Quà ratione, ductus Joh. Bauhinus, subjungit Rutam Corymbosis, non capio; cum Rutæ omnis, involucrum sit quadricapsulare. Multò magis ipsum miror, dum pag. 201. usquè ad pag. 206. collocat Fumariam. Quin & in hujus Serie disponit Ranunculi speciem, Muscatellinam, à denticulatione, (junctâ quâdam cavitate) radicis, nullâ habitâ ratione floris & seminum, nempè notæ essentialis. Deindè, quare subjungit fini Libri XXVI. Melanthium, & consolidam regalem, non video; cum sint aliò à nobis aptius relegandæ.

*Tomii tertii pars Secunda.*

Pag. 6, **A** NETHUM & Anetho similis  
& 7. **A** planta, semine Lato laciniato; cum sint Umbellæ, semine membranaceo subrotundo præditæ: Malè inter Fœniculum & sequentes Umbellas (quippe semine striato donatæ sunt) collocantur.

Pag.

*Pag. 8.* Millefolium aquaticum, Foeniculo simile umbelliferum; non est perfecta Umbella. Millefolii aquatici species est: ergò ad aquaticas esset mandanda.

*Pag. 9.* Describitur Daucus pratensis Dalechamp. foliis Millefolii: appingitur Filipendulæ figura seu Icon.

*Pag. 23.* Cuminum sylvestre primum valdè odoratum, globulosum, non est Umbella propriè dicta, (quia non habet bina semina simul juncta, quæ est nota Generica & essentialis toti Umbellarum Serei conveniens) ut in hallucinationibus Casp. Bauhini, suprâ satîs dilucidè docuimus.

*Pag. 33.* Sefeli Massiliense nuperorum folio aliquatenùs simili visnagæ; cum semina habet membranacea, oblonga; ad sui generis Umbellas (non autem inter Umbellas semine striato tumidiusculo ditatas) referri debet. ut clariùs in universali nostrâ Umbellarum distributione deducemus.

*Pag. 36.* Peucedanum malè itidèm, inter Umbellas, semine striato tumidiusculo donatas, locatur: ex dictis suprâ. Deniquè adedò confusè Umbellas disponit Joh. Bauhinus: ut impossibile sit ipsas corrigere



perfectè, quoad Tabulas nostras cognationis, seu affinitatis exhibuerimus.

Pag. 40, & 41. Libanotis Cachryophoros, quibusdam floribus luteis & Libanotis Cachrys Hispanica; cum semen gerant fungosum exterius ad nucis parvæ Myristicæ magnitudinem, & figuram ovalem: ex quâ notâ peculiari ego creo novum genus Umbellarum; quod Cachrys seu Libanotis Cachryopfera appellabitur. Ut clariùs eluceſcet, ex divisione Umbellarû, in decem classes distribuendarum; sic à naturâ notatarum, ut apparebit in Tabulis nostris cognationis.

Pag. 43. Nota Joh. Bauhinum à pag. 43. ad pag. 53. duo genera Umbellarum inadvvertentèr confudisse, quorum unius semen est compressum, membranaceum, subrotundum ut serularum omnium. Alterius semen est alâ foliaceâ membranaceâ cinctum: ut Thapsiæ ejusque specierum omnium.

Pag. 64. Pastinacæ sativæ, sive Carotæ rubræ, luteæ & albæ ultima Icon. ex tribus; non indigitat Pastinacam tenuifoliam; Pastinacam potiùs latifoliam, seu Elaphoboscum Matth. representat. Ideò malè pro Pastinaca tenuifolia, hîc ponitur: quare ad



ad pag. 151. debet referri ; ubi eadem Icon. cum alterâ ejusdem speciei conspicitur.

Pag. 74. Percipier Anglorum quibusdam ; cum sit Alchimillæ species (ut in hallucinationibus Casp. Bauhin. clarè satis, suprâ docuimus) non debet inter Umbellas collocari.

Pag. 79. Gyngidium Matth. cum sit semine minore striato, foliis tenuissimè dissectis, præditum. Malè à Joh. Bauhino inter Umbellas rostratas Scandicem, Myrridem ; & Umbellas aculeatas, Caucalidem scilicèt seu Lappulam (ut cum Johanne Bauhino loquar) disponitur.

Pag. 83. Caucalis Hispanica semine rugoso, & ab illâ paginâ prædictâ, usquè ad pag. 86. Umbellæ omnes illic contentæ : (cum nota Caucalidis seu Lappulæ : est, semine aculeato, seu hispido donari, ut prolixius alibi trademus, ex Libro naturæ instructi) semine foliaceo, seu membranaceo subrotundo ditantur, sub eodem vexillo cum congeneribus suis debent Militare. Videlicèt Sphondylis, Pastinaca sativa latifolia, Panace peregrino & cœteris (id genus) aliis cognatis, à naturâ signatis : Ut  
magis

magis dilucidè offeremus, in Tabulis affinitatis nostris.

Pag. 91. Coriandrum: Coriandrum minus odorum, & Coriandrum sylvestre; cum genus Umbellarum per se constituunt, nempe semine rotundo testiculato præditum: Malè hîc collocantur cum per se debent locari. Nota Umbellas sequentes usque ad *paginam* 113. esse omnes semine striato minore præditas; quæ non debebant disjungi à consortibus præcedentibus, semine itidem striato donatis.

Pag. 113, usque ad pag. 120. Malè Sanguisorba ejusque species hîc collocantur; cum non sint Umbellæ propriè dictæ, sed plantæ spicatæ, aliquam in foliorum, conformationem cum Pimpinellâ, Saxifragâ umbellata habent. Idèd rejiciendæ essent ad calcem Umbellarum propriè sic dictarum (propter similitudinem foliorum) cum Filipendulâ, Barbâ Capræ, Valerianâ Græcâ, Thaliâtro, &c. ejusdem Farinæ. Omnino, non fuerunt disponendæ à Joh. Bauhino inter Umbellas semine minore striato ditatas.

Pag. 137. Lasepitiu, propriu constituit genus Umbellarum: Quippè ejus semen, pluribus

ribus alis, foliaceis seu membranaceis, alæ molendinæ fluviatilis instar, (quandò binatim jungitur ante exsiccationem) constat. Quâ notâ essentiali & Generica, indigitatur peculiare hoc genus Umbellarum.

Pag. 149, 150, & 151. Pastinaca sativa latifolia: cum suæ sortis Umbellis lobatis, semine foliaceo, compresso, subrotundo præditi (ut suprâ dixi) disponi debuit. Non inter Umbellas semine striato minore ornatas; ut Sisarum post se, & Levisticum ante se.

Pag. 164, & 165. Libanotis Theophrasti, Sefeli Æthiopicum Mattheolo; & Libanotidi Theophrasti quorundam valdè similis; Costus amara dicta semine crispo: Hæ duæ Umbellæ, ex Libro naturæ, Læserpitii, gerunt tesseram (id est semina sunt ejusdem formæ) ergò jure merito, à nobis recensentur Læserpitia.

Pag. 183. Phellandrium, vel Cicutaria aquatica quorundam non est Umbella propriè loquendo: Quia omnes Umbellæ, habent bina semina simul juncta, cujuscunque figuræ aut formæ sit semen; atque propter defectum hujus præcipuæ, universalis



salis & essentialis conditionis; minùs propriè dici debet Umbella; In cœteris omnibus, est Umbellæ æmula, hæc Cicutaria aquatica.

*Pag. 186.* Thapsia latifolia & Carotæ facie, semengerunt striatum, oblongum; alâ membranaceâ cinctum; Quâ notâ peculiari distinguitur, ab omnibus subalternis generibus Umbellarum: & ideò nos sic distinguemus in Tabulis (exhibendo Genericam & essentialem hanc notam;) nostris distributivis, Umbellarum: confusè omninò ab Authoribus, hucusque exhibitarum. Nota insupèr *pag. 50.* Thapsiæ majoris seu Turbith Garganici, semen latissimum benè repræsentari: Sed vitiosè Sileris aut Cachryos, Peucedani foliis, appingitur folium.

*Pag. 189.* Filipendula describitur; Dauci autem pratenfis apponitur figura.

*Pag. 193.* Oenanthe Myconi: Malè hic, inter Umbelliferas, disponitur; cum sit Ranunculi, Asphodeli radice species; ut ex flore & semine, totaque facie apparet. Quare ad Librum XXX. inter congeneres releganda est hæc planta.

*Pag.*



*Pag.* 282, 285, & 286. *usque ad pag.* 287, 288, 289, 290. Sive sub Teucrio, sive Chamædre, omnes hæ plantæ nominentur, sunt veræ & genuinæ Veronica species; quippè sunt tetrapetalæ filiculosæ, septo medio membranaceo, discriminante duplicem Sectionem seminum, ut videre licet in filiculosis tetrapetalis; ut Bursâ pastoris, Thlaspi, Cochlearia, Nasturtio hortenfi, Drabâ filiculosa, Lepidio, Iberide, &c.

*Pag.* 290. Chamædrys Alpina, flore Fragariæ albo describitur: Hormini appingitur figura.

*Pag.* 291. Scutellaria Teucrii facie & *pag.* 293. Scorodotis, seu Scordium folio Salviæ. Nota has verticillatas & Galeatas, ad finem verticillatarum & galeatarum rejici debere. Quia capsulas seminales non more aliarum, quinquesariam in margine divisas gerunt; sed Scutellæ in modum: undè novum genus creavimus ex pluribus hinc illinc, ex Authoribus variis collectum. Vide, & consule hallucinationes Casp. Bauh. à nobis exhibitas.

*Pag.* 307. Verbascum sylvestre Monspeliensium flore luteo hiantes; describitur.

At

At umbellifera appingitur planta, fortè Scandix.

*Pag. 321.* Describitur Galeopsis, sive Urtica iners, &c. & *pag. sequenti* appingitur Balsaminæ Persicæfoliæ (fortè) figura florentis.

*Pag. 323, & 324.* Locusta herba, & Locusta altera foliis serratis: Malè hîc committuntur, ad finem galeatarum, verticillatarum, cum quibus nil planè habent affine; remittantur ad *pag. 212.* & claudant Sectionem Umbellarum; etiamsi non sint Umbellæ perfectæ. Quia non habent bina semina simul juncta, quæ est nota essentialis & Generica omnibus & singulis Umbellis, perfectè sic dictis conveniens. Tamen florent quodammodò Umbellarum more & earundam folia, aliquatenùs Valerianæ Alpinae accedunt.

*Pag. 348.* Flos Cuculi, flore multiplici purpureo, & altero albo describitur. appingitur Alsines minimæ species.

*Pag. 362.* Alsine major, repens, perennis describitur: Apponitur Polygalæ luteæ icon.

*Pag. 364.* Alsine minima describitur: Appingitur

Appingitur odontidis flore pleno Icon. hujus figura ad pag. 348. illius ad *paginam* 364. transferatur, & tolletur lapsus.

*Pag. 366.* Alsinæ foetidæ quodammodò similis laciniata; delineatur seu describitur: Phaseoli autem apponitur figura seu Icon.

*Pag. 367.* Alsine ferrato folio hirsutiori, floribus & loculis Cauliculis adhærentibus; Alsine oblongo folio ferrato, flore cœruleo. Et *pag. 368.* Alsine folio profundè secto, flore purpureo seu violaceo; Item Alsinæ genus, Fuchsis folio Hæderulæ hirsuto: Omnes hæ quatuor plantulæ; cum singulæ singulos edunt flosculos (cujuscunque coloris) quatuor petalis constantes, singulis earum floribus succedunt siliculæ bicapsulares, Veronicæ in modum. Ut satis clarè in hallucinationibus Casp. Bauhini, in Pin. nobis solummodò observatis; ostendimus. Inadvertentè omnes quasi Authores, hucusque has; Alsinæ species constituere. At pro Alsinæ speciebus, non sunt reputandæ; cum Alsinæ flos constat quinque petalis, ad medium bifidis; cui deciduo succedit capsula coni instar. Ergò intuendo Librum naturæ Veronicæ species sunt annuæ: Consule hallucinationes



lucinationes Casp. Bauh. à nobis suprà editas. Muta Alſines nomen, & denominando ipſas, Veronicam; habes naturæ intèntum.

*Pag.* 375. Polygoni, duæ appinguntur Icones, quarum poſterior eſt vitioſa.

*Pag.* 381. *uſque ad pag.* 385. In quibus omnibus continentur Androſæum, Aſcyrum, Hypericum; quæ omnia malè illic conſtituuntur inter Polygonum, & Polygalam: Cum ſint bicapſulares, Pyramidales ſeu Coniformes (quoad involucra ſeminum) eſſent relegandæ ad digitale, Verbaſcum, Blattariam, Gratiolam, &c. ut ſuprà docuimus; in hallucinationibus Casp. Bauh.

*Pag.* 382. Hypericum Aſcyrum dictum, Caule quadrangulo deſcribitur: appingitur Ocymoides non ſpecioſum, ſeu Lychnis ſylveſtris, alba noctiflora Cam. huius Icon. ad *pag.* 344. & illius ad *pag.* 382 transferatur, & ſic tolletur error Joh. Bauh.

*Pag.* 386. Onobrychis lutea Dalechamp. deſcribitur; at appingitur Alſines majoris repentis, perennis, Icon. huius Icon. ad *pag.* 362. illius, ad prædictam 386. transferatur; & inadvertentia Joh. Bauhini auferetur. Nota ibidè inſuper Joh. Bauh. haud appoſitè



positè Polyganon pro Polygala scripisse.

Pag. 410. Pulsatilla alba describitur. Appingitur autem alterius plantæ Icon.

Pag. 414. Ranunculus cum flore in medio folio, radice tuberosa; cum non producat semina Ranunculi in modum, sed Aconiti: Unde à siliquis Aconiti & flore Ranunculi, Aconitum Ranunculoïdes 1. appellamus in hallucinationibus Casp. Bauh. sicut per eandem rationem Ranunculus flore globoso quibusdam, trollus flos pag. 419. à siliquis longis membranaceis Aconitum Ranunculoïdes 2. appellamus: Consule hallucinationes Casp. Bauh. à nobis superius editas.

Pag. 421, & 422. Scrophularia maxima radice fibrosa, describitur; appingitur autem Sideritis Monspeliaca. Nota insuper, malè Scrophulariam inter galeatas verticillatas collocari, cum sit planta bicapsularis ut alibi docuimus.

Pag. 426. Sideritis Monspeliaca describitur; appingitur autem Scrophularia maxima radice fibrosa. Hujus Icon. ad p. 422. & illius ad pag. 426. transferatur, & corrigetur error.

*Nota insuper, quæ stirpes continentur à*

F f

pag.

pag. 421. Libri XXX. usque ad pag. 468. ejusdem Libri, debent referri ad Libros XXVIII, & XXIX. videlicet, quæ continentur à pag. 421. ubi intuenti sese offert *Scrophularia vulgaris major*, usque ad pag. 449. ubi legitur *Bangue*; debent amandari ad Lib. XXVIII. pag. 323. ubi legitur *Galeopsis*. Quippè quod *verticillatæ* & *galeatæ*, *verticillatis* & *galeatis* essent addende. Quæ autem continentur à pag. 450. ubi in conspectum sese dat *Linum*: usque ad pag. 467. ubi legitur *Reseda*: Debent referri ad Libri XXIX. pag. 371. ubi legitur *Numularia*.

Pag. 434. *Gratiola*, malè à Joh. Bauhino (cum sit bicapsularis Coniformis planta, ad *Scrophulariam*; *Verbascum*, *Blattariam*, &c. referenda foret) inter *verticillatas* & *galeatas* plantas disponitur.

Pag. 446. *Urtica minor annua*, hujus Icon est vitiosa.

Pag. 455. *Alfine verna glabra*, malè hîc à Joh. Bauhino collocatur, inter *Lini* species: Quia est perfecta *Alfine* à flore, quinis petalis ad medium bifidis & capsulâ terminali, *Alsinarum* more, factis donata.

Pag. 456. *Passerina Tragi*, & pag. 455. *Passerina*

*Passerina Lobelii* neutra harum est *Linaria*, nec à flore, nec à semine: Nil habent commune cum *Linaria* nisi folia; sunt plantæ sui generis & *Heteroclitæ*.

*Pag. 461.* *Linariæ* similis; duæ adferuntur in medium figuræ, quarum neutra est *Linaria*, prior refert *Polygalam*, Altera est *Anonymos Clus.* seu *Heteroclitæ* cujus folia quodammodò *Linariæ* foliis sunt similia. Idem dicendum venit, de *Linaria belvidere*.

*Pag. 463.* *Antirrhinum* vulgare, hujus tres apponuntur Icones: quarum, prior est *Junci* cum utriculis: (*Casp. Bauh.* in *Prodr.*) Icon.

*Pag. 468.* *Scrophularia minor* Lib. XXX. debet amandari, ad *pag. 420.* ubi legitur *Ranunculus*. Post admissos alios ejusdem generis, in appendice ad *Tomum tertium*, contentos.

*Pag. 471.* *Caltha palustris* flore multiplicato: Cum siliquis plures oblongas, membranaceas, semina in se continentes nigra; producit *Caltha palustris*: Benè mea opinione, subjungi debet *Aconito* flore *Ranunculi* in medio folio: quod continetur *pag. 414.*



*Pag.* 482, & 483. *Chelidonia major* & eadem folio laciniatomalè, collocantur hìc; cum ad filiquosas tetrapetalas plantas debent referri. Quæ continentur in *Tomi* 2. *Lib.* XXI. tetrapetalæ filiquosæ, tetrapetalis filiquosis jungendæ sunt: cum in *Tomi* 3. *Libro* XXX. nil habent affinitatis. Nec cum genere antecedente *Ranunculo*, scilicèt, nec cum genere sequente *aquilegia*: Sed sunt tetrapetalarum filiquosarum veræ & genuinæ species; ut cuilibet consideranti, cernere licet.

*Pag.* 484, & 485. *Aquilegia* cum sit planta filiquis membranaceis plurimis, *Acconiti* & *Delphinii* adinstar, debuit iisdem subjungi.

*Pag.* 486, & 487. *Thalictrum* ejusque species; à similitudine foliorum, in ipsorum dispositione, cum plurimis *Umbellis* conveniunt. Idem contingit *Filipendulæ Ulmarix*, seu *Barbæ Capræ*, aliisque; jure accidentalì, possunt ad finem *Umbellarum* disponi: ut superiùs clarè satis ostensum fuit.

*Pag.* 489. *Leontopetalon* cum sit planta *Heteroclita*, ad finem *Ranunculorum* potest amandari.

*Pæonia*



*Pæonia* ejusque species, adjungantur iis quæ plurimas filiquas membranaceas habent ; ut *Delphinio*, *Aconito*, *Aquilegiæ*, *Staphidi Agriæ*, cæterisque illius *Farinæ* : ut nos conclusimus.

*Pag. 496.* *Primula veris*, caulifera, proli-fera, odorata describitur. Appingitur confusè cum *Primula veris* floribus plenis ex singularibus pediculis.

*Pag. 497.* *Primula veris* floribus plenis ex singularibus pediculis, describitur. At appingitur *Umbellifera Primula veris* confusè cum prædictâ.

*Pag. 521.* *Gentiana* folio convoluto, est à flore & capsulâ seminali etiamque semine *Lychnidis* (*Saponariæ* dictæ) species genuina ; neutiquam est *Gentiana*. Ergò malè hîc cum *Gentianæ* speciebus locatur ; relegari debet ad *Lychnidum* classẽ. *Saponariam* nempe, eandem cum *Casp. Bauhino* *Saponariam* concavam nuncupando.

*Pag. 524.* *Gentianæ* species, *Calathiana* quibusdam radice perpetua, sive palustris describitur : duæ autem *Gentianæ*, omninò diversæ *Icones* apponuntur ; prior vera, alterius est *Gentianæ* punctato flore *Clus.*  
Icon. F f 3 *Pag.*

*Pag. 533.* Bifolium majus, five Ophrys major quibusdam: Malè hic locatur, cum melius congruit cum Helleborine; cujus est multò magis æmula, quoad omnes suas partes.

*Pag. 538.* Bistorta, cum sit semine triangulari donata; magis appositè disponeretur post Lapathum acetosam, &c.

*Pag. 563.* Tussilago, & à *pag. 563.* usque ad *pag. 569.* in quibus continentur Tussilago, Petasites, Cacalia; quæ omnes, cum pappefcunt & non lactescunt, debent pappefcientibus, non lactescentibus jungi: Videlicèt Jacobææ, Senecioni, Gnaphalio, Stœchadi Citrinæ, &c.

*Pag. 579.* Buglossum vulgare, majus & minus, utrumque flore duplici: malè figuram exhibet Joh. Bauhinus Buglossi vulgaris, flore simplici.

*Pag. 588.* Echium tenuifolium describitur. Appingitur Buglossi species, latiore folio: observa hoc discriminis intercedere inter Buglossum, seu Borraginem, & Echium sive Lycopsin, Buglossi seu Borraginis flos conflatur ex quinis petalis acutangulis, cingentibus ad basin simbriam villosam, in cuius

jus medio totidè prominent Apices conjunctim, aculeum referentes; sed Echii seu Lycophios flos, est corniculi aut tubuli instar, oblongus, in superiore floris parte longius porrectus; in inferiore margine brevior; utriusque (floribus discussis) in vasculis, tria vel quatuor semina conjunctim posita sunt, oblonga, rugosa: veluti semina Consolidæ majoris.

Pag. 590. Cynoglossa fortè Topiaria Plinio, seu Echium lappulatum quibusdam, describitur; sed perperam appingitur Cynoglossa, folio virenti Joh. Bauhini.

Pag. 592. Lithospermum majus Dodonæi flore purpureo, semine Anchusæ describitur. Sedi autem aliqua appingitur species; nempe Sedum Alpinum minimum foliis cinereis, flore candido, descriptum in pag. 692. hujus Icon. ad pag. 692. illius autem Icon. ad pag. 596. transferatur, faciliè emendabitur error.

Pag. 598. Cynoglossum vulgare malè exhibetur; quia Icon. est vitiosa.

Pag. 600. Cynoglossa folio virenti Joh. Bauhini describitur. Appingitur autem Cynoglossa fortè Topiaria Plinio, seu Echium

lappulatum quibusdam, hujus Icon, pag. 600. contenta, ad pag. 590. amandetur: & illius huc transferatur, & sic corrigetur lapsus.

Pag. 637. Bupthalmum Dodonæi aliis Consiligo tenuifolia, cum sit planta Corymbosa, semine Adonidis Emulo prædita, ad Corymbosas debet amandari.

Pag. 638. Sanicula foemina quibusdam, aliis helleborus niger; cum sit planta umbellifer, aut clarè satis docuimus in hallucinationibus Casp. Bauh. ad Umbellas esset releganda, cum Tabernemontano, eamque appellando Imperatoriam nigram.

Pag. 641. Staphis Agria, cum sit planta gerens plures siliquas, membranaceas continentes semina dura, lucida, nigra; relegetur ad Aconitum, Delphinium, Aquilegiam, &c.

Pag. 643. Ricinus cum sit planta tricocos, & simili purgandi virtute prædita, cum Tithymalo, ejusque speciebus; debet ipsis subungi.

Pag. 650, & 651. Thora folio Cyclaminis, & Thora Apula folio Alchimillæ; cum sint Ranunculi, à flore & semine; non est dubitandum quin debeant relegari ad Ranunculorum classẽ.

Pag.



*Pag. 660.* Aconitum racemosum, actæa quibusdam; cum hæc planta sit baccifera, Solano magis accedit (mea opinione) quàm Aconito, ut suprâ innuimus.

*Pag. 678.* Portulaca hortensis, latifolia describitur. Appingitur autem Menianthes, seu Trifolium paludosum.

*Pag. 680.* Sedum Echinatum vel stellatum flore albo describitur; vitiosa appingitur Icon. fortè alicujus Polygoni.

*Pag. 684.* Cotyledon, altera olim Mattheolo; non est Cotyledonis propriè dictæ species; sed florem fert Sedi aut Santiculæ montanæ, capsulamque paritèr in superiore parte bifurcatam, in qua plurima continentur semina tenuissima.

*Pag. 685.* Cymbalaria flosculis purpurascens, neutiquàm huc pertinet, sed debet jungi Linariæ familiæ. Cujus fert tessellatam seu notam Genericam: ut suprâ in hallucinationibus Casp. Bauh. satis evidenter à nobis deducitur.

*Pag. 692.* Sedum Alpinum minimum foliis cinereis, flore candido describitur. Appingitur autem Lithospermon majus Dod. flore purp. semine Anchusæ. Vide *pag. 592.*  
fiat

fiat transpositio Iconum, & tolletur lapsus.

Pag. 710, & 711. Lunaria Botrytis ejusque species, malè hic digeruntur; cum sint perfectæ filices, inter filices collocentur.

Pag. 722. Spergulæ tres Icones, malè illæ disponuntur inter Rubiæ species. Quia Spergulæ, à flore & capsulâ seminali, sunt Alfinæ perfectæ species. Ergò ad Alfinæ classẽ debent relegari; nullâ habitâ ratione foliorum, per intervalla stellatim positorum.

Pag. 728. Drypis Theophrasti, cum sit Carduus, malè hic inter Asparagum & Equisetum digeritur; & à suæ sortis familiâ disjungitur: Ergò ad Carduorum seriem debet jure mandari.

Pag. 754. Trichomanes, sive Polytrichum describitur. Appingitur autem Cardui alijus Icon.

Pag. 762. Phyllon, Thelygonon Dalechampia, cum filiculam habet bicausularem, septo membranaceo, duplicem determinante seriem seminum; Paronychiæ muralis adinstar, aptè (meâ sententiâ) Paronychia foliis crassis, hirtis diceretur. Ibidem Tridactylites Alpina: florem & capsulam  
semina-

seminalem habet ; ut Sedum Tridactylites  
 tectorum : Ergò ad Sedi classem esset re-  
 leganda, & non hìc collocanda hæc plan-  
 tula.

*Pag. 868. in appendice ad Tomum tertium.*  
 Auricula ursi orbiculata, ferrata coloris ru-  
 bicundi describitur. Appingitur autem  
 vitiosa Icon: fruticis scilicet alicujus, ra-  
 mus.

Ad



Ad virum insignissimum, Doctissi-  
 mum & vitæ integerrimum, Dignissi-  
 mumque Dom. *Johannem Fell*, in sacro-  
 sanctâ Theologiâ Doctorem, Collegii  
*ædis Christi* Decanum & Universitatis  
*Oxonienfis* Procancellarium vigilantis-  
 simum S. P. D. Author.

Clarissime Vir,

♦♦♦♦OST reditum meum, Oxoniâ Londi-  
 ♦P num, amicorum quorundam Precibus  
 ♦♦♦♦ sollicitatus : ut præludia Botanica hæc  
 Mea, typis committerem : quæ jam  
 tandem prelo excessere. Quæque viam, ad  
 methodum nostram novam (cujus tibi exem-  
 plar ostendi) præsternunt : novam appello  
 quia nemini hucusque cognita : antiqua tamen  
 quia à tertio die creationis mundi, eadem  
 semper fuit, quæ hodie est. Reverende Vir, non  
 ita pridem (ut nosti) invisebam splendida ve-  
 stra & magnifica ædificia ; Collegia, Scholas,  
 Bibliothecam,



*Bibliothecam, Theatrum, publicis actibus designatum, vix adhuc finitum. Liberalitate & sumptibus, Reverendissimi in Christo Patris, Archiepiscopi Cantuariensis; Gilberti Shelden, ejusdemque Universitatis Cancellarii dignissimi; à fundamentis erectum. In Symbolum gratitudinis suæ, erga almam matrem suam: cui præsentem ingenii Culturam debet. Magnificum hoc Theatrum (omnium in Europâ faciliè primum) ut & omnes graviores curæ Universitatis; vigilantia, labore & inspectione tuâ, (nec auribus tuis jam do) dirigantur. Dum fabricam & structuram omnium (inquam) horum publicorum edificiorum, animo volvo: Nihil unquam apud exterarum nationes, ipsis comparandum, audacter asserere audeo. Sed dum numerosam Doctissimorum, in omni literarum genere, hominum illic Congregationem penitus considero: Dumque omnes eâdem suspendo bilance, Dialogum hunc, inter Socium Londinensis Collegii Regii, & Me: nulli aptius, quam tibi inscribere; ratum & statutum habeo. Solutiones quarundam questionum propositarum; inter prandendum, Domi tuæ, sub idem tempus; invenies. Cum de methodo Authorum, in rem Botanicam,*

Botanicam, hucusque scribentium; tum, de  
 Plantis imperfectis agit: Estque hic totus ferè  
 scopus totius Dialogi. Accipe igitur, hilari  
 animo, hæc nostra alterna colloquia Botanica.  
 Tu qui me benignè recepisti, omni humanita-  
 tis officio, me affecisti: dum apud vos con-  
 versarer. Utinam vobis aut vestris inservire  
 possim commodis: Me invenietis paratissi-  
 mum; Vale. Et ut diu vivas, Deum opti-  
 mum, maximum precor:

*Vir Reverende*



*Doctissime,*

*Tuus obsequentissimus*



*Observantissimus servus,*

ROBERTUS MORISON.



DIALOGUS  
INTER  
SOCIUM,  
COLLEGII REGII  
LONDINENSIS,  
GRESHAM dicti:  
ET  
BOTANOGRAPHUM  
REGIUM.

---

*Socius. Botanographus.*

*Soci-  
us.*



ANDO ad meas pervenit au-  
res, imo jam cum in memo-  
riam revoco, ex tuo ore  
hausi: Te excogitasse, aut  
saltem incidisse in methodum generalem  
omnium stirpium, per Tabulas quasdam  
cogna-

cognitionis, seu affinitatis; sed quid sibi velint hæ Tabulæ, nondum assequor. Quare velim, ut paucis privatim inter nos de eisdem conferamus. *Botanographus*. Methodum me observasse fateor: Estque, omnium, quæ unquam adhuc fuerunt exhibitæ: præstantissimæ & certissimæ: est quippe à naturâ data, à me solummodò (citra jactantiam) primum observata, quamque publici juris facere brevi, in me suscepì. Si Mæcenates faverint, nostris conatibus & lucubrationibus per aliquot annos à nobis exantlatis. *Soc.* Volumina multa magna evolvi, de re Botanicâ: Sed methodum stirpium hucusque desidero; quæ multum conduceret ad citiùs & certiùs vastum illum Oceanum, plantarum seu Stirpium addiscendum. Insupèr Calcaria adderet multis nobilibus, doctisque hominibus, plantas è terrâ pullulantes avidiùs contemplari & divinum artificium summoperè mirari: sed quid quæso tu dicis, qui tres modios salis in Galliâ comedisti: de historiâ universali Plantarum, Lugdunensi; à Dalechampio editas. *Botan.* Fateor me sælicitèr in Galliâ vixisse multaque illic evolvisse volumina,

cum



cum magna, tum parva, de arte (aut scientiâ  
 si mavis) Botanicâ sub auspiciis serenissimi  
 principis Gastonis Franciæ: qui in re Bota-  
 nicâ fuit peritissimus, omnium Stirpium, di-  
 ligentissimus scrutator, & oculatissimus ob-  
 servator. Sed ut tibi satisfiat, redeo ad Gal-  
 lum nostrum Botanicum, Dalechampium:  
 fateor Dalechampium fuisse Medicum insig-  
 nem, & perdoctum Botanicum. Quin & ope-  
 ra ejus, Botanicis multum profuere: sed  
 quod ut plurimum mortalibus contingit; ipse  
 præmaturâ morte abreptus, chartas suas &  
 Icones à Mattheoli, Lobelii, Dodonæi, &  
 Clusii hæredibus; suis sumptibus emptas, &  
 collectas: in musæo suo, post se reliquit.  
*Soc.* Quomodò ergò prodiit in lucem histo-  
 ria illa Lugdunensis? *Botan.* Paucis id tibi  
 perstringam: Hæredes ejus aliquot post  
 mortem annos, cum Typographis lucrum fa-  
 ciendi avidi; ipsis pretio & chartas & Ico-  
 nes prædictorum Authorum vendidère. Ty-  
 pographi autem, rem totam Medico cuidam  
 (istius oppidi) dicto Molinæo, commisère.  
 Hic cum Typographis, aut saltem eorum  
 crumenâ consultans, talem, qualem præ  
 manibus habemus, historiam Lugdunensem  
 G g edidit.

edidit. Primò Latinè, deindè Gallicè, & in duos Tomos, in folio distinxit: Utraque editio est vitiosa & depravata, ut colligere potest quivis; ex animadversionibus Caspari Bauhini in historiam Lugdunensem, ubi quingentæ plus minusve plantæ, bis terve repetuntur. *Soc.* Animadversiones, Casp. Bauh. in historiam Lugdunensem vidi, ipsamque historiam perlustravi; & gravitè Authorem, Molinæum sic à te designatum, hallucinatum esse observavi: sed ad propositum redeamus. Quid dicis quæso, de methodo Dalechampii? *Botan.* Est nulla, aut saltem parùm idonea, ad methodicè plantas discendas. *Soc.* At ego (ni fallor) aliquam observavi methodum, & ut puto à locis natalibus, seu natalitiis desumptam. *Botan.* Æquum dicis. Oblivioni tradideram; sed jam revoco in memoriam. *Soc.* Sed quid tu de ista methodo sentis? *Botan.* Est planè ex meâ sententiâ rejicienda. *Soc.* Quare? *Botan.* Quia plantas per natales (ut plurimum) seu natalitia loca disponit; Et ego libentè à te peterem; quid quæso debet impellere vel mediocritèr Botanicae rei scientem, disjungere Ranunculum à Ranunculo: an quia quidam crescunt in

in summis Alpium jugis & Pyrenæis montibus, alii in sylvis, sive annosis, sive cœduis, alii descendunt ad prata & loca campestria; novalia & arva scilicet; alii deniquè in palustribus & aquosis locis proveniunt: Sed cum omnes habent tesseram seu symbolum Ranunculi, debent simul disponi in unâ aut alterâ Tabulâ cognationis. *Soc.* Quid tu vis, per tesseram .s. symbolum? *Botan.* Ego per tesseram intelligo notam Genericam, & essentialiam; toti Seriei Ranunculorum convenientem, ubicunque locorum crescentium. *Soc.* Quænam est nota essentialis Ranunculorum. *Botan.* Est habere florem ex quinis, ut plurimum (Asiaticos excipio, qui à luxuriante naturâ sex, septem, octo; nunc plura, nunc pauciora producunt) petalis conflatum; eidem flori, succedit, racematim, aliquando orbicularitèr, aliquando longitudinalitèr, spica; ex seminibus compressis, acutis compacta. *Soc.* Jam intelligo quid sit nota Generica hujus longè patentis generis: ego nunquam hoc observavi ante hanc tuam deductionem; sed in pratis & sylvis, imò in hortis ipsis suburbanis, diligentius imposterùm observabo. Unus mihi restat scrupulus, qui



me malè habet, de temperamento Ranuncu-  
 lorum. Suntne omnes calidi, & causticæ  
 facultatis, quod nobis innotuit primò (nisi  
 me animus fallit) ex Mendicis publicis, qui  
 Ranunculorum foliis, tibiis applicatis, exu-  
 unt cuticulam seu epiderma; imò nonnun-  
 quam cutis ipsius & muscutorum magnam  
 partem, eamque ulcerant, ad prætereuntium  
 movendam commiserationem, & ad vilem  
 stipem seu Eleemosynam obtinendam? *Bo-  
 tan.* Hoc lippis & tonsoribus notum: hoc  
 præstant viles animæ, Mendici: Confiteor  
 maximam Ranunculorum partem, esse cau-  
 sticâ facultate præditam, sed non omnes.  
*Soc.* Qui sunt illi, qui non sunt calidi? *Bo-  
 tan.* Ipsæ Authorum denominationes hoc tibi  
 indicant, ut Ranunculus Holeraceus, Ra-  
 nunculus dulcis Tragi, Ranunculus Muscha-  
 tella, dictus, &c. advocetur gustus in opem.  
*Soc.* Ego constantèr asseveravi, causticam fa-  
 cultatem fuisse de essentiâ omnium Ranun-  
 culorum. *Botan.* Contrarium vides, & ego  
 Anthoram, quamvis contrariam habeat vir-  
 tutem (sic credendum est veteribus scriptori-  
 bus) ex Aconitorum genere, à flore Cuculla-  
 to, & Thecis membranaceis, seminibus An-  
 gulosis



gulosi, subrotundis, asperis (aliorum Aconitorum more) esse concludo. Quin & insuper, si bene observaveris, Delphinium, aut Consolidam regalem, per eandem rationem, Aconiti ferre tesseram, percipies: & ideò ego sic Tabulas cognationis .s. affinitatis construendas suscepi, sequendo ductum naturæ, solâ naturâ monstrante mihi methodum & viam; à fine ultimo petitam. Videlicet fructificationis similitudine, ut prolixiùs alibi ex me audies, ut plenè satisfiat tibi: secundam, adferam in medium instantiam. An tu liberè disjungeres Lapathum aquaticum, seu Hydrolapathum, à Lapatho diversi generis suburbano, aut montanum, seu Lapathum Monachorum, ab utroque prædicto genere, Lapathorum? Quia in montibus cellis Alpium provenit: sicut Rhabarbarum in Thraciæ montibus altis. *Soc.* Quid, tu Rhabarbarum statuis Lapathum itidè? *Botan.* Nil aliud est *ῥαβδάριον*, quàm omnium Lapathorum optimum. *Soc.* At Casp. Bauh. disjungit & per se collocat, nec in medium producit aliquem Authorum .s. veterum .s. Neotericorum, Lapathum appellentem: Sed ab omnibus Rha, & Rhaponticum seu Rhabarbarum dicitur.

*Botan.* Ego nunquam essentiam plantarum, desumendam ab Authorum denominatione putavi, sed à florum formâ, & seminum conformatione: vide pag. 117. *Col. II. Pl. V.* in hallucinationibus Casp. Bauhini à nobis exhibitis, præludiorum Botanicorum nostrorum, parte secundâ: Et videbis quam confusè Casp. Bauh. digerit capita illa duo de Lapatho, & Rha ejusque speciebus. *Soc.* Ergò tu concludis, Rhabarbarum esse Lapathum, à fine ultimo, id est, similitudine seminum triangularium, ut sunt omnium Lapathorum, semina triangularia. s. triquetra, rubra aut nigra. *Botan.* Quid ni? noli quæso de hoc dubitare. *Soc.* Potesne alias dare instantias? *Botan.* Centum, imò sexcentas si velis. *Soc.* Aliam audire libentèr velim. *Botan.* Nostine vulgarem & putidam illam plantam (ejusq; species varias) quæ Atriplex dicitur? *Soc.* Nihil meliùs. *Botan.* Nondumne percipisti à semine; duo esse ejus genera; ab Authoribus nunquam (ante me) observata? *Soc.* Hoc me latet. *Botan.* Ego paucis tibi apperiam: primò, si observasti Atriplicem hortensem, rubram & albam; semina spicàtim producit, in summis caulium, singula, binis

nis foliolis inclusa. *Soc.* Quid tùm sequetur ?  
*Botan.* Observa in fimetis & sterculinis fossif-  
 que suburbanis, Londinum circumjacenti-  
 bus, esse plures hujus generis species sub-  
 alternas; quæ habent semina singula binis  
 foliolis inclusa, ut *Atriplex* folio hastato .f.  
*Deltoide* in horto Regio Blesensi aucto; e-  
 tiam *Atriplex* *Polygoni* folio, *Halimus* seu  
*Portulaca Marina*, sic Authoribus denomina-  
 tæ; Sunt veræ & genuinæ *Atriplicis* spe-  
 cies, quemadmodum *Atriplex* *Halimi* folio:  
 quia hæ novissimæ *Atriplicis* species ad o-  
 ram maritimam, aliæ prædictæ in fimetis  
 & Stercoratis suburbanis locis, aliæ prius  
 dictæ in hortis cultis proveniunt; nonne de-  
 bent ibidem digeri seu collocari, quondò-  
 quidem eandem gerunt tesseram, seu notam  
 essentialem? *Soc.* Do manus, jam abundè  
 mihi satisfactum esse puto de methodo de-  
 pravatâ Dalechampii; atque uno verbo ve-  
 lim aliquid mihi dicas de methodo Parkin-  
 soni nostri, qui satis ingentem farraginem  
 plantarum, omnium Authorum antè se scri-  
 bentium, in magnum volumem congeffit  
 compilavitque. *Botan.* Parkinsonum labo-  
 riosum fuisse senem, multaue transcripsisse



fateor, quin & numerum auxit; sed magis confundit genera plantarum quàm quivis, dum novam vult (ex proprio cerebro) cedere methodum. *Soc.* Quomoddò hoc quæso demonstras? *Botan.* Observasne ipsum à plantarum seu stirpium viribus vel facultatibus, classes suas desumpsisse. *Soc.* Atqui hæc videtur mihi optima methodus. *Botan.* Est Medicis aliquomoddò utilis & necessaria, sed non est à naturâ desumpta; non est de essentiâ primò & principalitèr plantæ; purgare, necare, .s. occidere, calefacere, aut frigefacere, &c. sed secundariò & accidentalitèr, ut clariùs tibi alibi ostendemus. *Soc.* Ego omnes purgantes, simul collocatas, optimam semper putavi methodum, pro istâ saltem classe. *Botan.* Ne multis verbis tempus teramus; Vis ut uno verbo dicam? quod sentio repugnat methodo naturæ & per consequens nostræ, per Tabulas cognationis digerendæ, & ut capias faciliùs quod propono, libenter à te peterem, quam affinitatem habet Rhabarbarum, seu Rhaponticum quod Lapathum suprâ (si memores) à fine ultimo, scilicèt fructificatione, clarè satis fuisse demonstravi: quid inquam affinitatis habet Rhabarbarum, cum scammo-

niâ



niâ Antiochena, quæ est Convolvulus? Ob  
 usum succi lactei, qui ex eodem manat. Qui-  
 que diagredium post præparationem dici-  
 tur: Est per excellentiam, omnium Convol-  
 volorum præstantissimus: aut dic mihi. Cucu-  
 mis Asininus, ex quo Elaterium Medicorum  
 antiquorum extrahitur; secundum methodû  
 naturæ, nil habet affine cum prædictis stirpi-  
 bus? Fateor quod cum Colocynthide, & à  
 naturâ, & à virtute disponi debet: Deindè  
 vide differentiam Tithymalorum, Esulæ, &  
 cœt. (id genus) aliarum, tricoccarum lactes-  
 centium, à Jalapio, Senna, Tamarindo, Casia.  
 Quæ cû prædictis & postea nominandis, nul-  
 lam habent inter se connexionem, si exacta &  
 omnium perfectissima methodus naturæ con-  
 sideretur: purgare enim hisce nominatis, &  
 multis aliis in observationibus nostris gene-  
 ralioribus, ex horto Regio Blesensi aucto col-  
 lectis; hisce inquam purgare accidentalitèr  
 datur à naturâ. Ita secundariò .s. accidenta-  
 litèr à purgante facultate possunt omnes hæ  
 ad unam classẽ reduci; sed ex Libro naturæ,  
 habitâ ratione finis ultimi, scilicèt fructifica-  
 tionis; toto Cœlo differunt. Quod non te  
 jam potest latère; post tam prolixam, de hac  
 re,

re, ratiocinationem. *Soc.* Video & concedo novam illam Parkinsoni, non veram & genuinam (secundum naturæ intentum) esse methodum : properemus ad alios ; ne dialogus in immensum excrescat. *Soc.* Quid dicis quæso de magno illo volumine duobus Tomis immensis, distincto ? Quod, hort. Eyst. nuncupatur. *Bot.* Laudo liberalitatem istius Episcopi magnoperè, qui tantum impensarum liberè fecit ; ut publico prodesset. Nullus inquam, Icones omnes, æri tam affabrè & elegantè insculptas (heu nimis tamen magnas) tam gloriosè & sumptuosè edidit. *Soc.* Sed ad rem : Quid dicis de methodo ipsius Bessleri ; qui Librum compilavit ? *Botan.* Vis ut apertè loquar ? Quod sentio, nosti ( si benè meministi ) Besslerum compilatorem, seu directorem, prædicti Libri ; per anni quatuor tempestates, plantas suas digessisse : ut acupictoribus, prædictum Librum evolventibus & intuentibus plus prodesset, quam Botanicæ scientiæ, studiosis. *Soc.* Certè Icones istius Libri, seu hort. Eyst. ( si mavis ) elegantè sunt designatæ & sculptæ, & pro proportionem plantarum quarundum minorum : Sæpè reperiuntur nimis magnæ. Insuper fateor Librum

brum illum principum & magnatum musæis,  
& acupictorum seu acupicticum, cubiculis  
valdè esse necessarium. *Botan.* Utinam ha-  
berem ego talem patronum, ego methodum  
naturæ, de quâ suprâ diximus suppeditarem  
& patronus designatores, & sculptores con-  
duceret & pretium persolveret. *Soc.* Ego id  
cordicitiùs optarem, & optare debent omnes  
quotquot in Europâ extant Botanicæ rei a-  
matore. Sed quid dicis de Matth. Medico  
Italico, nullamne ille proposuit methodum?

*Botan.* Ille & multi alii suo tempore, *Coxta-*  
*nei Botanici*, similitudinem foliorum .s. par-  
tium accidentalium ritè, & attentè obser-  
vantes, plantas multas ad eandem classẽ re-  
duxère, quæ aliò à nobis sunt relegandæ.

*Soc.* Tu appellas folia, partes accidentales  
stirpium? *Botan.* Sunt tantum; quemadmodum  
radix, Fibræ .s. Nervi, caules: cur non folia?  
Hoc ego paucis deducam, radix ex terræ su-  
perficie, tanquam matrice, attrahit nutri-  
mentum seu alimentum, caules vehunt ad  
omnes partes, per ductus illos sive canales,  
qui Fibræ .s. Nervi dicuntur; folia arcent ca-  
lorem & frigus: ergò per accidens omnes in-  
serviunt productioni seminis; ejusdemque  
perfe-



perfectiōni. *Soc.* Cui usui data sunt folia, præter ad arcendum frigus & calorem, & ad Dod. ductum .s. vehiculum Nervorum per omnes partes plantæ. *Botan.* Inserviunt ad subalternas species constituendas etiã, aliquando multa genera intermedia designantur ab accidentali à similitudine foliorum. *Soc.* Certè ego, certum indicium Genericum à similitudine foliorum peti existimavi. *Botan.* Et ego hoc observavi in multis Authoribus scribentibus aliquot abhinc annis, imò non ita pridem, in Libro quodam ab Authore, vestri Collegii Socio edito, in quo exhibetur methodus, per Tabulas, disponentes classes plantarum, à similitudine foliorum, sumptarum. Ego tantum confusum Chaos: illuc, de plantis legi, nec quicquam didici, ut monstrabo tibi & lapsus & confusionem, aliàs. Quia degrediendum nunc, non est. *Soc.* Ego vix clarè percipio quid tibi vis dum folia non vis, inservire ad digestionem plantarum? *Botan.* Ego nunquam hoc dixi; sed audi attentè non inficias eo, folia multùm conferre ad species intermedias denominandas, sed non ad Genericam, & essentialē assignandam notam, *Soc.* Clariùs velim te temetipsum



sum exprimere. *Botan.* Quandoquidem exempla clarè docent, quædam adferam, in medium: quæ te convincent, plantas, non denominari debere à primo intuitu, seu conformatione foliorum, ad se invicem. *Soc.* Adfer quæso in medium exempla illa tua. *Botan.* Audi ergo attentè. Observastine in citatione Authorum apud Casp. Bauh. complurima Ranunculorum genera subalterna, ab accidentalibus (foliis scilicèt) partibus, desumpta, ut exempli gratiâ, Ranunculus Gramineis foliis, apparet Botanicis non mediocritè versatis in arte: Gramen sub pedibus: sed simulac florem Mense Junio produxerit luteum, quinis petalis conflatum, & semina Ranunculi in modum; Nemo dubitabit ipsam illam plantam esse Ranunculi speciem, ipsamquè nominare Ranunculum; & ut multa paucis comprehendam, observa mecum: Ranunculus Plantaginis folio, Ranunculus Rutæ folio, Ranunculus Beupleuri folio, Ranunculus Thalictri folio, Ranunculus Aconiti folio, rotundo folio & dissecto folio. Antequam maxima pars horum floreat semenque produxerit, non debent nominari à primo intuitu foliorum, per terram stratorum,

rum, ne primus pro Gramine, secundus pro Plantagine, tertius pro Ruta, quartus pro Thaliſtro habeatur, & ità deinceps: ſed ſecundariò à ſimilitudine foliorum, ad ſpecies ſubalternas determinandas; ergò clariùs, jam luce meridiana, vides notam Genericam nunquam deſumi à ſimilitudine foliorum, ſed (ut antè à me dictum) diverſas ſpecies ejusdem generis conſtituit, diverſa foliorum ſimilitudo ſeu facies. *Soc.* Video clarè & perſpectè in hoc genere, videlicèt Ranunculo-  
rum: Folia tantum per accidens & ſecundariò (quoàd formam & figuram) inſervire ad ſpecies designandas; ſed an hoc contingit paſſim in omnibus, plantarum generibus? *Botan.* Paſſim, ubi numeroſæ ſunt ſpecies ut hic. *Soc.* Sed danturne plures ſpecies inter-  
mediæ diverſæ, ſub diverſis omninò generibus, quæ folia habent conformia, & à ſe invicem vix cognoscibilia. *Botan.* Auſculta paucis, attentiffimè obſervabis mecum. Mil-  
leſolium Tanaceti foliis; flore purp. & alb. & Erucam Tanaceti foliis: Utraque notatur à me non ſcripta, in horto Regio Bleſenſi au-  
cto, Tanacetum inodorum Bauh. in Pin Bel-  
lis Tanaceti folio nobis: Hæ tres plantæ, notà  
Gene-

Generica & essentiali, toto Cœlo differunt, à fine ultimo petitâ. Sed hæ tres plantæ, dum primo è terrâ pullulant, & antequam caulescant: intuendo, acutâ acie oculorum; propter conformitatem (alarum Rachi seu Nervo medio adhærentium & dissectarum) in foliis, non possunt facilè distingui; sed paulatim caulescente primâ plantâ, & florente, semenque postquam ad maturitatem produxerit eadem: Millefolium, Tanacetî foliis sese declarat, sumendo denominationem, à nobiliori parte, sine ultimo scilicèt, & folia alata dissecta, Tanacetî adinstâr designant, pro quâ specie Millefolii, haberi debet. Secunda paritèr planta, ad flores vergens, sese tetrapetalam & filiquosam prodit: adde acrem & calidam qualitatem, si Masticaretur, gustusque vocetur in opem; Eruca statim apparet: folia Tanacetî instâr inserviunt ad specificam hanc Erucæ speciem designandam. Tertia florens, Bellidis adinstâr, discum fert luteum, quem cingunt, circularitèr seu stellatim, lata alba folia; unde Bellis Tanacetî folio dicitur: eam denominando à parte essentiali; flore videlicèt, aptius ad genus Bellidum à me reducitur; & folia

Ta.



Tanaceti in modum, constituunt specificam  
 ejus Bellidis notam. *Soc.* Jam tandem per-  
 cipio folia non esse de essentiâ plantarum,  
 ex exemplis satî ingeniosè à te allatis. *Bo-  
 tan.* Gaudeo me nullam posticam dubio tuo  
 reliquisse. *Soc.* Quid dicis de methodo Joh.  
 Bauhini, qui historiam universalem, planta-  
 rum seu Stirpium in tres Tomos digestam,  
 scripsit? *Botan.* Vis certè ut ingenuè fatear,  
 quod res est; omnium Authorum, ante se  
 scribentium, optimam reliquit methodum.  
*Soc.* Nihilne corrigendum aliis reliquit? *Bo-  
 tan.* Imò multa, ut videbis ex animadversio-  
 nibus meis in historiam universalem ejusdem  
 Joh. Bauh. ibi multa transpono, diruo gene-  
 ra; alia de novo creo & constituo; denique  
 omninò novam condam & componam me-  
 thodum, meliorem, facilioremque. Quâ,  
 plus addiscet methodicè. Botanicus discendi  
 cupidus; biennii spatio, quam ego ad de-  
 cennium didicerim. *Soc.* Utinam eandem  
 præ manibus haberemus, & optarem tibi  
 publicam Cathedram, ex quâ, tam vivâ vo-  
 ce; indoctos præsentés doceres, quàm scrip-  
 tis è longinquò doctis scriberes. *Botan.* Ego  
 me semper divinæ providentiæ me commisi,  
 &



& adhuc idem præsto. *Soc.* Quid tibi videtur de prolixitate Johannis Bauh. in describendis aut potiùs transcribendis, aliorum Authorum plantis. *Botan.* Tedium ipsum puto in hoc, ipsumque dum dicta & scripta aliorum, in medium producit; citando dicta, & allegando scripta Mattheoli, Fusch. Lob. Dod. Clus. & cœterorum tam, veterum quam Neotericorum scriptorum, in tria immensa volumina seu (si mavis) tres Tomos, ejus Historia universalis accrevit. *Soc.* Sed quid quæso emolumenti advenit, Reipublicæ Botanicae; dum tantam molem seu farraginem, dictorum Authorum in tam vastam historiam congeffit. *Botan.* More Germanorum & Teutonum, ut se laboriosum & diligentem indefessumque collectorem, seu compilatorem posteris monstraret seu exhiberet. *Soc.* Te verum dicere passim observo & in hoc tibi assentior: sed tu qui exactiori trutinâ, omnes Botánicos perpendisti; quot quæso addidit plantas, nondùm descriptas, aut non sculptas ab aliis Authoribus Botanicis, scribentibus ante se. *Botan.* Ego nondùm calculum exactè inivi. *Soc.* Proculdubio con-

H h      jectu-

jecturam veram facere potes; & fortasse exactum, etiam plantarum ab ipso edditarum numerum, nobis exhibere potes. Vide Schedulas tuas de hoc reollectas. *Botan.* Nisi me memoria fallit plantæ à solo Johanne Bauhino in Tomo secundo suo, & tertio, figuratæ, non excedunt centum, septuaginta tres. *Soc.* Exhibeas quæso easdem nominatim cum pag. ipsius Tomi primi, sive secundi, sive tertii. *Botan.* Quid hoc proderit Reipublicæ Botaniciæ; & quod non amo, in aliis, sed vitupero; committam ipse: Hoc est ut appertis verbis tibi dicam, transcriberem. *Soc.* Est notare tantum quot accessere ab ipso Bauhino tanto operi, quod quinquaginta annorum fuisse, ipse asserit. *Botan.* Forte morem geremus amicis tuis precibus. *Soc.* Sed si recte impræsentiarum recorder; dum cederemus sermones Botanicos, nos, inter nos: Tu certiore me fecisti, te habuisse plantas non scriptas; cuiquam Authorum; ducentas quinquaginta. Quarum nobis destinaveras succinctam, & curtam delineationem. *Botan.* Hoc hætenus; in præludiis meis Botanicis præstiti.

præstiti. *Soc.* Ego plurimi facio, Enchiridium tuum Botanicum, Manuale continens præludiorum Botanicorum tuorum, partem primam, & alteram. *Botan.* Fortè plus emolumenti & voluptatis ex lectione hujus Libelli, Botanicæ rei amatoribus & reverâ studiosis proveniet. Quam ex tediosorum prædictorum ingentium voluminum contemplatione & evolutione, quæ nauseam etiam ingeniosis lectoribus (expertus loquor) pariunt. *Soc.* Omittamus prædictos omnes prolixos transcriptores, & accedamus ad Casparum Bauhinum, quæ est tua sententia de Pinace suo. *Botan.* Plus ille laboravit quàm omnes suprâ citati Authores. Nomina omnium Authorum, Stirpes diversimodè nominantium, in medium producit; ipsos concordare facit. Quod non minimum præstitit: ad evitandam confusionem ex multiplici Nomenclatura Authorum, enatam. *Soc.* Sed de ejus methodo, in digerendis plantis: tuum judicium tua existimatio valebit. *Botan.* Vide hallucinationes Casp. Bauh. in Pin. in præludiorum Botanicorum meorum parte posteriore: Ibì observo ipsius hallucinationes



nationes in Pin. tam in denominandis, quam digerendis plantis, ubi diruo, ædifico genera; muto genera cum generibus, de his consule locum citatum. *Soc.* Utinam haberemus ad manum tuam methodum promptam; designatam & impressam quâ instructi, methodicè possimus plantarum seu stirpium, addiscere affinitates seu cognationes. *Botan.* Brevi, si Deus dederit & Mæcenas sese obtulerit, (per me non stabit) habebitis. *Soc.* Unde tu hanc methodum didicisti, quæ non reperitur apud omnes prædictos Authores. *Botan.* Ex Libro naturæ. *Soc.* Quid tu appellas Librum naturæ. *Botan.* Ego appello Librum naturæ, id quod omnibus innotescet. Quam facillimè postquam præludia mea diligenter evolverint, & historiam universalem plantarum seu stirpium meam methodicè dispositam; viderint. *Soc.* Quid intelligis per methodum universalem. *Botan.* Ego intelligo novam methodum per Tabulas cognationis, seu affinitatis disponendam. *Soc.* Quid tibi vis per Tabulas cognationis seu affinitatis; nunquam ego legi de tali methodo apud Authores. *Botan.* Nec

ego:



ego: ergò non esset nova; etiamsi fuit ab incunabulis mundi (ut imposterum audies) sed nemini adhuc detecta ante me: & neutiquàm dubito, quin illa methodus, & tibi & aliis omnibus *φιλόσοφοις*; (ubique locorum viventibus) satis grata futura sit. *Soc.* Valdè cuperem eandem illam methodum videre, & optarem, ut ex tuâ Pharetrâ illa sagitta, à tot & toties expectita, exiret. Nam sæpiùs tecum inivi colloquium, de arte nostrâ Botanicâ; satis adhuc ut video confusa: Aliquid ex te aliàs hausi, utinam & mihi & Publico ubique terrarum, brevì proficias; sed dum recordor, & ne mentè excedat, Mattheolus Italus ille Medicus, qui confusam edidit plantarum historiam, multa appinxit falsa arboribus ut ipsas congruere faceret, cum antiquorum descriptionibus. *Botan.* Hoc non me latet, sed quod magis miror: Imperatorem, Reges & Principes, & magnates omnes, totius penè Europæ, contribuentes habuit, hæc ipse jactitat in Præfatione Libri sui. *Soc.* Utinam Reges & magnates hujus sæculi, Chalcographorum, & Typographorum labores, tuosque com-

H h 3      pensarent;

penfarent; ut methodo illâ novâ, & inauditâ; à naturâ datâ: Et à te solummodo (citâ jactantiam) observatâ: fruere-  
tur, totus terrarum orbis; ut in arte Botanicâ, quondâm Italia, Germania, Galliâ gloriatæ sunt; sine methodo. Itidèm nobiscum, cum methodo, gloriari Britannia nostra possit: Jam tandem unam à te sciscitarer quæstionem; antequam decedas: plantæ possuntne sine semine; aut satione seminis, provenire, sponte è visceribus terræ, tanquam ex matrice. *Botan.*  
Jam grandem mihi proponis quæstionem quæ anxios, & ad solutionem tardos reddere potest, & socios Parisienses & Londinenses; imò vexaret fortassis, socios Lynceos Romæ olim viventes. *Soc.* à te hanc nunc expostulo, tu qui tot semina collegisti, seminasti, recondidisti in promptuario tuo seminario; ex horto Regio Blesensi: totius Europæ, non ita pridem, sub obitum principis, Mæcenatis ipsius; refertissimo: Earundem omnium stirpium (quotquot illic semina; tulere) dicis te habere bis Mille quingentarum vegetantium semina. Iterùm, jam ad rem; putasne

tu tellurem, tanquam ex propria matrice, plantas sine semine aut satione producere?

*Botan.* Certè lupum auribus teneo, an laterem lavabo, an oleum & operam perdam mihi adhuc incertum. dicam tamen quod sentio. Primò exordiamur à divinis oraculis, ubi affirmant in Genesios cap. I.

versibus 11, & 12. producat terra Gramina, & herbas reddentes semina sua: & Arbores ferentes fructus secundum earum genera seu species, continentes in se semina, vidit Deus quod hoc fuit bonum, &c.

*Soc.* Ex hac citatione divinæ Scripturæ innuere videris: omnia vegetantia seu stirpes seu Arbores ex proprio semine, à Deo, tertio die creata produci; in sæcula, sæculorum, ad finem mundi: Ex diversorum tam generum, quàm specierum, diversis seminibus à Deo datis, provenientium.

*Botan.* Hoc ego ità intelligo & longâ experientiâ edoctus, observavi, à minimâ plantulâ, seu Graminis herbâ (ut cum Virgilio loquar:) usque ad Libani Cedros. *Soc.*

Sed multæ conspiciuntur plantæ, quæ spontè proveniunt sine flore, capsulâ seminali. *Bo-*

*tan.* Ego fateor plurima esse genera & in-

finitas species (si ita loqui licet) sub ipsis  
 contentas, quæ ex mixturâ salis, & sulphu-  
 ris è terra aquave producuntur, sponte &  
 sine semine; ego autem, has omnes imper-  
 fectas appello plantas vegetantes. *Soc.*  
 Quas tu appellas perfectas; quas imper-  
 fectas. *Botan.* Perfectas appello quæ flo-  
 rent; capsulas producunt seminales, &  
 semina inibi contenta. *Soc.* Jam capio  
 quid velis, sed unum à te petere. Capil-  
 lares omnes, ut Phyllitis, sive Scolopen-  
 dria, asplenium, Coterach, Ruta muraria,  
 Polypodium & Filices omnes, cœteræque  
 (id genus) aliæ: suntne perfectæ plantæ?  
*Botan.* Imò sunt, quia habent flores (qui  
 fugiunt quasi obtutum) & semina, quasi  
 pulvisculum in dorso alarum. *Soc.* Hoc  
 tu appellas semina: Capillarium, & earun-  
 dem familias. *Botan.* Quidni appellarem,  
 & quemadmodum non omnis fert omnia  
 tellus. Idem hoc semen si aquosis & um-  
 brosis sylvis, vetustis muris aqua riguis  
 commitatur, pullulat, producitque sui ge-  
 neris plantam: Si propriam sortiatur ma-  
 tricem. *Soc.* Quid tibi videtur de junco,  
 an est planta perfecta, *Botan.* Perfecta  
 certè



certè omnino, nam floret & semina (ut plurimum) triangularia producit. *Socius*. Collegistine unquam junci semen. *Botan.* vigesiès, & habeo penes me in promptuario meo seminali, dena aut duodena distincta, juncorum seminum genera; aut si mavis species appellare, per me licet. *Socius*. Hoc ego nondum adverteram. *Botan.* Hoc clarè tibi demonstrabitur quando velis. *Soc.* quas quæso, appellas tu imperfectas plantas? *Botan.* quæ (ut supra dixi) sponte sine semine proveniunt: ex quadam commixturâ salis .s. fixi .s. volatilis, sulphuris; junctâ terrâ ruderosa, stercoreali denique, aut aquâ stagnante, vel fluente; & in motu perpetuo ut marina, vel fluviatili: seu dulci fontali. *Soc.* Recense quæso quædam imperfectarum plantarum genera, si lubet. *Botan.* In superficie terræ maxima pars omnium muscorum, sive in sylvis annosis, sive densis & umbrosis, sive in vetustis arboribus, muris antiquis, casularum tegumentis aut Lapidum saxorumve superficiebus crescentium. *Soc.* Ergò, generalitèr (ut percipio ex te) omnes musci sunt plantæ imperfectæ. *Botan.* Ego  
hoc

hoc non affero. *Soc.* An dantur musci qui florent & semen suum perficiunt. *Botan.* Etiam plurimi ut polytrichum utrumque, majus & minus Apulei. Muscus clavatus, muscus abietinus & multi alii, quos in sylvis annosis & umbrosis observare licet: lichen piliatus, stellatus itidém. *Soc.* Ego hoc observabo exactiús. *Botan.* Fac quæso. *Soc.* Quid dicis de fungorum Clusii ingenti catervâ. *Botan.* Sunt excrecentiæ terræ: (sive sunt edules sive lethales) nec semen nec florem habent sed sponte noctè unâ aut alterâ è terra emergunt; ex quadam commixtione Salis, sulphuris, junctâ terræ pinguedine ex stercore quadrupedum orta. *Soc.* Ego hæc omnia vera esse persuasum mihi satis habeo: & est consentaneum rationi; Sed quid inferis de tuberibus terræ. *Botan.* Tuberæ terræ in gremio terræ superficiali producuntur sponte: sine radice, caule, fibris, aut foliis. *Soc.* Quomodo augentur aut ad talem magnitudinem crescunt. *Botan.* Per juxtapositionem: ut mineria, & lapides terræ. *Socius.* Sit ita: Non reperiuntur hic in Anglia. *Botan.* Neutiquam, nec in borealibus

bus Galliæ tractibus. *Soc.* Nunquamne reperisti in meridionalibus tuis peregrinationibus, sub auspiciis serenissimi principis Gastonis Franciæ. *Botan.* Etiam in agro pictaviensi, Burgundia, quin & Galloprovincia, & Galliâ Narbonensi reperiuntur, frequentér. *Soc.* Quomodo deteguntur? *Botan.* A porcis sive suibus. *Soc.* Participem, me fac hujus venationis tuberum. *Botan.* Paucis tibi dicam, instinctu quodam naturæ, porci sive sues odoratu superficialem terræ partem, detegunt; & statim terram evolvunt quoad appropinquant ad tuber ipsum, & statim subulcus accurrit, & abigit pedo aut baculo suo pastorali, porcum; & lævissimo labore colligit tubera: Ecce habes quod vidi, in agro pictaviensi & habui ex relatione subulcorum aliorum. *Soc.* At ut ego audivi valdè avide expetuntur, à magnatibus Galliæ, Italiæ, qui Embammatis variis, gulam irritantibus utuntur. *Botan.* Ita est. *Soc.* Sed quid tibi videtur Corallum & Pseudocorallum & ejus generis aliæ complurimæ, maritimæ in fundo maris vegetantes, dum in loco nativo sunt; adhuc sunt

sunt molles; sed extra mare durescunt & colorem mutant. *Botan.* Idem mihi dicendum videtur, quod de diversitate numerosa, fucorum marinorum; (si. mavis algæ marinæ) qui omnes crescunt in fundo maris, & tempestatibus, propriis sedibus avulsi: Ad oram maritimam ejiciuntur multiformes, & diversarum proportionum. Præcipuè hyemali tempore, versus oram maritimam, Borealiū regionum. *Soc.* Ego multas facie diversas fucorum marinorum species, nunc penes me, in musæo meo habeo; tibi in hoc accedo: puto certo certius, has omnes sive algæ, sive fucorum marinorum species, esse plantas maritimas imperfectas: Quandoquidem, nec florent nec semen producunt. *Botan.* Si non longè fallor; sunt & plantæ imperfectæ in fluviis & fontibus aliisque rivulis. *Soc.* Benè observas ut conserva, lenticula & ejus generis aliæ multæ aquaticæ, aquis innatantes sine flore, sine semine: Jam abundè mihi satisfactum puto; de imperfectis plantis, tam terrestribus, quam aquis marinis, sive dulcibus, stagnantibusve innascentibus; sed quoniam advesperascit :

&amp;



& tu longè hinc distas, putasne plantas perfectas, spontè & sine semine produci posse, in locis ubi semen nunquam fuit satum? *Botan.* Suprà si satis meministi, hanc quæstiunculam examinavimus, & firmiter credidi, quod tibi hæcenus asseveravi, & certè sæpè sæpiùs affirmavi, constantè: serenissimo principi Gastoni Franciæ Domino, Domino meo (dum in vivis erat) colendissimo: Et proh dolor! dum jam est mortuus, nunquam satìs mihi deplorandus. Vivus, sæpè sæpius, nos colligere fecit plantas omnes, quæ è rimis lapidum, quibus tegebatur palatium, Regia Chambort, dictum. Multæ fuerunt pappescentes illic vegetantes; ut Senecio, Jacobæa, Conyza acris cœrulea, Lactuca sylvestris, & complures species Hieracii, Dens Leonis, &c. (id genus) aliæ papposæ multæ, quas omnes non mirabar, illuc à semine per aera volitante, dilatas fuisse: Sed & plantas complures, solida gerentes semina, illic promiscuè reperimus, ut Lapathum, Cerasum arbusculam, Prunum, rubum utrumque, & Rosam sylvestrem: *Soc.* At undè venèrè ad tantam altitudinem illa solida semi-

semina? concedo pappescentia semina, per  
 aerem volitare, & in altum attolli; &  
 longè latèque portari posse: sed quomodo  
 solida illa & quodammodo gravia, semi-  
 na; potuerint illuc volitare, nondum ca-  
 pio. *Botan.* Ego paucis meam opinionem,  
 notam tibi faciam: Pluriès observavi, in  
 altis & vetustis turribus, Campanilibus-  
 que Templorum, arbusculas imò Arbores,  
 è fissuris sive rimis lapidum crescentes. E-  
 go puto nucleos (si fuerunt nuciferæ) glan-  
 des (si fuerunt glandiferæ) aliaque suprà  
 citata, solida semina ab avibus talia loca  
 frequentantibus, fuisse translata, in rimas  
 lapidum fortè fortuna eadentia, aut ab avi-  
 bus illic dormientibus, & noctu quiescenti-  
 bus evacuata, germine intacto, seu inconco-  
 cto pullularunt: atque hoc de aliis semini-  
 bus omnibus, in talibus provenientibus lo-  
 cis, asserere audactè, tibi audeo. *Soc.* Habet  
 umbram rationis, sed non plenè mihi sa-  
 tisfacit, illa tua ratio: Progrediamur ad  
 illam relationem tuam; quam ex te domi-  
 meæ, superiori anno audiui. *Botan.* Quæ-  
 nam fuit illa relatio. Oblivioni tradidi,  
 nisi mihi in memoriam revoces. *Soc.* Fuit  
 obser-

observatio de conflagratione seu incendio,  
 totius Europæ, Emporii celeberrimi Lon-  
 dini scilicèt: Majoris, saltèm ditioris e-  
 jus partis. *Botan.* Jam subit animum &  
 eandem iterùm paucis tibi perstringam :  
 Si benè meministi, secundo die Septem-  
 bris, Anno Domini, 1666. incepit incen-  
 dium illud luctuosum & ad triduum, aut  
 quatrimum duravit. Nec ope humanâ (di-  
 vinitus evenit, quum non est malum in  
 civitate, quod non fecit Dominus) extin-  
 gui poterat: Nam Æolus apperto vento-  
 rum carcere (ut ita loquar) regnabat: per  
 triduum aut quatrimum illud. Post o-  
 ctomestrem spatium, per rudera ducen-  
 torum jugerum, solo æquatatorum, mi-  
 hi perambulanti versus excambium ve-  
 tus nunc. Antè illud tempus; Collegium  
 Greshamianum dictum tendenti, in ve-  
 stigiis, ædificiorum & tectorum, mi-  
 hi tanta sese objecit copia, Erysimi il-  
 lius, quod irio lævis Apulus alter Fa-  
 bio Columnæ dicitur: Et eodem rever-  
 tens, mensibus duobus post hoc; adeò  
 densè pullulavit, ut falce quasi Triticum,  
 aut secale demeti potuerit. *Soc.* Quid  
 inde



inde sequetur, unde provenisse tantam copiam istius Irionis? putastu; an à semine seu satione. *Botan.* Quid quæso, te movet ad talem proponendam quæstionem, cum ædificia omnia circa ædem Divi Pauli, & alibi passim in meditullio celeberrimi Emporii Londini, à Mille aut saltèm, aliquot centenis annis: Fuère constructa & tectis conservata. *Soc.* Ergò tanta copia illius seminis, latebat in cellis & cavearum fundis, & soli & pluvix exposita, fructificavit. *Botan.* Unum hoc addam: Ego non sum Plinius, ut ex aliorum relatione mundo imponam, nec Mattheolus ut appingam ea quæ nunquam extitere: Sed ut vis appertis verbis nec Calamistratis: meum tibi dicam animum, *Soc.* Dicas quæso? *Botan.* Nullum est semen plantæ, quod producit (conservatum quàm diligentissimè) post decennium; perraro post quinquennium: multò minùs post centenos aliquot, & Mille annos. *Soc.* Ergò aliquis semina istius plantæ, per rudera sparsit. *Botan.* Non credo imò, certò scio tantam istius Irionis, seminis copiam non fuisse in tota insula Britanniâ, imò nec in Gallia: dubito



dubito an in Germania & Italia ipsa; (cujus Neapolis est regnum, ubi frequenter crecebat tempore Fab. Columnæ) unquam floruit tanta istius plantæ copia, ergò etiam si seminatores fuissent (ex tuâ opinione, post hæc tibi à me auditâ) non poterat tanta copia istius individualis speciei, seminis, à tot Regnis suppeditari. *Soc.* De hoc non multum nunc dubito: Sed quid concludis, sis rationi consentaneus. Unde provenit tanta copia istius Irionis, forte sponte. Sub idem tempus, ibidem vidisti & observasti multas alias plantas, pappescentes, imo gramineas, aliasque diversarum classium. *Botan.* Vidi & attentè observavi. *Soc.* Undè hæc aliæ venêre. *Botan.* A semine volatili pappescenti quod potest (ut supra clarè satis docui) ad multa Milliaria, vento transferri, & in altum attolli & ubicunque ceciderit, germinat & fructificat. *Soc.* De pappescentibus non dubito quod dicis, insuper Gramina, densè satis proveniunt; in qualibet terra si negligatur: quare non potest tuum Erysimum, seu Iriolævis Apulus alter in ruderibus Londinensibus, sponte etiam provenire. *Botan.* Non

est par ratio inter Gramina & Erysimum hoc : Quia Graminum semina sparguntur passim; est omnium vegetantium plantarum, in omnibus regionibus, frequentissima & facilius sese propagat. *Soc.* Est planta tamen perfecta, ex suprâ dictis à te : ergò à semine, multiplicatur. *Botan.* Hoc ego semper credidi, & in hanc horam credo. Unum à te sciscitari velim, putasne hanc plantam, Irionem lævem Apulum Col. à quovis hortulano, aut incola hujus civitatis satam, in ruderibus fuisse. *Soc.* Neminem hujus insulæ primò tam curiosum, secundò nec tanta ejus plantæ seminis, copia instructum fuisse, pro certo ratum & statutum habeo. Quis tam stolidus aut malè feriatuſ homo, si semina ad manum haberet (quod impossibile suprâ demonstratum est) ruderibus ducentorum jugerum terræ, solo æquatorum, committeret. Ergò cum nec à satione, nec à semine, ad aliquot centenos annos in ruderibus latente, produci poterat; hujus plantæ tanta copia. Unde concludere vis, tantam ipsius multitudinem provenisse. *Botan.* Certè ut supra dixi ex sale partim volatili, partim fixo, salpetro, sulphure

sulphure, & ex terra sive calcosa aut ruderosa & aqua, mixtaque materia, quocunque modo appelles, per me non stabit. Nescio quid mihi persuasum habere debeo, adhuc. Probabile certè est, hanc plantam tam copiosè provenisse spontè; Ut supra dictum fuit. Sed hæc opinio apperit januam ad Philosophastros contemplativos, qui indifferenter credunt cujuslibet generis plantas, Arbores, frutices, suffruticesve, ex terra tanquam matrice, sponte sine semine provenire. Sed hæc opinio (ut mihi videtur) repugnat sacrae Scripturae, & rationi. Hæc per dialogum inter nos dixisse, impræsentiarum, sat esse puto. Quod restat de hac materia; Sociis virtuosis, Parisiensibus & Londinensibus, viris nobilissimis, clarissimis & Doctissimis (ex quorum numero, te esse scio) discutiendum relinquo. Vale mi Doctissime vir.

*FINIS.*

Errata in præludiis Botanicis contenta.

**P**agina 1. linea 7. lege Abrotanum. p. 5. l. 18. l. nonum. p. 17. l. 13. l. Anthyllis. *ibidem* l. 19. Antirrhinum majus passim. pro ♀ l. ☉. p. 19. l. 6. pro ♀ l. ☉. p. 26. l. 18. l. Halimoides. p. 34. l. 3. & passim l. Buphrthalmum. p. 39. l. 2. l. Galactites. p. 46. l. 14. l. Cerefolium. p. 51. l. 16. pro ♀ l. ☉. p. 53. l. 5. & 6. deleatur humilis. p. 55. l. 11. pro ☉ l. ♀. p. 67. l. 4. pro ♀ l. ☉. *ibid.* l. 14. l. Doronicum foliis viridibus, subtrius lanuginosis. p. 68. l. 2. l. Leucoium. p. 69. l. 5. & 7. l. Elchrysum. p. 77. l. 1. l. rubris. p. 81. l. 4. l. Geranium. p. 91. l. 7 l. Peruanus. p. 96. l. 11. l. Pilosella. *ibid.* l. 17. pro ♀ l. ☉. p. 97. l. antepenult. pro ♀ l. ☉. p. 110. l. 4. pro ♀ l. ☉. p. 109 l. 18. l. semine rotundo p. 110. l. 6. Lapathū fidiū instar, l. nobis. Pulchrū sinuatū Bononiense J.B. p. 111. l. 11. pro ☉ l. ♀. p. 123. l. 22. l. syl. alba simplex. p. 128. l. 10. del. ☿. p. 129 l. 1. pro ♀ l. ☉. p. 129. & 130. l. Armeniaca. p. 129 l. 12. l. Aurantia. p. 137. l. 14. pro ♀ l. ☉. p. 145. l. 16. pro ☉ l. ♀. p. 149. l. 19. & 20. pro ἀρούρα. 3. l. 1<sup>a</sup>. & 2<sup>a</sup>. p. 160. l. 13. l. Virginiana. p. 160. l. 18. l. densis furculis. *ib.* l. 12. l. Scabiosæ. p. 173. l. 16. l. 1<sup>ra</sup>. Clus. & pro ♀ l. ☉. p. 178. l. 2. & 4. l. Moschata. *ibid.* l. 21. l. Pimpinellæ. p. 197. l. 14 l. Sphodylium. p. 270. l. 2. pro ☉ l. ♀. p. 213. l. 2. l. Hybernum. p. 218. l. 6. l. sem. nigro p. 231 l. ult. l. Androsæmi. p. 243. l. 14. l. Cachryophora. p. 268. l. 8. l. Malacoïdes. p. 171. l. 12. l. hac duplici nota. p. 258. l. 17. l. innititur p. 276. l. 10. l. folia. p. 280. l. 1. &



2. l. fructusve. p. 281. l. 13. l. relinquentes. p. 282. l. 2.  
. Dodrantalem. p. 295. l. 14. l. Pistacia. p. 307. l. penult.  
l. Gallicè & pigra. p. 305. l. antepenult. l. Germanica.  
p. 318. l. penult. l. Britannia. 319. l. 19. l. prior vulga-  
ris. p. 320. antepenult. l. minutæ. p. 340. l. 1. l. radice. p.  
341. l. penult. l. expetitur. p. 371. l. antepenult. l. proprie  
dicta. p. 372. l. 11. l. averruncandum. p. 384. l. 13. l. fe-  
cerit. p. 392. l. 11. & 12. l. denominandæ. p. 417. l. 17.  
l. folliculos. p. 419. l. 23. l. mimosam. p. 440. l. 10. l. Ca-  
chryophora. *ibid.* l. 18. l. ferularum. p. 464. l. 7. l. præ-  
stantissima & certissima. *ibid.* l. penult. l. edita. p. 476.  
l. 3. Dod. *deleatur.* *ibid.* l. 7. pro à l. videlicet. p. 488. l.  
12. l. Ceterach. p. 496. l. 16. l. vis ut apertis.

---

VIRIS



VIRIS CLARISSIMIS

In re

# BOTANICA,

Facile inter primos Magistris.

ABELI BRUNTER Medico & Botanico, *Celsitudini* E. Regiæ.

NICOLAO MARCHANT Apothecario, Botanico *Celsitud.* E. Regiæ.

Collegis suis, Horti Regii *Blesensis*  
Collectoribus & coexaminatoribus dignissimis : Author hæc scribit.

Collegæ dignissimi,

**C**UM Hortum Regium, *Blesensem*, trecentis sexaginta plantis, plus minusve auctum animadvertetam : quæ fuere à nobis recuperata & collecta ab anno 1655.

(quo anno Hortum Regium *Blesensem*, Typis pro secundâ vice commissimus) usque ad annum 1660, quo extinctus est serenissimus noster Mæcenæ & Patronus, verè Regius, dignissimus

nissimus Princeps. Cum hunc catalogum cum  
auctario à quamplurimis passim desiderari  
observaverim. Eundem auctum, cum dura-  
tionis notulis, aliisque notis seu charactis-  
mis, nulli cuiquam Botanicorum hucusque usita-  
tis, in lucem edere decrevi. Partim ut Bo-  
tanicorum tam hic, quàm alibi terrarum de-  
gentium, precibus satisfacerem; partim ut  
nobismetipsis satisfaceret; quippe sudoribus &  
laboribus nostris per decennium exantlatis,  
collectæ & examinatæ fuerunt quotquot hic  
exstant plantæ. Quum sub Auspiciis serenissi-  
mi Domini nostri, Gastonis Franciæ, &c.  
hæc à me incepta & hic elaborata & finita;  
ne blattis & tineis diutius committerentur,  
in Botanicorum rem esse mecum non dubi-  
tabitis: Quare publici juris facere animum  
induxi meum. Porro plantas non scriptas in  
eodem Horto Regio Blæsensi aucto 260 con-  
tentas, breviter & succinctè delineatas ex-  
hibeo: Cum observationibus generalioribus  
plantarum ex eodem Horto Regio Blesensi  
aucto excerptis, rei herbariæ amantibus  
necessariis & cognitu perutilibus. Halluci-  
nationes Caspari Bauhini tam in digerendis  
quàm denominandis plantis. Animadver-  
siones itidem in Johannis Bauhini tres To-

1864-29  
mos historiae suae universalis edidi: Una cum  
Dialogo inter Philobotanum D. B. popula-  
rem meum Societatis Regiae Socium & me-  
metipsum. Ubi passim in hac mea doctrina  
praesterno viam ad methodum novam & in-  
auditam quam brevi (si Deus dederit) lucem  
videre spero. Vobis hac scribere (quicquid  
aequum est) judicavi. Vestrum judicium, vestra  
existimatio valebit. Sublimiora sub Auspiciis  
serenissimi CAROLI Secundi, magnae Bri-  
tanniae, Franciae & Hiberniae Regis Do-  
mini nunc nostri; jam penè in promptu  
habeo. Videlicet, classes Stirpium, per Tabu-  
las cognationis seu affinitatis dispositas. Diu  
Valete

Collegae dignissimi,

Vester Collega,

Collector & coexaminator

Robertus Morison M. D.  
Botan. Celsitud. E. Regiae  
Blessis degens.



me-  
la-  
me-  
rind  
is in-  
com  
and  
me  
me  
Bri-  
Do-  
me  
la-  
Dia

D.  
egis

